



VIGITEL BRASIL 2008

VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS
CRÔNICAS POR INQUÉRITO TELEFÔNICO

ESTIMATIVAS SOBRE FREQUÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO
SOCIODEMOGRÁFICA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO
PARA DOENÇAS CRÔNICAS NAS CAPITALS DOS 26 ESTADOS
BRASILEIROS E NO DISTRITO FEDERAL EM 2008

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa

VIGITEL BRASIL 2008

VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS
CRÔNICAS POR INQUÉRITO TELEFÔNICO

ESTIMATIVAS SOBRE FREQUÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO
SOCIODEMOGRÁFICA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO
PARA DOENÇAS CRÔNICAS NAS CAPITAIS DOS 26 ESTADOS
BRASILEIROS E NO DISTRITO FEDERAL EM 2008

Série G. Estatística e Informação em Saúde

Brasília, DF, 2010

© 2010 Ministério da Saúde

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é da área técnica.

A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: www.saude.gov.br/bvs

Série G. Estatística e Informação em Saúde

Tiragem: 1ª edição – 2010 – 3000 exemplares

Elaboração, edição e distribuição

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Vigilância em Saúde
Departamento de Análise de Situação de Saúde
SAF Sul, Trecho 2, Lote 5/6, Bloco F, Torre 1
Edifício Premium, Térreo, Sala 16
CEP: 70.070-600, Brasília – DF
E-mail: svs@saude.gov.br
Internet: www.saude.gov.br/svs

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa
Departamento de Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde
Esplanada dos Ministérios, Bloco G,
Edifício Sede, 6º andar, sala 655
CEP: 70058-900, Brasília – DF
E-mail: svs@saude.gov.br
Internet: www.saude.gov.br/sgep

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Produção Editorial

Capa: Fred Lobo – Núcleo de Comunicação/GAB/SVS
Projeto gráfico: Fabiano Camilo, Sabrina Lopes e
Fred Lobo – Núcleo de Comunicação/GAB/SVS
Diagramação: NJOBS Comunicação (Marília Assis
e Rafael Keoui)
Normalização: NJOBS Comunicação (Clícia Silveira Rodrigues,
Fenanda Gomes e Lizandra Deusdará Felipe)
Revisão: NJOBS Comunicação (Ana Cristina Vilela, Clícia Sil-
veira Rodrigues, Fenanda Gomes e Lizandra Deusdará Felipe)

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa.

Vigitel Brasil 2008: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009.
554 p.: il. – (Série G. Estatística e Informação em Saúde)

ISBN 978-85-334-1731-1

1. Doença crônica. 2. Fatores de risco. 3. Vigilância. I. Título. II. Série.

CDU 614.4

Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2010/0570

Títulos para indexação:

Em inglês: Vigitel Brazil 2008: protective and risk factors for chronic diseases by telephone survey.

Em espanhol: Vigitel Brasil 2008: vigilancia de elementos de riesgo y protección para las enfermedades crónicas por cuestionamiento telefónico.

Agradecimentos

A implantação e manutenção do Vigitel (Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), desde 2006, em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, tem sido um processo de construção coletiva, envolvendo diversas instituições, parceiros, dirigentes e técnicos.

Nesta publicação, que divulga resultados do terceiro ano de operação do sistema, gostaríamos de agradecer às empresas telefônicas Brasil Telecom, Telefônica – Telecomunicações de São Paulo e Telemar Norte Leste pela contínua colaboração prestada no sorteio e extração das amostras probabilísticas das linhas telefônicas sorteadas em cada cidade.

Agradecemos, ainda, aos pesquisadores do Behavioral Risk Factor Surveillance System – BRFSS, do Centers for Disease Control and Prevention – CDC, Atlanta/EUA, pelo convite para que participássemos do encontro do BRFSS, em 2008, e por sua participação na oficina de trabalho sobre o Vigitel, realizada no mesmo ano, em Brasília, o que possibilitou valiosas trocas de experiências e reflexões sobre os dois sistemas de vigilância.

Finalmente, agradecemos aos mais de cinquenta e quatro mil brasileiros que, com sua aquiescência em participar das entrevistas telefônicas e com a atenção e o tempo que dedicaram a responder ao questionário do Vigitel, permitiram a continuidade, no País, de um sistema de monitoramento de fatores de risco para doenças crônicas de grande importância para a Saúde Pública brasileira.

Equipe de Coordenação do VIGITEL

Equipe de elaboração

Esta publicação foi elaborada pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo.

Equipe de coordenação do VIGITEL

Otaliba Libânio de Moraes Neto – SVS/MS
Carlos Augusto Monteiro – Nupens/USP
Deborah Carvalho Malta – SVS/MS
Erly Catarina de Moura – Nupens/USP, UFPA

Organização da publicação

Erly Catarina de Moura – Nupens/USP, UFPA
Deborah Carvalho Malta – SVS/MS
Carlos Augusto Monteiro – Nupens/USP

Elaboração da publicação

Carlos Augusto Monteiro – Nupens/USP
Erly Catarina de Moura – Nupens/USP, UFPA
Rafael Moreira Claro – Nupens/USP
Sara Araújo da Silva – SVS/MS
Patrícia Pereira Vasconcelos de Oliveira – SVS/MS
Deborah Carvalho Malta – SVS/MS

Colaboradores

Juliano Ribeiro Moreira – Expertise Inteligência e Pesquisa de Mercado Ltda.
Nilza Nunes da Silva – FSP-USP
Regina Bernal – FSP-USP
Isabel dos Reis Silva Oliveira – SGEP/MS
Maria Natividade G. S. T. Santana – SGEP/MS

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) fumantes, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	24
Tabela 2 – Percentual de fumantes no conjunto da população adulta das capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	26
Tabela 3 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) ex-fumantes, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	28
Tabela 4 – Percentual de ex-fumantes no conjunto da população adulta das capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	30
Tabela 5 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	32
Tabela 6 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	34
Tabela 7 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) com excesso de peso (Índice de Massa Corporal ≥ 25 kg/m ²), por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	36
Tabela 8 – Percentual de indivíduos com excesso de peso (Índice de Massa Corporal ≥ 25 kg/m ²) no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	39
Tabela 9 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) com obesidade (Índice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m ²), por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	40
Tabela 10 – Percentual de indivíduos com obesidade (Índice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m ²) no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	42
Tabela 11 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem frutas e hortaliças 5 ou mais dias por semana, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	44
Tabela 12 – Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças 5 ou mais dias da semana no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	46
Tabela 13 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	48
Tabela 14 – Percentual de indivíduos que consomem 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	50
Tabela 15 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que costumam consumir carnes com excesso de gordura, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	51
Tabela 16 – Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	53
Tabela 17 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	55
Tabela 18 – Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	57
Tabela 19 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem refrigerantes 5 ou mais dias por semana, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	59

Tabela 20 – Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes 5 ou mais dias por semana no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	61
Tabela 21 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que praticam atividade física suficiente no tempo livre, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	63
Tabela 22 – Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	65
Tabela 23 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	67
Tabela 24 – Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	69
Tabela 25 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, em pelo menos uma ocasião, conduziram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	71
Tabela 26 – Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, em pelo menos uma ocasião, conduziram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	73
Tabela 27 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que avaliaram seu estado de saúde como <i>ruim</i> , por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	75
Tabela 28 – Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como <i>ruim</i> no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	77
Tabela 29 – Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	79
Tabela 30 – Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	81
Tabela 31 – Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	82
Tabela 32 – Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	84
Tabela 33 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	85
Tabela 34 – Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	87
Tabela 35 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	89
Tabela 36 – Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	91
Tabela 37 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	93
Tabela 38 – Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade – Vigitel 2008	95

Lista de Figuras

Figura 1 – Percentual de homens (≥ 18 anos) fumantes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	25
Figura 2 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) fumantes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	25
Figura 3 – Percentual de homens (≥ 18 anos) ex-fumantes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	29
Figura 4 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) ex-fumantes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	29
Figura 5 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	33
Figura 6 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	33
Figura 7 – Percentual de homens (≥ 18 anos) com excesso de peso ($IMC \geq 25$ kg/m ²), segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	37
Figura 8 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) com excesso de peso ($IMC \geq 25$ kg/m ²), segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	37
Figura 9 – Percentual de homens (≥ 18 anos) com obesidade ($IMC \geq 30$ kg/m ²), segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	41
Figura 10 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) com obesidade ($IMC \geq 30$ kg/m ²), segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	41
Figura 11 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que consomem frutas e hortaliças 5 ou mais dias por semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	45
Figura 12 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que consomem frutas e hortaliças 5 ou mais dias por semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	45
Figura 13 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que consomem 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	49
Figura 14 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que consomem 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	49
Figura 15 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que costumam consumir carnes com excesso de gordura, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	52
Figura 16 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que costumam consumir carnes com excesso de gordura, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	52
Figura 17 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que costumam consumir leite com teor integral de gordura, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	56
Figura 18 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que costumam consumir leite com teor integral de gordura, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	56
Figura 19 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que consomem refrigerantes 5 ou mais dias por semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	60
Figura 20 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que consomem refrigerantes 5 ou mais dias por semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	60
Figura 21 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que praticam atividade física suficiente no tempo livre segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	64
Figura 22 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que praticam atividade física suficiente no tempo livre segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	64

Figura 23 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que cinco doses de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	68
Figura 24 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	68
Figura 25 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, em pelo menos uma ocasião, conduziram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	72
Figura 26 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, em pelo menos uma ocasião, conduziram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	72
Figura 27 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que avaliaram seu estado de saúde como <i>ruim</i> , segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	76
Figura 28 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que avaliaram seu estado de saúde como <i>ruim</i> , segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	76
Figura 29 – Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia pelo menos uma vez nos últimos dois anos, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	80
Figura 30 – Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram Papanicolau pelo menos uma vez nos últimos três anos, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	83
Figura 31 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	86
Figura 32 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	86
Figura 33 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	90
Figura 34 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	90
Figura 35 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de diabetes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	94
Figura 36 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de diabetes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008	94

Lista de Quadros

Quadro 1 – Linhas telefônicas sorteadas, linhas telefônicas elegíveis e entrevistas realizadas nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal – Vigitel 2008	17
Quadro 2 – Variações no percentual de indivíduos expostos a fatores de risco e proteção para doenças crônicas no conjunto da população adulta das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2008 – Vigitel 2006, 2007 e 2008	97

Sumário

Apresentação	13
Introdução	15
Aspectos Metodológicos	16
Amostragem	16
Coleta de Dados	18
Análise de Dados	19
Aspectos Éticos	22
Estimativas Para 2008	23
Tabagismo	23
Excesso de Peso e Obesidade	35
Consumo Alimentar	43
Atividade Física	62
Consumo de Bebidas Alcoólicas	66
Autoavaliação do Estado de Saúde	74
Prevenção de Câncer	78
Morbidade Referida	88
Variação Temporal 2006-2008	96
Referências	98
ANEXOS	101
ANEXO A – Modelo do Questionário Eletrônico	103
ANEXO B – Estimativas para a Distribuição (%) da População Adulta Total e da População Adulta com Telefone Segundo Variáveis Sociodemográficas - 2000/2008	117
ANEXO C - Resultados por Cidade	121

Apresentação

Esta publicação divulga resultados do terceiro ano de operação (2008) do sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas – Vigitel.

Desde 2006, implantado em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, o Vigitel vem cumprindo, com grande eficiência, seu objetivo de monitorar, em nosso meio, a frequência e a distribuição dos principais determinantes das Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNT.

A implantação do Vigitel vem sendo realizada em estreita parceria estabelecida, desde 2006, entre a Secretaria de Vigilância em Saúde e a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, além do suporte técnico-científico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo – Nupens/USP. Essa parceria tem possibilitado a este sistema de vigilância avançar no monitoramento dos principais fatores de risco ou proteção para DCNT.

Nesta publicação são apresentados os resultados do sistema Vigitel, para o ano de 2008, em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, e é realizada uma avaliação da evolução dos fatores de risco e proteção para DCNT. Com isso, o Ministério da Saúde cumpre a tarefa de realizar o monitoramento desses fatores, consolidando a Vigilância das DCNT e contribuindo na definição de políticas públicas que promovam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

Gerson Oliveira Penna
Secretário de Vigilância em Saúde

Antônio Alves de Souza
Secretário de Gestão Estratégica
e Participativa

INTRODUÇÃO

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis – DCNTs têm se colocado como um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. Estimativas da Organização Mundial de Saúde – OMS mostram que as DCNTs são responsáveis por 61% de todas as mortes ocorridas no mundo, ou cerca de 35 milhões de mortes em 2005 (WHO, 2005). No Brasil, as DCNTs seguem padrão semelhante e, em 2006, foram as principais causas de óbito no País, destacando-se as doenças do aparelho circulatório (29,4%) e as neoplasias (15,1%) (BRASIL, 2008a). Séries históricas de estatísticas de mortalidade disponíveis para as capitais dos estados brasileiros indicam que a proporção de mortes por DCNTs aumentou em mais de três vezes entre a década de 1930 e 2005 (BRASIL, 2008b).

De acordo com a OMS, um pequeno conjunto de fatores de risco responde pela maioria das mortes por DCNTs e por fração substancial da carga de doenças por causa dessas enfermidades. Entre esses fatores destacam-se o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a obesidade, as dislipidemias (determinadas principalmente pelo consumo excessivo de gorduras saturadas de origem animal), a ingestão insuficiente de frutas, legumes e verduras e a inatividade física (WHO, 2005).

Por conta da potencial relevância das DCNTs na definição do perfil epidemiológico da população brasileira e, mais importante, por serem passíveis de prevenção os fatores de risco para essas doenças, o Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, contando com o suporte técnico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo – Nupens/USP, implantou, em 2006, o sistema Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.

Nesta publicação são apresentados resultados relativos ao terceiro ano (2008) de operação do sistema Vigitel. Esses resultados, somados àqueles divulgados nos anos anteriores (BRASIL, 2007, 2008; MALTA, et al., 2009; MOURA, et al., 2008), dotam todas as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal de informações atualizadas sobre a frequência, distribuição e evolução dos principais fatores que determinam doenças crônicas em nosso meio.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Amostragem

Os procedimentos de amostragem empregados pelo Vigitel visam obter, em cada uma das capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, amostras probabilísticas da população de adultos residentes em domicílios servidos por, pelo menos, uma linha telefônica fixa no ano. O sistema estabelece um tamanho amostral mínimo de 2.000 indivíduos com 18 ou mais anos de idade em cada cidade, para que se possa estimar com coeficiente de confiança de 95% e erro máximo de cerca de dois pontos percentuais a frequência de qualquer fator de risco na população adulta. Erros máximos de cerca de três pontos percentuais são esperados para as estimativas específicas segundo o sexo, assumindo-se proporções semelhantes de homens e mulheres na amostra (WHO, 1991).

A primeira etapa da amostragem do Vigitel consiste no sorteio sistemático de 5.000 linhas telefônicas por cidade. Esse sorteio, sistemático e estratificado de acordo com região ou prefixo das linhas telefônicas, é realizado a partir do cadastro eletrônico de linhas residenciais fixas das empresas telefônicas que cobrem as cidades. A seguir, as linhas sorteadas em cada cidade são ressorteadas e divididas em 25 réplicas de 200 linhas, cada réplica reproduzindo a mesma proporção de linhas por região da cidade ou prefixo telefônico. A divisão da amostra integral em réplicas é feita, essencialmente, em função da dificuldade em estimar previamente a proporção das linhas do cadastro que serão elegíveis para o sistema (linhas residenciais ativas) e, portanto, o total de linhas a ser sorteado para chegar a 2.000 entrevistas. No ano de 2008, a partir dos cadastros telefônicos das três empresas que servem as 27 cidades, foram sorteadas 106.000 linhas telefônicas (5.000 por cidade). No geral, foram utilizadas, em média, 20 réplicas por cidade, variando entre 17 réplicas, em Belo Horizonte, e 23 réplicas, em Campo Grande.

A segunda etapa da amostragem do Vigitel é executada em paralelo à execução das entrevistas, envolvendo, inicialmente, a identificação, entre as linhas sorteadas, daquelas que são elegíveis para o sistema, ou seja, linhas residenciais ativas. Não são elegíveis para o sistema as linhas que correspondem a empresas que não mais existem ou que se encontram fora de serviço, além das linhas que não respondem a dez chamadas feitas em dias e horários variados, incluindo sábados e domingos e períodos noturnos, e que, provavelmente, correspondem a domicílios fechados. No ano de 2008, no conjunto das 27 cidades, o sistema Vigitel fez ligações para 106.000 linhas telefônicas distribuídas em 530 réplicas, identificando 72.834 linhas elegíveis.

Para cada linha elegível, uma vez obtida a aquiescência dos seus usuários em participar do sistema, procede-se à enumeração dos indivíduos com 18 ou mais anos de idade que residem no domicílio e, a seguir, ao sorteio de um desses indivíduos para ser entrevistado. No ano de 2008, as ligações feitas para as 72.834 linhas elegíveis

resultaram em 54.353 entrevistas completas, o que indica uma taxa média de sucesso do sistema de 74,6% (54.353 entrevistas realizadas para 72.834 linhas elegíveis), variando entre 70,1%, no Rio de Janeiro, e 84,7%, em Palmas. O Quadro 1 sumariza o desempenho do sistema Vigitel em cada uma das cidades estudadas.

Quadro 1 – Linhas telefônicas sorteadas, linhas telefônicas elegíveis e entrevistas realizadas nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal – Vigitel 2008

Capitais / DF	Número de linhas telefônicas		Número de entrevistas realizadas		
	Sorteadas	Elegíveis	Total	Homens	Mulheres
Aracaju	3.800	2.800	2.014	751	1.263
Belém	3.800	2.741	2.012	816	1.196
Belo Horizonte	3.400	2.570	2.016	99	1.217
Boa Vista	3.800	2.665	2.013	812	1.201
Campo Grande	4.600	2.748	2.012	743	1.269
Cuiabá	4.200	2.696	2.012	806	1.206
Curitiba	3.600	2.536	2.012	782	1.230
Florianópolis	4.200	2.683	2.011	835	1.176
Fortaleza	3.800	2.773	2.010	809	1.201
Goiânia	4.000	2.616	2.014	800	1.214
João Pessoa	3.600	2.729	2.012	751	1.261
Macapá	4.200	2.840	2.014	836	1.178
Maceió	4.000	2.814	2.016	753	1.263
Manaus	4.200	2.712	2.012	844	1.168
Natal	3.600	2.646	2.019	813	1.206
Palmas	3.800	2.379	2.014	66	1.148
Porto Alegre	4.400	2.829	2.013	783	1.230
Porto Velho	4.000	2.641	2.014	836	1.178
Recife	3.800	2.722	2.010	754	1.256
Rio Branco	4.200	2.758	2.012	772	1.240
Rio de Janeiro	4.000	2.870	2.013	753	1.260
Salvador	4.000	2.768	2.012	763	1.249
São Luís	3.600	2.648	2.013	787	1.226
São Paulo	4.400	2.681	2.013	771	1.242
Teresina	3.800	2.750	2.014	784	1.230
Vitória	3.600	2.758	2.013	794	1.219
Distrito Federal	3.600	2.461	2.013	822	1.191
Total	106.000	72.834	54.353	21.435	32.918

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico

Cerca de 80% das linhas elegíveis para as quais não houve entrevista corresponderam a situações em que não foi possível o contato telefônico inicial com seus usuários (linhas permanentemente ocupadas, com sinal de fax ou conectadas à secretária eletrônica) ou quando não foi possível encontrar o indivíduo sorteado no domicílio mesmo após várias tentativas de agendamento e depois de pelo menos dez ligações feitas em dias e horários variados. Recusas em participar do sistema de monitoramento no contato inicial com o domicílio, ou após o sorteio do indivíduo a ser entrevistado, foram observadas em apenas 5,8% das linhas elegíveis, variando de 3,2%, em Rio Branco, a 11,4%, em Florianópolis. O total de ligações telefônicas feitas pelo sistema Vigitel, em 2008, foi de 572.076, o que corresponde a pouco mais de sete ligações por entrevista completa. O tempo médio de duração das entrevistas realizadas pelo sistema, em 2008, foi de 10,33 minutos, variando entre 10,16 minutos, em Belo Horizonte, e 13,04 minutos, em Macapá.

Coleta de dados

As entrevistas telefônicas realizadas pelo sistema Vigitel no ano de 2008 foram feitas entre abril e dezembro por uma empresa contratada, sediada em Belo Horizonte. A equipe responsável pelas entrevistas, envolvendo 60 entrevistadores, quatro supervisores e um coordenador, recebeu treinamento prévio e foi supervisionada continuamente durante a operação do sistema por um pesquisador do Nupens/USP.

O questionário do sistema Vigitel (Anexo A) foi construído de modo a viabilizar a opção do sistema pela realização de entrevistas telefônicas feitas com o emprego de computadores, ou seja, entrevistas cujas perguntas são lidas diretamente na tela de um monitor de vídeo e cujas respostas são registradas direta e imediatamente em meio eletrônico. Esse questionário permite, ainda, o sorteio automático do membro do domicílio que será entrevistado, o salto automático de questões não aplicáveis em face de respostas anteriores, a crítica imediata de respostas não válidas e a cronometragem da duração da entrevista, além de propiciar a alimentação direta e contínua no banco de dados do sistema.

As perguntas do questionário Vigitel, curtas e simples, abordam: a) características demográficas e socioeconômicas dos indivíduos (idade, sexo, estado civil, etnicidade, nível de escolaridade, número de pessoas e cômodos no domicílio, número de adultos e número de linhas telefônicas); b) características do padrão de alimentação e de atividade física associadas à ocorrência de DCNTs (por exemplo: frequência do consumo de frutas, legumes e verduras e de alimentos fonte de gordura saturada e frequência e duração da prática de exercícios físicos e do hábito de assistir à televisão); c) peso e altura recordados; d) frequência do consumo de cigarros e de

bebidas alcoólicas; e e) autoavaliação do estado de saúde do entrevistado e referência a diagnóstico médico anterior de hipertensão arterial, diabetes e colesterol elevado. O processo de construção do questionário do sistema levou em conta vários modelos de questionários simplificados utilizados por sistemas de monitoramento de fatores de risco para doenças crônicas (REMYNGTON, et al., 1988; WHO, 2001) e a experiência acumulada em testes de implantação do sistema, realizados, em 2003, no município de São Paulo (MONTEIRO, et al., 2005), em 2004, no município de Botucatu, interior de São Paulo (CARVALHAES; MOURA; MONTEIRO, 2008), e, em 2005, em cinco capitais de estados brasileiros pertencentes às regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste (Belém, Salvador, São Paulo, Florianópolis e Goiânia) (MONTEIRO, 2007).

Análise de dados

Neste relatório do sistema Vigitel, relativo às entrevistas realizadas pelo sistema em 2008, são apresentadas estimativas para a frequência (e correspondente intervalo de confiança de 95%) de fatores de risco ou proteção para doenças crônicas na população adulta de cada uma das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal e, também, para o conjunto da população adulta dessas 27 cidades. A seleção desses fatores levou em conta sua importância para a determinação da carga total de doença estimada pela OMS para a região das Américas, onde se encontra o Brasil (WHO, 2002). Assim, foram incluídos fatores de risco relacionados ao hábito de fumar, ao excesso de peso, ao consumo de alimentos fonte de gordura saturada, ao sedentarismo e ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, além da referência ao diagnóstico médico de hipertensão arterial e diabetes. Entre os fatores de proteção, foram incluídos a prática de atividade física no lazer, o consumo de frutas e hortaliças, a proteção contra radiação ultravioleta e a realização de exames para detecção precoce de câncer. A análise do questionário do sistema Vigitel aplicado em 2008, irá evidenciar que os fatores de risco ou proteção para doenças crônicas focalizados nesta publicação representam apenas uma pequena fração das informações que o sistema propicia.

A amostra de adultos entrevistados pelo sistema Vigitel em cada cidade é extraída a partir do cadastro das linhas telefônicas residenciais existentes em cada cidade e, nesta medida, rigorosamente, só permite inferências populacionais para a população adulta que reside em domicílios cobertos pela rede de telefonia fixa. A cobertura dessa rede, embora tenha crescido nos últimos anos, não é evidentemente universal, podendo ser particularmente baixa em cidades economicamente menos desenvolvidas e nos estratos de menor nível socioeconômico. Estimativas calculadas a partir da Pesquisa

de Orçamentos Familiares – POF, realizada pelo IBGE entre 2002 e 2003, em uma amostra probabilística de mais de 48 mil domicílios de todas as regiões do País, indica que 66,4% dos domicílios existentes no conjunto das 27 cidades estudadas pelo Vigitel eram servidos por linhas telefônicas fixas, variando entre 33,7%, em Macapá, e 79,4%, no Distrito Federal (BRASIL, 2007). A cobertura da rede de telefonia fixa, calculada a partir da POF 2002-2003 para cada um dos quintos da distribuição da renda familiar *per capita* do conjunto dos domicílios das 27 cidades, foi 31,4%, 55,4%, 70,9%, 80,6% e 89,9%, respectivamente.

Nenhum método direto de compensação para a fração de domicílios não servidos por telefone em cada cidade ou em cada estrato populacional é empregado pelo sistema Vigitel. Entretanto, como se verá a seguir, pesos pós-estratificação, aplicados aos indivíduos entrevistados pelo sistema, podem corrigir, ao menos parcialmente, vieses determinados pela não cobertura universal da rede telefônica.

Quando dados individuais de um inquérito populacional são utilizados sem pesos, todos os indivíduos estudados contribuem da mesma forma para as estimativas geradas pelo inquérito. Esse procedimento se aplica quando cada indivíduo estudado tenha tido a mesma probabilidade de ser selecionado para o estudo e quando as taxas de não cobertura do cadastro populacional empregado e as taxas de não participação no inquérito tiverem sido iguais em todos os estratos da população. Quando essas situações não são observadas, como no caso do sistema Vigitel, a atribuição de pesos para os indivíduos estudados é recomendada.

O peso final atribuído a cada indivíduo entrevistado pelo Vigitel em cada uma das 27 cidades é o resultado da multiplicação de três fatores. O primeiro desses fatores é o inverso do número de linhas telefônicas no domicílio do entrevistado, o qual corrige a maior chance que indivíduos de domicílios com mais de uma linha telefônica tiveram de ser selecionados para a amostra. O segundo fator é o número de adultos no domicílio do entrevistado, o qual corrige a menor chance que indivíduos de domicílios habitados por mais pessoas tiveram de ser selecionados para a amostra.

O terceiro fator de ponderação empregado pelo sistema, denominado peso pós-estratificação, objetiva igualar a composição sociodemográfica da amostra de adultos estudada pelo Vigitel em cada cidade à composição sociodemográfica da população adulta total da cidade. Para a obtenção desse fator, a amostra de indivíduos estudada pelo Vigitel em cada cidade, já incorporando os dois fatores de ponderação mencionados anteriormente, foi distribuída em 36 categorias sociodemográficas resultantes da estratificação da amostra segundo sexo (masculino e feminino), faixa etária (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 e 65 e mais anos de idade) e níveis de escolaridade (0-8, 9-11 e 12 ou mais anos de escolaridade). A seguir, procedeu-se à mesma distribuição para a amostra de adultos estudada em cada cidade pelo Censo

Demográfico de 2000 – amostra correspondente a 10% do total de domicílios. O terceiro fator de ponderação vem a ser a razão observada, em cada uma das 36 categorias sociodemográficas, entre a frequência relativa de indivíduos determinada para a amostra do Censo e a frequência relativa determinada para a amostra Vigitel. Razões maiores do que a unidade corrigem a participação de indivíduos pertencentes a categorias sociodemográficas sub-representadas na amostra Vigitel (por exemplo, homens jovens com baixa escolaridade), enquanto razões menores do que um corrigem a participação de indivíduos pertencentes a categorias super-representadas (por exemplo, mulheres idosas com alta escolaridade).

A razão entre a frequência relativa de indivíduos da amostra Vigitel e da amostra censitária em cada categoria sociodemográfica permite a correção da sub ou superrepresentação de estratos sociodemográficos no sistema Vigitel decorrente da cobertura diferencial desses estratos pela rede telefônica. Entretanto, essa correção apenas “aproxima” as estimativas geradas pelo sistema das estimativas que seriam observadas caso a cobertura da rede telefônica fosse universal ou não apresentasse diferenças entre estratos populacionais. A aproximação será tanto maior quanto mais decisiva for a influência do sexo, idade e nível de escolaridade sobre a frequência dos eventos de interesse do sistema e quanto maior forem as semelhanças entre comportamento de indivíduos de mesmo sexo, idade e nível de escolaridade servidos e não servidos por linhas telefônicas. Por outro lado, a aplicação desse terceiro fator de ponderação, que iguala a composição sociodemográfica da amostra Vigitel à composição da população total de cada cidade, também permite a correção da sub ou superrepresentação de categorias sociodemográficas decorrente de diferenças nas taxas de sucesso do sistema (entrevistas realizadas/linhas telefônicas sorteadas) observadas nos diferentes estratos.

Todas as estimativas para cada uma das 27 cidades que fazem parte do sistema Vigitel incorporam o peso final de ponderação resultante da multiplicação dos três fatores de ponderação detalhados nos parágrafos anteriores. Para as estimativas relativas ao conjunto da população adulta das 27 cidades, multiplica-se o peso final de ponderação por um quarto fator de ponderação que leva em conta diferenças entre o contingente populacional das várias cidades e o número semelhante de indivíduos (cerca de dois mil) estudados pelo sistema em cada cidade. Esse fator vem a ser a razão entre a proporção que o total de adultos de uma dada cidade representa no total de adultos das 27 cidades e a proporção que o total de adultos da amostra Vigitel na mesma cidade representa no total de adultos estudados pelo sistema nas 27 cidades. Este último fator de ponderação deve ser utilizado no cálculo das estimativas para o conjunto das cidades estudadas e também pode ser utilizado separadamente para cada cidade.

A frequência dos fatores de risco ou proteção para doenças crônicas é apresentada segundo o sexo para cada uma das cidades incluídas no sistema Vigitel e, adicionalmente, segundo a faixa etária e o nível de escolaridade para o conjunto das 27 cidades. Uma seção dedicada à variação temporal dos indicadores do sistema destaca aqueles cuja frequência, no conjunto das 27 cidades, tenha apresentado variação uniforme (aumento ou redução) e estatisticamente significativa ao longo do período 2006-2008.

Para o processamento de dados e as análises estatísticas divulgadas nesta publicação contou-se com o auxílio do aplicativo “Stata, versão 9”(STATA CORPORATION, 2005), empregando-se comandos que computam estatísticas com intervalos de confiança que levam em conta o emprego de fatores de ponderação.

Aspectos éticos

Por se tratar de entrevista por telefone, o consentimento livre e esclarecido foi substituído pelo consentimento verbal, obtido por ocasião dos contatos telefônicos com os entrevistados. O projeto Vigitel foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para Seres Humanos, do Ministério da Saúde.

ESTIMATIVAS PARA 2008

A seguir, são apresentadas estimativas do sistema Vigitel para a população adulta de cada uma das capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal e para o conjunto da população adulta dessas 27 cidades. Essas estimativas fornecem a frequência de fatores de risco ou proteção para doenças crônicas agrupados por temas que envolvem: hábito de fumar, excesso de peso e obesidade, padrões de alimentação, padrões de atividade física, consumo de bebidas alcoólicas, autoavaliação do estado de saúde, prevenção de câncer e morbidade referida. A frequência dos fatores de risco ou proteção é apresentada segundo o sexo para cada uma das 27 cidades estudadas e segundo o sexo, a faixa etária e a escolaridade para o conjunto das 27 cidades.

Tabagismo

O sistema Vigitel produz estimativas de vários indicadores do hábito de fumar entre adultos, levando em conta, entre outros aspectos, frequência, intensidade e idade do início do hábito de fumar. Nesta publicação, apresentam-se estimativas referentes à frequência de fumantes e ex-fumantes, considerando-se fumante todo indivíduo que fuma, independentemente da frequência e intensidade do hábito de fumar, e ex-fumante todo indivíduo que, tendo fumado no passado, não mais o faz. Adicionalmente, este ano, é apresentada a frequência de indivíduos que declaram fumar 20 ou mais cigarros por dia.

Frequência de fumantes

A frequência de adultos que fumam variou entre 9,7%, em Maceió, e 20,9%, em São Paulo. O hábito de fumar foi cerca de duas a três vezes mais frequente entre homens do que entre mulheres nas cidades de Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Palmas, São Luís, São Paulo e Teresina. As maiores frequências de fumantes foram encontradas, entre homens, em São Paulo (27,7%), Macapá (24,8%) e Boa Vista (23,3%) e, entre mulheres, em Rio Branco (17,7%), Porto Alegre (17,5%) e Belo Horizonte (16,5%). As menores frequências de fumantes no sexo masculino ocorreram em Recife (12,0%), Salvador (12,4%) e Maceió (13,5%) e, no sexo feminino, em São Luís (4,6%), João Pessoa (6,3%) e Palmas (6,5%) (Tabela 1 e Figuras 1 e 2).

Tabela 1 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) fumantes, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Aracaju	12,0	9,3 - 14,7	16,7	11,6 - 21,7	8,2	5,6 - 10,8				
Belém	13,5	10,7 - 16,2	19,4	14,9 - 23,9	8,4	5,1 - 11,6				
Belo Horizonte	19,2	15,4 - 23,0	22,4	17,9 - 27,0	16,5	10,5 - 22,4				
Boa Vista	17,3	13,4 - 21,2	23,3	16,6 - 30,0	11,4	7,7 - 15,0				
Campo Grande	18,8	15,6 - 21,9	23,2	18,2 - 28,2	14,8	10,9 - 18,6				
Cuiabá	13,7	11,1 - 16,3	17,2	12,5 - 21,8	10,5	8,1 - 13,0				
Curitiba	18,2	15,7 - 20,7	21,2	17,3 - 25,1	15,5	12,3 - 18,7				
Florianópolis	17,5	15,0 - 20,1	20,0	16,1 - 23,9	15,3	11,9 - 18,7				
Fortaleza	11,7	9,3 - 14,0	17,1	12,5 - 21,7	7,2	5,4 - 9,1				
Goiânia	14,0	11,5 - 16,6	17,1	13,4 - 20,7	11,4	7,9 - 14,9				
João Pessoa	11,5	7,0 - 16,0	17,8	8,7 - 26,9	6,3	4,3 - 8,3				
Macapá	16,0	12,6 - 19,4	24,8	18,9 - 30,7	7,7	4,9 - 10,6				
Maceió	9,7	7,4 - 12,0	13,5	9,1 - 17,9	6,6	4,6 - 8,5				
Manaus	13,5	10,7 - 16,3	20,7	15,7 - 25,8	6,9	4,8 - 8,9				
Natal	12,7	10,2 - 15,2	15,0	10,9 - 19,0	10,8	7,8 - 13,9				
Palmas	13,1	9,1 - 17,2	19,7	12,4 - 27,0	6,5	4,1 - 9,0				
Porto Alegre	19,4	16,9 - 21,9	21,8	17,8 - 25,9	17,5	14,4 - 20,5				
Porto Velho	17,9	14,8 - 21,0	22,0	17,1 - 26,9	13,9	10,3 - 17,5				
Recife	10,4	8,4 - 12,4	12,0	8,4 - 15,5	9,2	7,0 - 11,4				
Rio Branco	18,0	13,6 - 22,4	18,4	12,3 - 24,5	17,7	11,3 - 24,0				
Rio de Janeiro	16,6	13,9 - 19,4	19,0	14,2 - 23,9	14,6	11,7 - 17,5				
Salvador	10,0	8,0 - 12,1	12,4	8,9 - 15,9	8,1	5,7 - 10,4				
São Luís	10,3	8,0 - 12,5	17,1	12,7 - 21,5	4,6	3,0 - 6,2				
São Paulo	20,9	17,0 - 24,9	27,7	20,3 - 35,1	15,1	12,5 - 17,6				
Teresina	12,8	9,9 - 15,7	18,3	13,3 - 23,3	8,3	5,1 - 11,4				
Vitória	13,0	9,9 - 16,1	13,9	10,8 - 17,0	12,2	7,2 - 17,3				
Distrito Federal	15,8	12,7 - 18,8	17,4	12,7 - 22,1	14,4	10,4 - 18,3				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

*Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 1 – Percentual de homens (≥ 18 anos) fumantes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 2 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) fumantes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas pelo Vigitel, a frequência de fumantes foi de 16,1%, sendo maior no sexo masculino (20,5%) do que no sexo feminino (12,4%). Entre homens, a frequência de fumantes se mostrou relativamente estável até os 64 anos de idade (cerca de 20%), declinando para 13% na faixa etária de 65 ou mais anos de idade. Entre mulheres, a frequência de fumantes aumentou com a idade ao longo das faixas etárias entre 18 e 54 anos (de 9% para 17%), declinando, respectivamente, para 15,1% e 6,4% nas faixas etárias subsequentes. A frequência do hábito de fumar foi particularmente alta entre homens e mulheres com até oito anos de escolaridade (26,6% e 14,6%, respectivamente), excedendo em duas vezes a frequência observada entre indivíduos com maior escolaridade (Tabela 2).

Tabela 2 – Percentual de fumantes no conjunto da população adulta das capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)										
18 a 24	16,5	12,0 - 20,9	24,2	16,1 - 32,3	9,3	6,6 - 12,0				
25 a 34	15,6	13,7 - 17,5	20,3	17,0 - 23,5	11,4	9,5 - 13,3				
35 a 44	16,4	15,0 - 17,8	18,8	16,5 - 21,0	14,3	12,6 - 16,0				
45 a 54	19,7	18,0 - 21,4	21,9	19,1 - 24,8	17,8	15,7 - 19,8				
55 a 64	17,1	15,1 - 19,2	19,7	16,3 - 23,2	15,1	12,7 - 17,4				
65 e mais	9,1	7,6 - 10,6	13,4	10,2 - 16,6	6,4	4,9 - 7,8				
Anos de escolaridade										
0 a 8	20,1	18,1 - 22,2	26,6	22,8 - 30,3	14,6	13,0 - 16,1				
9 a 11	11,6	10,7 - 12,4	14,1	12,6 - 15,5	9,5	8,5 - 10,6				
12 e mais	11,5	10,4 - 12,6	12,6	10,9 - 14,4	10,5	9,1 - 11,9				
Total	16,1	15,0 - 17,3	20,5	18,3 - 22,7	12,4	11,5 - 13,3				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Frequência de ex-fumantes

A frequência de adultos que declararam ter fumado no passado variou entre 16,1%, em Aracaju, e 26,3%, em Macapá. Observa-se que, em 14 das 27 cidades avaliadas, o percentual de ex-fumantes foi mais comum no sexo masculino. As maiores frequências de ex-fumantes foram observadas, entre os homens, em Cuiabá (32%), Macapá (31,9%) e Belém (29,5%) e, entre as mulheres, em Fortaleza (25,3%), Rio Branco (23,8%) e Porto Alegre (22,1%). As menores frequências de ex-fumantes entre os homens foram observadas em Palmas (18,3%), Aracaju (20,3%) e Natal (22,4%); as menores frequências de ex-fumantes no sexo feminino ocorreram em Aracaju (12,7%), Vitória (14,7%) e Goiânia (15,5%) (Tabela 3 e Figuras 3 e 4).

Tabela 3 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) ex-fumantes, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo										
	Total				Masculino				Feminino		
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%	
Aracaju	16,1	13,4	-	18,9	20,3	15,2	-	25,5	12,7	10,1	- 15,3
Belém	23,7	20,8	-	26,6	29,5	25,2	-	33,8	18,7	14,8	- 22,6
Belo Horizonte	20,2	17,9	-	22,5	25,5	21,7	-	29,3	15,7	13,0	- 18,4
Boa Vista	23,8	20,6	-	27,0	27,4	22,3	-	32,5	20,2	16,3	- 24,1
Campo Grande	21,6	18,9	-	24,3	25,8	21,3	-	30,3	17,7	14,6	- 20,9
Cuiabá	24,6	21,2	-	28,1	32,0	26,6	-	37,4	17,9	13,6	- 22,2
Curitiba	22,4	19,8	-	25,1	24,9	21,1	-	28,7	20,3	16,5	- 24,0
Florianópolis	23,5	20,9	-	26,2	28,8	24,5	-	33,1	18,8	15,6	- 21,9
Fortaleza	26,0	22,5	-	29,6	26,9	22,1	-	31,8	25,3	20,1	- 30,5
Goiânia	19,9	17,2	-	22,6	24,9	20,9	-	28,8	15,5	11,9	- 19,1
João Pessoa	24,5	20,7	-	28,3	28,5	21,6	-	35,5	21,1	17,2	- 25,1
Macapá	26,3	22,7	-	29,9	31,9	26,2	-	37,6	21,1	16,6	- 25,6
Maceió	21,6	18,3	-	24,9	25,9	20,0	-	31,7	18,0	14,5	- 21,6
Manaus	24,3	21,4	-	27,1	29,3	24,7	-	34,0	19,6	16,2	- 23,0
Natal	20,2	17,3	-	23,2	22,4	17,8	-	26,9	18,5	14,5	- 22,5
Palmas	18,9	15,4	-	22,5	18,3	14,3	-	22,3	19,6	13,8	- 25,4
Porto Alegre	24,5	21,6	-	27,5	27,5	23,0	-	32,0	22,1	18,1	- 26,0
Porto Velho	21,7	19,0	-	24,4	25,8	21,6	-	30,1	17,7	14,4	- 21,0
Recife	20,3	17,7	-	22,9	24,5	19,8	-	29,2	16,9	14,2	- 19,7
Rio Branco	25,5	21,9	-	29,2	27,4	21,7	-	33,1	23,8	19,2	- 28,4
Rio de Janeiro	21,1	18,8	-	23,4	25,9	21,8	-	30,1	17,1	14,7	- 19,5
Salvador	19,7	17,2	-	22,2	23,5	19,5	-	27,5	16,6	13,5	- 19,7
São Luís	21,7	19,0	-	24,5	26,3	21,9	-	30,6	18,0	14,4	- 21,5
São Paulo	20,8	18,4	-	23,1	23,8	19,8	-	27,9	18,1	15,4	- 20,9
Teresina	19,7	17,1	-	22,3	24,5	19,9	-	29,2	15,7	12,9	- 18,6
Vitória	19,6	17,0	-	22,2	25,4	20,9	-	29,9	14,7	11,8	- 17,7
Distrito Federal	21,8	19,1	-	24,5	23,3	19,3	-	27,3	20,4	16,8	- 24,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 3 – Percentual de homens (≥ 18 anos) ex-fumantes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 4 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) ex-fumantes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas pelo Vigitel, a frequência de ex-fumantes foi de 21,6%, sendo maior no sexo masculino (25,3%) do que no sexo feminino (18,4%). Entre homens, a frequência de indivíduos que declararam abandono do hábito de fumar aumenta intensamente com a idade: ex-fumantes representam 10,8% do total de homens entre 18 e 24 anos e 53,8% entre aqueles com 65 ou mais anos de idade. No caso das mulheres, também se observa aumento da frequência de ex-fumantes até os 54 anos de idade, havendo ligeiro declínio dessa condição nas idades subsequentes. Assim como no caso da frequência de fumantes atuais, a frequência de ex-fumantes tendeu a ser maior entre homens e mulheres com até oito anos de escolaridade, ainda que a diferença com os estratos de maior escolaridade, no caso da população masculina, tenha sido relativamente menor (Tabela 4).

Tabela 4 – Percentual de ex-fumantes no conjunto da população adulta das capitais dos estados brasileiros e do Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)										
18 a 24	10,9	9,1 - 12,6	10,8	8,4 - 13,2	11,0	8,4 - 13,5				
25 a 34	14,9	13,3 - 16,5	17,9	15,3 - 20,5	12,1	10,3 - 14,0				
35 a 44	20,4	18,9 - 21,8	22,7	20,4 - 25,1	18,3	16,5 - 20,1				
45 a 54	33,8	31,9 - 35,7	38,4	35,2 - 41,6	29,9	27,6 - 32,2				
55 a 64	36,4	34,0 - 38,8	47,2	43,1 - 51,4	27,8	25,1 - 30,5				
65 e mais	35,7	33,4 - 38,0	53,8	49,4 - 58,2	24,3	21,9 - 26,6				
Anos de escolaridade										
0 a 8	25,1	23,8 - 26,5	29,2	26,8 - 31,5	21,7	20,1 - 23,3				
9 a 11	17,0	16,1 - 17,9	19,9	18,5 - 21,3	14,7	13,6 - 15,8				
12 e mais	18,5	17,2 - 19,8	22,6	20,6 - 24,7	14,7	13,3 - 16,2				
Total	21,6	20,8 - 22,4	25,3	24,0 - 26,7	18,4	17,5 - 19,3				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Frequência do consumo de 20 ou mais cigarros por dia

A frequência de indivíduos que declararam fumar 20 ou mais cigarros por dia variou entre 2,1% em Salvador e 8,2% em Porto Alegre. O consumo intenso de cigarros tendeu a ser mais comum no sexo masculino do que no sexo feminino. Entre os homens, as maiores frequências foram observadas em João Pessoa (10,8%), Campo Grande (9,5%) e Belo Horizonte (9,2%) e, entre as mulheres, em Porto Alegre (8,1%), Belo Horizonte (6,9%) e Goiânia (4,6%). As menores frequências do consumo intenso de cigarros entre os homens foram observadas em Salvador e Vitória (2,8%), Maceió (3,8%) e Teresina (3,9%); as menores frequências do consumo intenso de cigarros no sexo feminino ocorreram em São Luís (0,7%), Aracaju (1,1%) e Manaus (1,4%) (Tabela 5 e Figuras 5 e 6).

Tabela 5 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo										
	Total			Masculino				Feminino			
	%	IC95%		%	IC95%			%	IC95%		
Aracaju	4,3	2,6	- 6,0	8,2	4,6	- 11,7		1,1	0,2	- 2,1	
Belém	3,4	1,5	- 5,2	4,9	2,2	- 7,7		2,0	0,0	- 4,4	
Belo Horizonte	7,9	4,4	- 11,5	9,2	6,1	- 12,3		6,9	0,8	- 12,9	
Boa Vista	3,2	1,9	- 4,4	4,5	2,2	- 6,7		1,9	0,8	- 3,0	
Campo Grande	5,6	3,8	- 7,3	9,5	6,1	- 12,9		2,0	0,9	- 3,1	
Cuiabá	4,9	2,9	- 6,9	7,9	3,9	- 11,8		2,2	1,2	- 3,3	
Curitiba	6,1	4,7	- 7,5	8,3	5,9	- 10,6		4,2	2,5	- 5,8	
Florianópolis	5,6	4,0	- 7,1	6,8	4,7	- 9,0		4,4	2,3	- 6,6	
Fortaleza	3,2	2,0	- 4,3	4,3	2,2	- 6,3		2,3	1,1	- 3,6	
Goiânia	5,7	3,7	- 7,7	7,0	4,6	- 9,4		4,6	1,4	- 7,8	
João Pessoa	6,1	1,6	- 10,6	10,8	1,3	- 20,2		2,3	0,9	- 3,6	
Macapá	4,2	2,5	- 6,0	7,1	3,7	- 10,5		1,5	0,4	- 2,7	
Maceió	2,8	1,3	- 4,2	3,8	0,9	- 6,8		1,8	0,6	- 3,1	
Manaus	3,0	1,4	- 4,7	4,8	1,5	- 8,1		1,4	0,7	- 2,0	
Natal	5,7	3,8	- 7,6	7,7	4,5	- 11,0		4,1	1,8	- 6,3	
Palmas	3,3	1,2	- 5,4	4,3	0,4	- 8,3		2,2	0,9	- 3,6	
Porto Alegre	8,2	6,4	- 9,9	8,2	5,9	- 10,5		8,1	5,6	- 10,6	
Porto Velho	5,1	3,2	- 7,0	5,9	2,9	- 9,0		4,3	2,1	- 6,5	
Recife	3,6	2,4	- 4,9	4,6	2,1	- 7,0		2,9	1,7	- 4,1	
Rio Branco	4,6	2,2	- 7,0	4,8	2,0	- 7,6		4,4	0,5	- 8,3	
Rio de Janeiro	6,0	4,3	- 7,7	7,7	4,6	- 10,8		4,5	2,8	- 6,2	
Salvador	2,1	1,1	- 3,1	2,8	1,1	- 4,5		1,5	0,4	- 2,7	
São Luís	2,7	1,3	- 4,2	5,1	2,1	- 8,2		0,7	0,0	- 1,4	
São Paulo	5,4	4,2	- 6,7	7,2	4,9	- 9,5		3,9	2,7	- 5,1	
Teresina	3,1	1,6	- 4,6	3,9	1,9	- 6,0		2,4	0,3	- 4,5	
Vitória	2,3	1,5	- 3,0	2,8	1,6	- 4,0		1,8	0,9	- 2,7	
Distrito Federal	3,9	2,6	- 5,3	5,0	3,1	- 6,8		3,0	1,0	- 5,0	

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Quantidade ponderada para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 5 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 6 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades, a frequência de adultos que declararam fumar 20 ou mais cigarros por dia foi de 4,9%, sendo maior no sexo masculino (6,5%) do que no sexo feminino (3,6%). Entre homens, a frequência do consumo intenso de cigarros tendeu a aumentar com a idade, mais do que duplicando entre as faixas etárias dos 18-24 aos 55-64 anos de idade, declinando a partir dos 65 anos. A relação com a idade foi menos clara no caso das mulheres, notando-se, entretanto, o mesmo declínio a partir dos 65 anos de idade. A frequência do consumo de 20 ou mais cigarros por dia foi particularmente alta entre homens e mulheres com até oito anos de escolaridade (8,7% e 4,7%, respectivamente), excedendo quase duas vezes a frequência observada entre indivíduos com maior escolaridade (Tabela 6).

Tabela 6 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)										
18 a 24	3,4	2,0 - 4,8	3,9	1,9 - 5,8	2,9	0,8 - 4,9				
25 a 34	4,1	3,1 - 5,1	5,6	3,8 - 7,4	2,7	1,8 - 3,6				
35 a 44	5,2	4,3 - 6,0	6,7	5,3 - 8,1	3,8	2,8 - 4,8				
45 a 54	7,4	6,2 - 8,5	9,1	7,1 - 11,0	5,9	4,6 - 7,2				
55 a 64	7,4	5,9 - 8,9	10,6	7,9 - 13,3	4,9	3,2 - 6,5				
65 e mais	3,9	2,8 - 5,1	7,3	4,6 - 10,0	1,8	1,0 - 2,7				
Anos de escolaridade										
0 a 8	6,6	5,7 - 7,4	8,7	7,3 - 10,2	4,7	3,6 - 5,7				
9 a 11	2,7	2,3 - 3,1	3,6	2,9 - 4,3	2,1	1,6 - 2,5				
12 e mais	3,5	2,9 - 4,1	4,4	3,4 - 5,4	2,7	2,1 - 3,4				
Total	4,9	4,4 - 5,4	6,5	5,7 - 7,3	3,6	3,0 - 4,1				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Quantidade ponderada para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Excesso de peso e obesidade

Em estudos epidemiológicos, o diagnóstico da obesidade é feito a partir do Índice de Massa Corporal – IMC, obtido pela divisão entre o peso (medido em quilogramas) e o quadrado da altura (medida em metros) (WHO, 2000). O excesso de peso é diagnosticado quando o IMC alcança valor igual ou superior a 25 kg/m², enquanto a obesidade é diagnosticada a partir do IMC de 30 kg/m². Esses critérios são os utilizados pelo sistema Vigitel para analisar as informações sobre peso e altura fornecidas pelos entrevistados.

Excesso de peso

A frequência de adultos com excesso de peso variou entre 36,7%, em Teresina, e 49,0%, em Porto Alegre. O excesso de peso foi mais frequente em homens do que em mulheres nas cidades de Belém, Campo Grande, Florianópolis, Palmas, Porto Alegre, Rio Branco, São Luís, São Paulo, Vitória e Distrito Federal. As maiores frequências de excesso de peso foram observadas, no caso de homens, em Rio Branco (56,4%), Campo Grande e Porto Alegre (54,0%) e São Paulo (53,4%) e, no caso de mulheres, em Cuiabá (45,2%), Curitiba e Porto Alegre (44,6%) e Macapá (43,5%). As menores frequências de excesso de peso ocorreram, entre homens, em Teresina (38,3%), Salvador (41,5%) e Manaus (42,2%) e, entre mulheres, em Palmas (30,1%), São Luís (31,3%) e Distrito Federal (34,9%) (Tabela 7 e Figuras 7 e 8).

Tabela 7 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) com excesso de peso (Índice de Massa Corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%		
Aracaju	41,9	38,1	-	45,8	42,9	36,8	-	49,0	41,0	36,2	-	45,9
Belém	45,9	42,3	-	49,5	52,1	47,1	-	57,1	39,3	34,2	-	44,4
Belo Horizonte	43,3	39,5	-	47,2	46,7	41,8	-	51,6	40,2	34,2	-	46,2
Boa Vista	45,7	41,3	-	50,0	47,8	41,5	-	54,2	43,1	37,6	-	48,7
Campo Grande	47,5	44,0	-	51,1	54,0	48,6	-	59,4	41,0	36,6	-	45,5
Cuiabá	48,4	44,9	-	51,9	51,5	46,0	-	57,1	45,2	41,0	-	49,5
Curitiba	46,6	43,5	-	49,7	48,9	44,2	-	53,6	44,6	40,5	-	48,7
Florianópolis	42,0	38,9	-	45,1	48,3	43,7	-	52,9	36,1	32,1	-	40,2
Fortaleza	45,3	41,3	-	49,2	50,3	44,2	-	56,3	40,8	35,6	-	46,0
Goiânia	44,4	40,4	-	48,5	48,6	43,7	-	53,6	40,4	33,9	-	47,0
João Pessoa	44,9	40,4	-	49,5	47,1	39,2	-	55,0	42,9	38,0	-	47,8
Macapá	47,7	43,5	-	52,0	51,7	45,5	-	58,0	43,5	37,6	-	49,4
Maceió	42,5	38,2	-	46,8	47,9	41,0	-	54,8	37,3	32,0	-	42,5
Manaus	42,1	38,7	-	45,5	42,2	37,1	-	47,3	42,0	37,4	-	46,6
Natal	42,9	39,4	-	46,5	45,9	40,3	-	51,4	40,2	35,7	-	44,8
Palmas	38,9	34,1	-	43,7	46,9	39,6	-	54,2	30,1	24,1	-	36,1
Porto Alegre	49,0	45,7	-	52,2	54,0	49,0	-	59,0	44,6	40,2	-	49,0
Porto Velho	44,1	40,5	-	47,7	47,0	41,8	-	52,1	40,9	35,8	-	46,0
Recife	46,6	43,0	-	50,2	51,6	45,8	-	57,4	41,9	37,5	-	46,2
Rio Branco	48,6	43,0	-	54,2	56,4	48,7	-	64,1	40,3	32,8	-	47,7
Rio de Janeiro	43,8	40,6	-	46,9	45,2	40,2	-	50,3	42,4	38,4	-	46,3
Salvador	41,0	37,8	-	44,2	41,5	36,7	-	46,3	40,5	36,2	-	44,9
São Luís	38,7	35,4	-	41,9	46,1	41,1	-	51,2	31,3	27,3	-	35,4
São Paulo	45,6	42,2	-	49,0	53,4	47,5	-	59,2	38,6	34,7	-	42,5
Teresina	36,7	32,9	-	40,5	38,3	32,8	-	43,7	35,1	29,8	-	40,5
Vitória	42,3	39,1	-	45,5	48,6	43,4	-	53,9	36,6	32,7	-	40,4
Distrito Federal	39,6	36,4	-	42,9	44,9	39,7	-	50,1	34,9	30,8	-	39,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 7 – Percentual de homens (≥ 18 anos) com excesso de peso ($\text{IMC} \geq 25 \text{ kg/m}^2$), segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 8 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) com excesso de peso ($\text{IMC} \geq 25 \text{ kg/m}^2$), segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades, a frequência do excesso de peso foi de 44,2%, sendo maior entre homens (48,6%) do que entre mulheres (40,0%). Em ambos os sexos, a frequência dessa condição tende a aumentar com a idade, declinando apenas a partir dos 65 anos. O aumento é particularmente notável entre as faixas etárias 18-24 e 35-44 anos, quando a frequência do excesso de peso aumenta cerca de duas vezes entre homens e mulheres. A relação entre frequência de excesso de peso e escolaridade é diferente entre homens e mulheres. No sexo masculino, a frequência de excesso de peso aumenta com a escolaridade, alcançando 45,9% no estrato de até oito anos de escolaridade e 58,2% no estrato de 12 ou mais anos de escolaridade. No sexo feminino, a relação é inversa: 47,9% no estrato de menor escolaridade e 31,0% no estrato de maior escolaridade (Tabela 8).

Tabela 8 – Percentual de indivíduos com excesso de peso (Índice de Massa Corporal ≥ 25 kg/m²) no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)										
18 a 24	24,0	21,2 - 26,9	25,1	21,1 - 29,1	23,1	18,9 - 27,2				
25 a 34	40,7	38,5 - 42,9	47,9	44,4 - 51,4	33,5	30,9 - 36,1				
35 a 44	49,9	48,1 - 51,8	57,5	54,7 - 60,3	42,7	40,3 - 45,2				
45 a 54	56,1	54,0 - 58,1	62,3	59,2 - 65,5	50,3	47,6 - 53,0				
55 a 64	59,2	56,6 - 61,8	60,3	56,2 - 64,4	58,3	54,9 - 61,6				
65 e mais	54,0	51,4 - 56,6	51,6	47,2 - 56,1	55,8	52,7 - 59,0				
Anos de escolaridade										
0 a 8	46,9	44,9 - 48,9	45,9	42,9 - 48,8	47,9	45,4 - 50,5				
9 a 11	39,9	38,6 - 41,1	47,8	45,8 - 49,8	33,2	31,6 - 34,8				
12 e mais	44,0	42,4 - 45,7	58,2	55,7 - 60,7	31,0	29,0 - 32,9				
Total	44,2	43,1 - 45,3	48,6	46,8 - 50,4	40,0	38,7 - 41,4				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Obesidade

A frequência de adultos obesos variou entre 9,7%, em São Luís, e 15,9%, em Porto Alegre. Em todas as cidades avaliadas, a obesidade foi igual entre homens e mulheres. As maiores frequências de obesidade foram observadas, no caso de homens, em Boa Vista (16,4%), João Pessoa (16,0%) e Porto Alegre (15,6%) e, no caso de mulheres, em Macapá (16,6%), Porto Alegre (16,1%) e Aracaju (16,0%). As menores frequências de obesidade ocorreram, entre homens, em São Luís (8,0%), Salvador (9,2%) e Goiânia (9,6%) e, entre mulheres, em Teresina (9,7%), Palmas (10,2%) e Florianópolis (10,3%) (Tabela 9 e Figuras 9 e 10).

Tabela 9 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) com obesidade (Índice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Aracaju	13,6	11,2 - 16,0	11,0	8,2 - 13,9	16,0	12,3 - 19,8				
Belém	12,5	10,2 - 14,7	12,7	9,5 - 15,9	12,2	9,1 - 15,3				
Belo Horizonte	12,1	9,8 - 14,3	11,5	8,1 - 14,9	12,6	9,6 - 15,6				
Boa Vista	14,8	11,0 - 18,7	16,4	9,9 - 22,9	13,0	9,8 - 16,2				
Campo Grande	13,7	11,7 - 15,7	13,8	10,7 - 16,8	13,7	11,0 - 16,3				
Cuiabá	14,1	11,9 - 16,4	14,7	11,4 - 17,9	13,6	10,6 - 16,6				
Curitiba	14,0	11,8 - 16,1	13,4	10,6 - 16,2	14,5	11,3 - 17,6				
Florianópolis	11,9	9,7 - 14,1	13,6	9,8 - 17,4	10,3	8,0 - 12,7				
Fortaleza	14,8	12,4 - 17,2	15,1	11,5 - 18,7	14,4	11,3 - 17,6				
Goiânia	11,3	9,0 - 13,6	9,6	7,3 - 12,0	12,9	9,1 - 16,7				
João Pessoa	13,9	11,3 - 16,4	16,0	11,4 - 20,6	11,8	9,3 - 14,4				
Macapá	14,7	11,7 - 17,7	13,0	9,5 - 16,4	16,6	11,7 - 21,5				
Maceió	13,9	10,9 - 16,9	14,8	10,2 - 19,4	13,1	9,2 - 16,9				
Manaus	13,8	11,7 - 16,0	12,7	10,0 - 15,5	14,9	11,7 - 18,2				
Natal	11,6	9,7 - 13,4	11,5	8,7 - 14,3	11,6	9,1 - 14,1				
Palmas	10,2	7,6 - 12,9	10,3	7,2 - 13,4	10,2	5,8 - 14,6				
Porto Alegre	15,9	13,4 - 18,3	15,6	12,2 - 19,0	16,1	12,7 - 19,5				
Porto Velho	13,0	10,8 - 15,3	12,6	9,6 - 15,6	13,5	10,1 - 16,8				
Recife	14,0	11,3 - 16,6	15,4	10,8 - 20,1	12,6	9,9 - 15,3				
Rio Branco	15,0	11,4 - 18,7	14,6	8,8 - 20,3	15,5	11,2 - 19,9				
Rio de Janeiro	12,8	10,8 - 14,8	12,3	9,1 - 15,6	13,2	10,9 - 15,5				
Salvador	12,1	10,1 - 14,2	9,2	6,6 - 11,8	15,0	11,8 - 18,2				
São Luís	9,7	7,8 - 11,5	8,0	5,8 - 10,3	11,3	8,4 - 14,2				
São Paulo	13,7	11,7 - 15,7	15,2	11,8 - 18,6	12,3	10,1 - 14,6				
Teresina	10,8	8,5 - 13,1	12,0	8,3 - 15,7	9,7	6,9 - 12,5				
Vitória	11,1	9,3 - 12,9	11,8	9,0 - 14,6	10,4	8,1 - 12,7				
Distrito Federal	11,8	9,9 - 13,7	10,4	7,4 - 13,4	13,0	10,6 - 15,4				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 9 – Percentual de homens (≥ 18 anos) com obesidade ($\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$), segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 10 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) com obesidade ($\text{IMC} \geq 30 \text{ kg/m}^2$), segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades, a frequência de adultos obesos foi de 13,1%. No sexo masculino, a frequência da obesidade aumenta mais de três vezes entre 18-24 e 45-64 anos, declinando na faixa etária subsequente. Entre mulheres, a frequência da obesidade aumenta mais de seis vezes entre 18-24 e 55-64 anos e declina apenas a partir dos 65 anos. A relação entre frequência de obesidade e escolaridade é fortemente inversa no sexo feminino: 17,4% das mulheres são obesas no estrato de menor de escolaridade e 8,6% são obesas no estrato de maior escolaridade. No sexo masculino, a frequência de obesos é semelhante (em torno de 12-14%) em todos os estratos de escolaridade (Tabela 10).

Tabela 10 – Percentual de indivíduos com obesidade (Índice de Massa Corporal ≥ 30 kg/m²) no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%		IC95%		%		IC95%		%		IC95%	
Idade (anos)												
18 a 24	4,8	3,7	-	5,8	5,5	3,7	-	7,2	4,1	2,8	-	5,3
25 a 34	11,5	10,0	-	13,1	12,7	10,1	-	15,2	10,4	8,7	-	12,1
35 a 44	14,8	13,5	-	16,2	16,0	13,9	-	18,1	13,7	12,0	-	15,4
45 a 54	18,2	16,5	-	19,9	18,5	15,7	-	21,2	17,9	15,9	-	19,9
55 a 64	21,2	19,0	-	23,4	18,2	15,0	-	21,4	23,9	20,8	-	26,9
65 e mais	17,3	15,3	-	19,4	11,7	8,7	-	14,7	21,6	18,8	-	24,3
Anos de escolaridade												
0 a 8	15,4	14,2	-	16,6	13,4	11,6	-	15,2	17,4	15,9	-	18,9
9 a 11	10,5	9,8	-	11,3	12,0	10,8	-	13,3	9,3	8,3	-	10,2
12 e mais	11,3	10,2	-	12,3	14,2	12,4	-	15,9	8,6	7,4	-	9,8
Total	13,1	12,5	-	13,8	13,1	12,0	-	14,2	13,1	12,3	-	13,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Consumo alimentar

Nesta publicação, são focalizados os indicadores do consumo de alimentos saudáveis e não saudáveis. No primeiro caso, avalia-se a frequência de consumo de frutas e hortaliças (legumes e verduras). No segundo caso, avalia-se o hábito de consumir carnes vermelhas gordurosas ou frango com pele, sem a remoção da gordura visível desses alimentos, o hábito de consumir leite integral e o consumo frequente de refrigerantes.

Consumo regular de frutas e hortaliças

A frequência de adultos que consomem frutas e hortaliças em 5 ou mais dias da semana, doravante denominado consumo regular de frutas e hortaliças, variou entre 19,5%, em Belém, e 41,6%, em Florianópolis. O consumo regular de frutas e hortaliças foi mais frequente no sexo feminino nas cidades de Aracaju, Belo Horizonte, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Distrito Federal. As maiores frequências foram encontradas, entre homens, em Natal (35,6%), João Pessoa (35,5%) e Florianópolis (33,9%) e, entre mulheres, em Florianópolis (48,6%), Curitiba (46,5%) e Belo Horizonte (45,3%). As menores frequências do consumo regular de frutas e hortaliças no sexo masculino ocorreram em Belém (15,9%), Macapá e Rio Branco (18,1%) e Boa Vista (18,2%) e, no sexo feminino, em Rio Branco (22,4%), Belém (22,6%) e São Luís (23,5%) (Tabela 11 e Figuras 11 e 12).

Tabela 11 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem frutas e hortaliças 5 ou mais dias por semana, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%		
Aracaju	32,0	28,5	-	35,4	22,5	18,3	-	26,7	39,7	34,9	-	44,5
Belém	19,5	17,1	-	21,9	15,9	12,7	-	19,1	22,6	19,1	-	26,1
Belo Horizonte	38,6	35,3	-	42,0	30,8	26,2	-	35,3	45,3	40,3	-	50,4
Boa Vista	22,9	19,8	-	26,0	18,2	13,9	-	22,5	27,5	23,1	-	31,9
Campo Grande	31,9	28,9	-	35,0	22,7	18,5	-	27,0	40,2	36,1	-	44,4
Cuiabá	27,5	24,5	-	30,4	20,1	16,0	-	24,3	34,2	30,1	-	38,3
Curitiba	37,5	34,6	-	40,4	27,3	23,3	-	31,3	46,5	42,5	-	50,5
Florianópolis	41,6	38,6	-	44,6	33,9	29,5	-	38,2	48,6	44,5	-	52,7
Fortaleza	29,6	26,1	-	33,1	25,5	20,9	-	30,2	32,9	27,9	-	38,0
Goiânia	34,4	30,5	-	38,3	24,9	20,8	-	29,0	42,6	36,7	-	48,5
João Pessoa	36,5	32,4	-	40,6	35,5	28,3	-	42,8	37,3	32,8	-	41,7
Macapá	22,0	18,8	-	25,3	18,1	13,0	-	23,2	25,7	21,5	-	29,9
Maceió	28,5	25,1	-	31,9	23,5	18,7	-	28,3	32,7	28,1	-	37,3
Manaus	24,1	21,2	-	27,0	24,0	19,2	-	28,7	24,3	20,8	-	27,7
Natal	37,6	34,2	-	41,0	35,6	30,1	-	41,1	39,2	34,8	-	43,6
Palmas	29,1	25,0	-	33,2	23,3	17,8	-	28,8	35,0	29,1	-	40,9
Porto Alegre	39,3	36,3	-	42,2	33,0	28,5	-	37,4	44,4	40,4	-	48,5
Porto Velho	25,9	22,8	-	28,9	18,7	15,0	-	22,4	32,9	28,2	-	37,5
Recife	38,1	34,8	-	41,3	33,5	28,4	-	38,5	41,8	37,6	-	45,9
Rio Branco	20,4	16,6	-	24,2	18,1	12,0	-	24,3	22,4	17,7	-	27,2
Rio de Janeiro	30,3	27,6	-	33,1	21,3	17,7	-	25,0	37,8	34,1	-	41,6
Salvador	27,8	25,0	-	30,6	24,3	20,3	-	28,2	30,8	26,9	-	34,6
São Luís	23,0	20,4	-	25,6	22,4	18,4	-	26,3	23,5	20,1	-	27,0
São Paulo	33,2	30,2	-	36,1	28,1	23,5	-	32,7	37,6	34,0	-	41,2
Teresina	24,6	21,6	-	27,6	20,7	15,9	-	25,4	27,8	23,9	-	31,6
Vitória	35,7	32,6	-	38,9	28,8	24,3	-	33,2	41,6	37,2	-	46,0
Distrito Federal	34,2	31,2	-	37,2	27,9	23,4	-	32,4	39,8	35,8	-	43,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 11 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que consomem frutas e hortaliças 5 ou mais dias por semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 12 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que consomem frutas e hortaliças 5 ou mais dias por semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, a frequência de consumo regular de frutas e hortaliças foi de 31,7%, sendo menor em homens (26%) do que em mulheres (36,6%). Em ambos os sexos, o consumo regular de frutas e hortaliças aumentou com a idade e com o nível da escolaridade dos indivíduos (Tabela 12).

Tabela 12 – Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças 5 ou mais dias da semana no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%		IC95%		%		IC95%		%		IC95%	
Idade (anos)												
18 a 24	22,5	20,0	-	25,0	20,3	16,8	-	23,8	24,6	21,2	-	28,0
25 a 34	28,7	26,7	-	30,6	23,9	20,9	-	26,9	32,9	30,4	-	35,5
35 a 44	31,7	30,1	-	33,3	24,9	22,6	-	27,2	37,6	35,3	-	39,8
45 a 54	37,1	35,2	-	39,0	30,6	27,8	-	33,5	42,6	40,1	-	45,1
55 a 64	40,6	38,1	-	43,1	32,3	28,4	-	36,1	47,2	44,0	-	50,3
65 e mais	45,8	43,4	-	48,3	38,0	33,8	-	42,2	50,8	48,0	-	53,6
Anos de escolaridade												
0 a 8	27,9	26,4	-	29,5	21,6	19,4	-	23,9	33,4	31,4	-	35,4
9 a 11	30,8	29,6	-	32,0	25,6	23,9	-	27,3	35,0	33,4	-	36,6
12 e mais	45,6	44,0	-	47,2	40,4	37,9	-	42,9	50,3	48,3	-	52,4
Total	31,7	30,8	-	32,7	26,0	24,6	-	27,4	36,6	35,4	-	37,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Consumo recomendado de frutas e hortaliças

A Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão diária de pelo menos 400 gramas de frutas e hortaliças (WHO, 2003), o que seria equivalente, aproximadamente, ao consumo de cinco porções desses alimentos. A quantidade de porções de frutas e hortaliças consumidas habitualmente pelos indivíduos é estimada pelo Vigitel a partir de questões sobre o número de frutas ou sucos de frutas consumidos por dia e sobre o hábito de consumir hortaliças cruas (na forma de saladas) ou cozidas no almoço e no jantar. Essas questões são perguntadas apenas para indivíduos que informam consumir frutas e hortaliças em 5 ou mais dias da semana. O cômputo do total diário de porções é feito considerando-se cada fruta ou cada suco

de fruta como equivalente a uma porção. Entretanto, para assegurar a necessária diversificação da dieta, limita-se em três o número máximo de porções diárias computado para frutas e em um o número máximo computado para sucos. No caso de hortaliças, computa-se um número máximo de quatro porções diárias, situação que caracteriza indivíduos que informam o hábito de consumir hortaliças cruas no almoço e no jantar e hortaliças cozidas também no almoço e no jantar.

A frequência de adultos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, doravante denominado consumo recomendado de frutas e hortaliças, foi modesta na maioria das cidades estudadas, variando entre 11,1% em Belém e 24,1% em Florianópolis. O consumo recomendado de frutas e hortaliças tendeu a ser menos frequente no sexo masculino. As maiores frequências foram encontradas, entre homens, em João Pessoa (20,8%), Porto Alegre (20,2%) e Florianópolis (18,5%) e, entre mulheres, em Florianópolis (29,2%), Distrito Federal (26,7%) e Curitiba (26,4%). As menores frequências no sexo masculino ocorreram em Belém (9,6%), Porto Velho (10,1%) e Macapá (10,4%) e, no sexo feminino, em Belém (12,3%), Rio Branco (12,4%) e Manaus (14,4%) (Tabela 13 e Figuras 13 e 14).

Tabela 13 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%		
Aracaju	18,9	15,9	-	21,8	12,6	9,2	-	16,1	24,0	19,5	-	28,4
Belém	11,1	9,4	-	12,7	9,6	7,0	-	12,2	12,3	10,2	-	14,4
Belo Horizonte	21,6	19,0	-	24,2	18,2	14,3	-	22,1	24,5	21,0	-	28,1
Boa Vista	14,3	11,7	-	16,9	11,9	8,2	-	15,5	16,7	13,0	-	20,5
Campo Grande	17,8	15,5	-	20,1	12,0	9,0	-	15,0	23,1	19,6	-	26,5
Cuiabá	17,1	14,7	-	19,4	11,9	8,6	-	15,2	21,8	18,4	-	25,1
Curitiba	20,7	18,6	-	22,9	14,2	11,5	-	16,9	26,4	23,2	-	29,6
Florianópolis	24,1	21,5	-	26,7	18,5	14,8	-	22,2	29,2	25,6	-	32,9
Fortaleza	14,8	12,2	-	17,4	15,2	11,1	-	19,3	14,5	11,2	-	17,7
Goiânia	20,5	18,0	-	23,0	18,4	14,5	-	22,3	22,4	19,0	-	25,7
João Pessoa	20,6	17,0	-	24,2	20,8	14,1	-	27,4	20,4	16,8	-	24,1
Macapá	12,9	10,5	-	15,4	10,4	6,7	-	14,1	15,3	12,0	-	18,5
Maceió	14,5	12,1	-	17,0	10,8	8,1	-	13,5	17,7	13,9	-	21,5
Manaus	15,5	12,9	-	18,2	16,8	12,3	-	21,2	14,4	11,5	-	17,3
Natal	19,7	16,9	-	22,5	17,5	12,9	-	22,0	21,6	17,9	-	25,2
Palmas	17,9	14,4	-	21,4	13,1	8,8	-	17,3	22,8	17,4	-	28,3
Porto Alegre	23,1	20,6	-	25,7	20,2	16,3	-	24,1	25,5	22,2	-	28,9
Porto Velho	14,5	12,2	-	16,9	10,1	7,6	-	12,6	18,8	14,9	-	22,7
Recife	20,3	17,5	-	23,0	17,2	13,3	-	21,1	22,7	18,9	-	26,6
Rio Branco	12,2	8,7	-	15,7	11,9	5,8	-	18,0	12,4	8,7	-	16,1
Rio de Janeiro	20,0	17,5	-	22,5	14,4	11,3	-	17,6	24,7	21,1	-	28,3
Salvador	15,6	13,4	-	17,8	13,8	10,9	-	16,6	17,2	13,9	-	20,4
São Luís	15,5	13,2	-	17,8	13,7	10,6	-	16,9	16,9	13,7	-	20,2
São Paulo	21,8	19,5	-	24,1	16,6	13,5	-	19,7	26,4	23,3	-	29,5
Teresina	13,4	11,2	-	15,5	11,1	8,0	-	14,2	15,2	12,2	-	18,2
Vitória	21,3	18,7	-	23,8	16,2	13,1	-	19,4	25,5	21,7	-	29,3
Distrito Federal	21,3	18,9	-	23,7	15,1	12,0	-	18,3	26,7	23,3	-	30,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 13 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que consomem 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 14 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que consomem 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, a frequência de consumo recomendado de frutas e hortaliças foi de 19,2%, sendo menor em homens (15,4%) do que em mulheres (21,4%). Em ambos os sexos, a frequência do consumo recomendado de frutas e hortaliças aumentou com a idade e com o nível de escolaridade dos indivíduos (Tabela 14).

Tabela 14 – Percentual de indivíduos que consomem 5 ou mais porções diárias de frutas e hortaliças no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%		IC95%		%		IC95%		%		IC95%	
Idade (anos)												
18 a 24	13,8	12,0	-	15,6	12,1	9,8	-	14,3	15,4	12,7	-	18,0
25 a 34	17,5	15,9	-	19,1	13,9	11,7	-	16,1	20,8	18,5	-	23,1
35 a 44	19,5	18,1	-	20,9	15,4	13,5	-	17,3	23,1	21,1	-	25,1
45 a 54	22,4	20,8	-	24,0	18,1	15,6	-	20,5	26,1	23,9	-	28,3
55 a 64	23,4	21,4	-	25,5	17,0	14,1	-	19,9	28,5	25,7	-	31,3
65 e mais	26,8	24,6	-	29,1	23,7	19,9	-	27,6	28,8	26,1	-	31,5
Anos de escolaridade												
0 a 8	16,0	14,9	-	17,2	12,1	10,5	-	13,6	19,4	17,8	-	21,1
9 a 11	19,5	18,5	-	20,6	16,2	14,8	-	17,7	22,2	20,7	-	23,6
12 e mais	28,7	27,2	-	30,1	24,4	22,1	-	26,6	32,6	30,7	-	34,5
Total	19,2	18,4	-	19,9	15,4	14,3	-	16,4	22,4	21,4	-	23,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Consumo de carnes com excesso de gordura

A frequência de adultos que referem o hábito de consumir carne vermelha gordurosa ou frango com pele, sem remover a gordura visível desses alimentos, doravante denominado consumo de carnes com excesso de gordura, variou entre 25,4%, em Salvador, e 48,8%, em Campo Grande. Na maioria das cidades, a frequência dessa condição foi muito maior entre homens do que entre mulheres. As maiores frequências do consumo de carnes com excesso de gordura entre homens foram observadas em Campo Grande (59,3%), Goiânia (56,8%) e Cuiabá (54,4%) e as menores, em Salvador (34,8%), Florianópolis (36,1%) e João Pessoa (38,2%). Situação não muito diferente é observada entre mulheres, para as quais as maiores frequências ocorrem em Campo Grande

(39,3%), Cuiabá (36,3%) e Belo Horizonte (34,3%) e as menores, em Salvador (17,6%), João Pessoa (18,0%) e Aracaju (19,0%) (Tabela 15 e Figuras 15 e 16).

Tabela 15 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal** – Vigitel 2008

Capitais/DF	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%		
Aracaju	30,6	26,6	-	34,6	44,7	38,2	-	51,3	19,0	14,5	-	23,5
Belém	30,8	27,4	-	34,1	41,6	36,6	-	46,5	21,5	17,2	-	25,8
Belo Horizonte	41,1	37,4	-	44,8	49,1	44,3	-	54,0	34,3	28,7	-	39,9
Boa Vista	40,0	36,0	-	44,0	46,0	39,8	-	52,1	34,1	28,9	-	39,4
Campo Grande	48,8	45,4	-	52,2	59,3	54,2	-	64,4	39,3	34,9	-	43,6
Cuiabá	45,0	41,4	-	48,5	54,4	49,0	-	59,9	36,3	31,9	-	40,7
Curitiba	34,3	31,3	-	37,3	42,6	38,0	-	47,2	27,1	23,1	-	31,1
Florianópolis	27,3	24,4	-	30,3	36,1	31,6	-	40,7	19,4	15,5	-	23,2
Fortaleza	32,2	28,5	-	35,8	43,3	37,3	-	49,2	23,1	18,9	-	27,3
Goiânia	43,3	39,6	-	46,9	56,8	52,0	-	61,6	31,5	26,5	-	36,5
João Pessoa	27,1	23,3	-	30,9	38,2	31,0	-	45,4	18,0	13,9	-	22,2
Macapá	36,4	32,4	-	40,5	49,8	43,7	-	55,8	23,9	19,3	-	28,5
Maceió	29,1	25,4	-	32,8	40,4	33,8	-	47,0	19,7	16,1	-	23,3
Manaus	29,7	26,4	-	33,0	40,8	35,5	-	46,1	19,4	15,8	-	23,1
Natal	30,6	27,3	-	33,9	44,4	38,9	-	49,9	19,2	15,6	-	22,8
Palmas	41,9	37,0	-	46,9	49,9	42,7	-	57,1	33,9	27,1	-	40,7
Porto Alegre	34,6	31,5	-	37,8	44,5	39,7	-	49,3	26,5	22,3	-	30,6
Porto Velho	41,3	37,7	-	45,0	49,8	44,6	-	54,9	33,1	28,0	-	38,2
Recife	30,1	26,7	-	33,5	42,0	36,2	-	47,9	20,5	16,9	-	24,1
Rio Branco	38,6	32,9	-	44,3	44,3	36,9	-	51,6	33,5	24,5	-	42,5
Rio de Janeiro	29,6	26,5	-	32,7	38,8	33,6	-	44,0	21,9	18,5	-	25,4
Salvador	25,4	22,3	-	28,6	34,8	30,1	-	39,5	17,6	13,4	-	21,9
São Luís	31,3	28,0	-	34,7	41,8	36,7	-	46,9	22,7	18,2	-	27,2
São Paulo	34,5	30,7	-	38,2	47,2	41,1	-	53,3	23,5	19,5	-	27,4
Teresina	31,8	28,2	-	35,3	43,2	37,2	-	49,2	22,4	18,5	-	26,3
Vitória	37,2	33,2	-	41,1	44,6	38,7	-	50,4	30,9	25,5	-	36,4
Distrito Federal	37,1	33,6	-	40,6	45,9	40,5	-	51,2	29,4	24,7	-	34,1


Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 15 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que costumam consumir carnes com excesso de gordura, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 16 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que costumam consumir carnes com excesso de gordura, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, cerca de um terço (33,4%) das pessoas declarou ter o hábito de consumir carnes com excesso de gordura, sendo essa condição quase duas vezes mais frequente em homens (44,1%) do que em mulheres (24,2%). Em ambos os sexos, a frequência do consumo de carnes com excesso de gordura foi maior em pessoas mais jovens e em pessoas com menor escolaridade (Tabela 16).

Tabela 16 – Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura* no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade** – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)										
18 a 24	38,6	34,7 - 42,4	47,9	41,9 - 53,9	29,9	25,4 - 34,4				
25 a 34	39,1	36,9 - 41,3	49,8	46,3 - 53,3	29,4	26,9 - 31,9				
35 a 44	34,0	32,2 - 35,7	46,1	43,3 - 48,9	23,4	21,5 - 25,4				
45 a 54	28,5	26,6 - 30,4	37,4	34,2 - 40,6	21,0	18,8 - 23,1				
55 a 64	25,5	23,2 - 27,8	35,6	31,6 - 39,6	17,5	15,1 - 20,0				
65 e mais	18,1	16,2 - 20,0	28,8	24,9 - 32,7	11,3	9,6 - 13,0				
Anos de escolaridade										
0 a 8	35,9	34,0 - 37,9	47,9	44,7 - 51,0	25,6	23,4 - 27,8				
9 a 11	32,8	31,6 - 34,1	42,5	40,5 - 44,5	25,0	23,5 - 26,5				
12 e mais	26,1	24,6 - 27,5	35,0	32,6 - 37,5	17,9	16,3 - 19,4				
Total	33,4	32,2 - 34,5	44,1	42,2 - 46,0	24,2	22,9 - 25,5				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

Vigitel: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico.

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Consumo de leite com teor integral de gordura

A frequência de adultos que consomem leite com teor integral de gordura, doravante denominado consumo de leite integral, se mostra elevada em todas as cidades estudadas, variando entre 43,4%, em Natal, e 67,4%, em Manaus, não apresentando diferenças sistemáticas segundo o sexo, à exceção de Porto Alegre e Rio de Janeiro. Entre homens, as maiores frequências de consumo de leite integral foram observadas em Manaus (68,8%), Porto Velho (66,2%) e São Luís (63,2%) e as menores, em Natal (44,9%), Recife (48,2%) e João Pessoa (48,4%). Entre mulheres, as maiores frequências ocorreram em Boa Vista (67,3%), Macapá (67,0%), Rio Branco (66,8%) e as menores, em Natal (42,2%), João Pessoa (45,2%) e Maceió (45,3%) (Tabela 17 e Figuras 17 e 18).

Tabela 17 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo										
	Total				Masculino				Feminino		
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%	
Aracaju	48,2	44,2	-	52,2	49,2	42,7	-	55,6	47,3	42,3	- 52,3
Belém	64,0	60,6	-	67,3	61,1	56,2	-	66,0	66,4	61,9	- 70,9
Belo Horizonte	54,4	50,6	-	58,1	59,4	54,6	-	64,1	50,1	44,8	- 55,5
Boa Vista	64,0	59,8	-	68,2	60,6	54,0	-	67,2	67,3	62,3	- 72,3
Campo Grande	51,8	48,3	-	55,2	52,4	47,1	-	57,8	51,1	46,8	- 55,5
Cuiabá	58,5	54,8	-	62,1	62,0	56,6	-	67,5	55,2	50,5	- 60,0
Curitiba	62,5	59,6	-	65,3	62,3	57,9	-	66,6	62,6	59,0	- 66,3
Florianópolis	53,8	50,7	-	56,8	58,1	53,6	-	62,6	49,8	45,7	- 54,0
Fortaleza	56,1	52,2	-	59,9	55,5	49,7	-	61,4	56,5	51,5	- 61,5
Goiânia	60,8	57,5	-	64,2	61,2	56,6	-	65,8	60,5	55,7	- 65,4
João Pessoa	46,6	42,2	-	51,0	48,4	40,4	-	56,3	45,2	40,4	- 50,0
Macapá	64,3	60,4	-	68,3	61,5	55,4	-	67,6	67,0	62,0	- 72,0
Maceió	49,7	45,5	-	54,0	55,0	48,2	-	61,7	45,3	40,1	- 50,5
Manaus	67,4	64,0	-	70,7	68,8	63,7	-	73,8	66,1	61,7	- 70,5
Natal	43,4	40,0	-	46,9	44,9	39,5	-	50,3	42,2	37,8	- 46,7
Palmas	58,1	53,2	-	63,1	54,5	47,2	-	61,9	61,8	55,4	- 68,2
Porto Alegre	52,3	49,2	-	55,5	57,8	53,2	-	62,5	47,8	43,7	- 52,0
Porto Velho	66,1	62,7	-	69,6	66,2	61,2	-	71,3	66,0	61,3	- 70,7
Recife	50,4	46,9	-	53,8	48,2	42,5	-	53,9	52,1	47,9	- 56,3
Rio Branco	64,3	59,5	-	69,1	61,6	54,5	-	68,6	66,8	60,2	- 73,3
Rio de Janeiro	51,4	48,3	-	54,6	57,0	52,1	-	62,0	46,7	42,9	- 50,6
Salvador	60,2	56,9	-	63,5	62,3	57,5	-	67,2	58,5	54,0	- 62,9
São Luís	63,6	60,5	-	66,8	63,2	58,4	-	68,0	64,0	59,8	- 68,2
São Paulo	58,4	55,1	-	61,8	62,9	57,8	-	68,0	54,5	50,5	- 58,6
Teresina	61,4	57,6	-	65,2	59,5	53,6	-	65,5	62,9	58,0	- 67,8
Vitória	51,3	47,7	-	55,0	54,7	49,2	-	60,3	48,5	43,7	- 53,3
Distrito Federal	56,7	53,3	-	60,1	55,8	50,4	-	61,3	57,4	53,1	- 61,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 17 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que costumam consumir leite com teor integral de gordura, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 18 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que costumam consumir leite com teor integral de gordura, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, a frequência de consumo de leite integral foi de 56,7%, sendo semelhante entre homens (59,2%) e mulheres (54,5%). Em ambos os sexos, a frequência dessa condição tendeu a diminuir com a idade e foi menor em pessoas com maior escolaridade. Ainda assim, mesmo na faixa etária de 65 ou mais anos ou no estrato de doze ou mais anos de escolaridade, a frequência do consumo de leite com teor integral de gordura foi sempre superior a 40% (Tabela 18).

Tabela 18 – Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)										
18 a 24	63,6	60,3 - 67,0	70,4	66,2 - 74,6	57,4	52,9 - 61,9				
25 a 34	58,6	56,4 - 60,7	59,6	56,2 - 63,0	57,6	54,9 - 60,3				
35 a 44	57,2	55,4 - 59,0	58,3	55,5 - 61,0	56,3	54,0 - 58,6				
45 a 54	52,0	50,0 - 54,1	52,3	49,1 - 55,6	51,8	49,2 - 54,3				
55 a 64	50,1	47,6 - 52,6	49,6	45,5 - 53,7	50,4	47,3 - 53,6				
65 e mais	47,2	44,7 - 49,6	50,8	46,4 - 55,1	44,9	42,1 - 47,7				
Anos de escolaridade										
0 a 8	56,8	55,0 - 58,7	59,1	56,2 - 61,9	54,9	52,6 - 57,2				
9 a 11	62,0	60,8 - 63,3	64,3	62,4 - 66,2	60,2	58,5 - 61,8				
12 e mais	46,7	45,0 - 48,3	51,1	48,5 - 53,6	42,7	40,7 - 44,7				
Total	56,7	55,6 - 57,8	59,2	57,5 - 60,9	54,5	53,2 - 55,9				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Consumo regular de refrigerantes

A frequência de adultos que dizem consumir refrigerantes (não dietéticos) em 5 ou mais dias da semana, doravante denominado consumo regular de refrigerantes, variou entre 10,9%, em Natal, e 34,3%, em Porto Velho. O consumo regular de refrigerantes tendeu a ser mais frequente no sexo masculino nas cidades de Curitiba, Goiânia, Manaus, Porto Alegre e Recife. As maiores frequências dessa condição foram encontradas, entre homens, em Porto Alegre (39,2%), Porto Velho (36,9%), Cuiabá (34,7%) e Macapá (34,7%) e, entre mulheres, em Porto Velho (31,9%), Rio Branco (29,5%) e São Paulo (26,5%). As menores frequências do consumo regular de refrigerantes ocorreram no sexo masculino em Natal (12,5%), João Pessoa (12,7%) e Teresina (14,9%) e, no sexo feminino, em Natal (9,5%), Aracaju (10,1%) e Recife (11,2%) (Tabela 19 e Figuras 19 e 20).

Tabela 19 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que consomem refrigerantes 5 ou mais dias por semana, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Aracaju	13,5	10,7 - 16,3	17,7	12,5 - 22,8	10,1	7,3 - 12,9				
Belém	21,0	17,9 - 24,1	23,0	18,8 - 27,3	19,3	14,8 - 23,7				
Belo Horizonte	27,1	23,2 - 30,9	32,3	27,4 - 37,1	22,6	16,8 - 28,5				
Boa Vista	27,4	23,4 - 31,5	30,8	24,2 - 37,3	24,1	19,5 - 28,7				
Campo Grande	24,5	21,4 - 27,5	25,2	20,5 - 29,8	23,8	19,8 - 27,9				
Cuiabá	29,8	26,2 - 33,3	34,7	29,3 - 40,2	25,2	20,7 - 29,8				
Curitiba	28,3	25,5 - 31,1	32,6	28,3 - 37,0	24,5	20,8 - 28,2				
Florianópolis	22,1	19,5 - 24,8	24,8	20,8 - 28,8	19,7	16,1 - 23,3				
Fortaleza	20,8	17,4 - 24,3	23,6	18,4 - 28,8	18,6	14,0 - 23,2				
Goiânia	25,2	22,1 - 28,3	33,2	28,3 - 38,1	18,2	14,9 - 21,5				
João Pessoa	12,1	9,7 - 14,5	12,7	9,0 - 16,4	11,6	8,4 - 14,9				
Macapá	29,3	25,4 - 33,2	34,7	28,6 - 40,8	24,3	19,5 - 29,1				
Maceió	15,2	12,0 - 18,3	18,7	13,5 - 24,0	12,1	8,6 - 15,7				
Manaus	27,3	24,1 - 30,5	32,0	26,8 - 37,3	22,9	19,2 - 26,6				
Natal	10,9	8,6 - 13,1	12,5	9,0 - 16,0	9,5	6,7 - 12,3				
Palmas	28,3	23,1 - 33,5	32,6	24,4 - 40,7	23,9	17,9 - 30,0				
Porto Alegre	29,9	26,7 - 33,0	39,2	34,1 - 44,2	22,2	18,6 - 25,8				
Porto Velho	34,3	30,8 - 37,9	36,9	31,8 - 42,0	31,9	27,0 - 36,7				
Recife	15,1	12,6 - 17,6	20,1	15,6 - 24,5	11,2	8,5 - 13,9				
Rio Branco	29,5	24,8 - 34,3	29,6	22,8 - 36,4	29,5	22,9 - 36,1				
Rio de Janeiro	27,6	24,4 - 30,7	32,0	26,8 - 37,3	23,8	20,2 - 27,4				
Salvador	16,1	13,6 - 18,7	19,8	15,6 - 24,1	13,1	10,2 - 16,0				
São Luís	21,0	17,9 - 24,1	25,0	20,2 - 29,7	17,7	13,7 - 21,7				
São Paulo	29,5	25,7 - 33,4	33,1	26,6 - 39,5	26,5	22,0 - 30,9				
Teresina	14,7	12,0 - 17,3	14,9	11,0 - 18,7	14,5	10,8 - 18,2				
Vitória	19,5	15,9 - 23,1	19,5	15,5 - 23,6	19,5	13,8 - 25,2				
Distrito Federal	23,1	19,9 - 26,3	25,7	20,6 - 30,7	20,9	16,6 - 25,1				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 19 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que consomem refrigerantes 5 ou mais dias por semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 20 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que consomem refrigerantes 5 ou mais dias por semana, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, a frequência do consumo regular de refrigerantes foi de 24,6%, sendo mais frequente entre homens (28,5%) do que entre mulheres (21,2%). Nos dois sexos, o consumo regular de refrigerantes é muito frequente na faixa etária entre 18 e 24 anos, alcançando mais de 30% das pessoas. Com o aumento da idade, há forte redução na frequência de consumidores regulares de refrigerantes, os quais correspondem a 7-9% do total de pessoas com 65 ou mais anos de idade. Entre homens e mulheres, a frequência do consumo regular de refrigerantes é menor para o estrato de maior escolaridade (12 ou mais anos); ainda assim, 22,7% e 14,3%, respectivamente, dos homens e mulheres com maior escolaridade dizem consumir refrigerantes em 5 ou mais dias da semana (Tabela 20).

Tabela 20 – Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes 5 ou mais dias por semana no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)										
18 a 24	36,4	32,5 - 40,4	40,1	33,8 - 46,5	33,0	28,2 - 37,7				
25 a 34	30,8	28,6 - 32,9	34,5	31,1 - 37,9	27,3	24,7 - 30,0				
35 a 44	21,5	19,9 - 23,0	25,8	23,2 - 28,3	17,7	15,8 - 19,6				
45 a 54	16,9	15,3 - 18,5	20,5	17,8 - 23,2	14,0	12,1 - 15,8				
55 a 64	14,1	12,2 - 16,0	15,6	12,6 - 18,6	12,8	10,3 - 15,3				
65 e mais	8,0	6,7 - 9,3	9,2	6,9 - 11,5	7,2	5,7 - 8,7				
Anos de escolaridade										
0 a 8	25,3	23,2 - 27,3	28,7	25,3 - 32,1	22,3	19,9 - 24,7				
9 a 11	26,8	25,5 - 28,0	31,5	29,5 - 33,4	23,0	21,4 - 24,5				
12 e mais	18,3	17,0 - 19,6	22,7	20,5 - 25,0	14,3	12,8 - 15,8				
Total	24,6	23,4 - 25,8	28,5	26,5 - 30,4	21,2	19,8 - 22,6				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Atividade física

As oportunidades para indivíduos adultos serem fisicamente ativos podem ser classificadas em quatro domínios: no trabalho, no deslocamento para o trabalho, nos deveres domésticos e no tempo livre (lazer). O sistema Vigitel indaga os entrevistados sobre atividades físicas praticadas nesses quatro domínios, o que permite a construção de vários indicadores do padrão de atividade física. Nesta publicação, é apresentado apenas o indicador da frequência da prática de atividade física suficiente no tempo livre.

Atividade física suficiente no tempo livre

Acompanhando recomendações internacionais (PATE, et al., 1995; WHO, 2004), o Vigitel considera atividade física suficiente no tempo livre a prática de pelo menos 30 minutos diários de atividade física de intensidade leve ou moderada em 5 ou mais dias da semana ou a prática de pelo menos 20 minutos diários de atividade física de intensidade vigorosa em três ou mais dias da semana. Caminhada, caminhada em esteira, musculação, hidroginástica, ginástica em geral, natação, artes marciais, ciclismo e voleibol foram classificados como práticas de intensidade leve ou moderada; corrida, corrida em esteira, ginástica aeróbica, futebol, basquetebol e tênis foram classificados como práticas de intensidade vigorosa (AINSWORTH, et al., 2000).

A frequência de adultos que praticam atividade física suficiente no tempo livre foi modesta em todas as cidades estudadas, variando entre 11,5%, em São Paulo, e 20,6%, em Palmas. Na maioria das cidades, mais homens do que mulheres praticam atividade física suficiente no tempo livre. As maiores frequências dessa condição foram encontradas, entre homens, nas cidades de Macapá (28,0%), Boa Vista (26,2%) e Vitória (26,0%) e, entre mulheres, em Palmas (18,3%), Campo Grande (17,8%) e Florianópolis (16,6%). As menores frequências da atividade física suficiente no tempo livre ocorreram, no sexo masculino, em São Paulo (13,0%), Curitiba (15,4%) e Aracaju (16,9%) e, no sexo feminino, em Rio Branco (9,6%), São Luís (9,7%) e São Paulo (10,1%) (Tabela 21 e Figuras 21 e 22).

Tabela 21 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal** – Vigitel 2008

Capitais/DF	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%		
Aracaju	14,4	11,9	-	16,9	16,9	12,7	-	21,2	12,3	9,5	-	15,1
Belém	19,8	16,8	-	22,8	24,7	20,2	-	29,1	15,6	11,5	-	19,6
Belo Horizonte	16,1	13,7	-	18,4	20,3	16,2	-	24,4	12,5	10,1	-	14,9
Boa Vista	20,5	17,1	-	23,9	26,2	20,5	-	31,8	14,8	11,2	-	18,5
Campo Grande	18,1	15,4	-	20,7	18,4	14,3	-	22,4	17,8	14,3	-	21,3
Cuiabá	15,7	13,1	-	18,2	21,6	16,9	-	26,2	10,3	8,2	-	12,3
Curitiba	14,4	12,2	-	16,6	15,4	11,7	-	19,0	13,6	11,0	-	16,2
Florianópolis	18,8	16,4	-	21,2	21,2	17,4	-	25,0	16,6	13,5	-	19,8
Fortaleza	15,1	12,8	-	17,3	19,2	15,4	-	23,1	11,7	9,1	-	14,2
Goiânia	15,7	13,5	-	18,0	18,9	15,2	-	22,7	13,0	10,5	-	15,5
João Pessoa	14,7	12,3	-	17,2	17,6	13,2	-	22,0	12,4	9,7	-	15,0
Macapá	19,7	16,3	-	23,0	28,0	22,1	-	33,9	11,8	9,3	-	14,4
Maceió	15,6	12,6	-	18,6	19,0	13,6	-	24,3	12,7	9,6	-	15,9
Manaus	15,3	12,8	-	17,8	20,0	15,6	-	24,3	11,0	8,5	-	13,6
Natal	18,8	15,9	-	21,6	24,0	19,2	-	28,9	14,4	11,2	-	17,6
Palmas	20,6	16,4	-	24,7	22,8	16,2	-	29,4	18,3	13,2	-	23,4
Porto Alegre	15,3	12,5	-	18,1	20,4	15,9	-	24,9	11,2	7,7	-	14,6
Porto Velho	15,7	13,3	-	18,1	20,6	16,7	-	24,5	11,0	8,2	-	13,8
Recife	17,0	14,5	-	19,6	22,0	17,1	-	26,8	13,0	10,8	-	15,3
Rio Branco	14,6	11,2	-	18,1	20,1	14,0	-	26,2	9,6	6,4	-	12,9
Rio de Janeiro	15,6	13,4	-	17,9	19,3	15,1	-	23,4	12,6	10,5	-	14,7
Salvador	14,5	12,1	-	16,8	18,5	14,6	-	22,4	11,1	8,2	-	14,0
São Luís	15,2	12,8	-	17,6	21,9	17,5	-	26,2	9,7	7,4	-	12,0
São Paulo	11,5	9,7	-	13,2	13,0	10,0	-	15,9	10,1	8,2	-	12,1
Teresina	15,4	12,9	-	18,0	18,2	13,7	-	22,6	13,2	10,3	-	16,1
Vitória	19,7	16,7	-	22,7	26,0	20,3	-	31,6	14,4	12,0	-	16,9
Distrito Federal	19,0	16,3	-	21,7	25,3	20,4	-	30,1	13,5	10,8	-	16,1


Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 21 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que praticam atividade física suficiente no tempo livre segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 22 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que praticam atividade física suficiente no tempo livre segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, a frequência da atividade física suficiente no tempo livre foi de 15,0%, sendo maior no sexo masculino (18,5%) do que no sexo feminino (12,0%). Entre homens, a frequência é máxima entre os 18 e os 24 anos de idade (27,9%), declinando com a idade até chegar a 12,5%, entre os 45 e 54 anos de idade, e sobe nas idades subsequentes, alcançando 19,3% entre os idosos. Entre mulheres, a situação mais desfavorável é encontrada nas faixas etárias extremas: apenas 9,9% das mulheres jovens (entre 18 e 24 anos) e 11,1% das idosas (65 ou mais anos de idade) informam atividade física suficiente no tempo livre. Em ambos os sexos, a frequência de suficientemente ativo no tempo livre aumenta com a escolaridade das pessoas. Ainda assim, mesmo na faixa de 12 ou mais anos de escolaridade, apenas a minoria das pessoas se exercita de modo suficiente: 15,2% das mulheres e 24,3% dos homens (Tabela 22).

Tabela 22 – Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre* no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade** – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)										
18 a 24	18,6	16,6 - 20,5	27,9	24,0 - 31,9	9,9	8,2 - 11,6				
25 a 34	14,8	13,3 - 16,3	18,3	15,7 - 20,9	11,6	10,1 - 13,1				
35 a 44	13,3	12,2 - 14,4	12,8	11,1 - 14,4	13,7	12,2 - 15,2				
45 a 54	12,8	11,6 - 14,0	12,5	10,7 - 14,2	13,2	11,5 - 14,8				
55 a 64	15,2	13,4 - 17,1	18,0	14,7 - 21,3	13,0	11,0 - 15,1				
65 e mais	14,3	12,5 - 16,1	19,3	15,9 - 22,8	11,1	9,2 - 13,1				
Anos de escolaridade										
0 a 8	12,0	11,0 - 13,0	14,9	13,0 - 16,7	9,5	8,5 - 10,6				
9 a 11	17,8	16,8 - 18,7	21,7	20,1 - 23,2	14,6	13,4 - 15,8				
12 e mais	19,6	18,3 - 20,8	24,3	22,2 - 26,5	15,2	13,8 - 16,6				
Total	15,0	14,3 - 15,7	18,5	17,3 - 19,7	12,0	11,3 - 12,7				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Consumo de bebidas alcoólicas

Nesta publicação focalizam-se dois indicadores do consumo de bebidas alcoólicas: a frequência de consumo abusivo – mais de quatro doses – mulheres – ou mais de cinco doses – homens – de bebidas alcoólicas em uma mesma ocasião – e a frequência de condução de veículo motorizado após o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. Considera-se como dose de bebida alcoólica uma dose de bebida destilada, uma lata de cerveja ou uma taça de vinho.

Consumo abusivo de bebidas alcoólicas

A frequência de adultos que, nos últimos 30 dias, consumiram em uma única ocasião mais de quatro doses (mulheres) ou mais de cinco doses (homens) de bebidas alcoólicas, doravante denominado consumo abusivo de bebidas alcoólicas, variou entre 10,8%, em Curitiba, e 24,9%, em Salvador. Em todas as cidades, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi mais frequente em homens do que em mulheres. As maiores frequências, entre homens, foram observadas em Belém (37,2%), Teresina (36,6%) e Palmas (36,2%) e, entre mulheres, em Salvador (15,9%), Rio de Janeiro (13,7%) e Belo Horizonte (12,4%). As menores frequências do consumo abusivo de bebidas alcoólicas no sexo masculino ocorreram em Curitiba (17,8%), São Paulo (18,1%) e Porto Alegre (21,7%) e, no sexo feminino, em Curitiba (4,6%), Fortaleza (5,6%) e Macapá (5,7%) (Tabela 23 e Figuras 23 e 24).

Tabela 23 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo											
	Total			Masculino				Feminino				
	%	IC95%		%	IC95%			%	IC95%			
Aracaju	19,5	16,1	- 22,9	32,8	26,5	- 39,2		8,5	6,0	- 11,0		
Belém	23,7	20,5	- 26,9	37,2	32,3	- 42,0		12,2	8,2	- 16,2		
Belo Horizonte	20,8	18,2	- 23,5	30,7	26,3	- 35,2		12,4	9,9	- 15,0		
Boa Vista	17,8	14,5	- 21,2	26,1	20,7	- 31,5		9,7	5,7	- 13,6		
Campo Grande	17,2	14,3	- 20,0	25,8	20,9	- 30,8		9,3	6,4	- 12,2		
Cuiabá	20,4	17,3	- 23,6	31,6	26,2	- 37,0		10,2	7,4	- 13,0		
Curitiba	10,8	8,8	- 12,8	17,8	14,1	- 21,5		4,6	3,0	- 6,2		
Florianópolis	17,0	14,7	- 19,3	24,3	20,5	- 28,0		10,5	7,7	- 13,3		
Fortaleza	17,8	14,6	- 21,0	32,8	26,8	- 38,7		5,6	3,7	- 7,5		
Goiânia	17,0	14,4	- 19,7	28,5	23,8	- 33,2		7,0	5,1	- 8,9		
João Pessoa	19,0	14,4	- 23,6	32,0	23,4	- 40,7		8,3	5,7	- 11,0		
Macapá	20,4	16,9	- 24,0	36,1	29,9	- 42,3		5,7	4,0	- 7,3		
Maceió	16,2	13,2	- 19,1	25,8	20,2	- 31,3		8,1	5,5	- 10,8		
Manaus	18,8	16,0	- 21,6	28,6	23,8	- 33,4		9,8	7,0	- 12,6		
Natal	17,5	14,8	- 20,3	27,3	22,6	- 32,0		9,5	6,3	- 12,6		
Palmas	23,7	18,9	- 28,5	36,2	28,7	- 43,8		11,0	6,3	- 15,7		
Porto Alegre	15,4	12,4	- 18,5	21,7	16,8	- 26,6		10,3	6,6	- 14,0		
Porto Velho	18,5	15,6	- 21,3	26,9	22,5	- 31,4		10,2	6,7	- 13,7		
Recife	19,2	16,5	- 22,0	29,2	24,0	- 34,4		11,2	8,9	- 13,6		
Rio Branco	16,5	12,5	- 20,5	24,3	17,8	- 30,8		9,3	4,7	- 14,0		
Rio de Janeiro	20,5	17,6	- 23,4	28,6	23,6	- 33,5		13,7	10,4	- 17,1		
Salvador	24,9	21,9	- 27,9	35,6	30,7	- 40,5		15,9	12,5	- 19,4		
São Luís	19,8	17,1	- 22,6	32,1	27,3	- 36,9		9,7	6,9	- 12,5		
São Paulo	12,2	10,2	- 14,3	18,1	14,2	- 22,1		7,1	5,4	- 8,9		
Teresina	21,6	18,4	- 24,8	36,6	30,8	- 42,3		9,3	6,6	- 12,0		
Vitória	18,5	15,5	- 21,4	27,6	22,3	- 32,8		10,8	7,8	- 13,8		
Distrito Federal	18,4	15,3	- 21,5	26,7	21,7	- 31,7		11,2	7,4	- 14,9		

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 23 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que cinco doses de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 24 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, a frequência do consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi de 17,6%, sendo quase três vezes maior em homens (26,6%) do que em mulheres (9,8%). Em ambos os sexos, a frequência do consumo abusivo de bebidas alcoólicas foi maior nas faixas etárias mais jovens, alcançando cerca de 30% dos homens e mais de 10% das mulheres entre 18 e 44 anos de idade. A partir dos 45 anos de idade, o consumo abusivo de bebidas alcoólicas declina progressivamente até chegar a 6,7% dos homens e 1,5% das mulheres com 65 ou mais anos de idade. Entre os homens, a frequência do consumo abusivo de bebidas alcoólicas pouco varia com o nível de escolaridade das pessoas, mas para as mulheres é menor na faixa de menor escolaridade (até 8 anos de estudo) (Tabela 24).

Tabela 24 – Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)										
18 a 24	20,2	17,8 - 22,6	27,0	22,7 - 31,2	14,0	11,3 - 16,8				
25 a 34	22,1	20,2 - 23,9	33,3	30,0 - 36,6	11,9	10,3 - 13,6				
35 a 44	19,4	18,0 - 20,8	29,1	26,7 - 31,6	10,9	9,5 - 12,3				
45 a 54	15,8	14,3 - 17,2	25,2	22,5 - 27,9	7,8	6,4 - 9,2				
55 a 64	10,3	8,7 - 11,9	17,8	14,5 - 21,0	4,3	3,3 - 5,4				
65 e mais	3,5	2,8 - 4,3	6,7	4,9 - 8,6	1,5	0,9 - 2,1				
Anos de escolaridade										
0 a 8	16,4	15,0 - 17,7	25,6	23,1 - 28,1	8,4	7,1 - 9,6				
9 a 11	19,1	18,1 - 20,1	28,6	26,8 - 30,4	11,5	10,3 - 12,6				
12 e mais	18,7	17,5 - 19,9	26,4	24,4 - 28,5	11,6	10,2 - 12,9				
Total	17,6	16,8 - 18,4	26,6	25,1 - 28,1	9,8	9,1 - 10,6				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Dirigir após consumo abusivo de bebida alcoólica

A frequência de adultos que, nos últimos 30 dias, referiram conduzir veículos motorizados após o consumo abusivo de bebida alcoólica em pelo menos uma ocasião variou de 0,7%, em Porto Alegre, a 3,2%, em Boa Vista. Essa condição se mostrou mais frequente entre homens do que entre mulheres, à exceção da população de Boa Vista, Fortaleza, Porto Velho e São Paulo. As maiores frequências foram observadas, entre homens, em Teresina (6,5%), Aracaju (6,1%) e Goiânia (5,7%) e, entre mulheres, em Porto Velho e Boa Vista (1,8%), Fortaleza (0,7%) e Palmas (0,5%) (Tabela 25 e Figuras 25 e 26).

Tabela 25 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, em pelo menos uma ocasião, conduziram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%		
Aracaju	2,9	1,3	-	4,4	6,1	2,7	-	9,5	0,2	0,0	-	0,4
Belém	1,1	0,7	-	1,6	2,3	1,3	-	3,3	0,1	0,0	-	0,3
Belo Horizonte	1,8	1,1	-	2,4	3,6	2,2	-	5,0	0,2	0,0	-	0,4
Boa Vista	3,2	1,3	-	5,1	4,7	1,8	-	7,5	1,8	0,6	-	4,2
Campo Grande	2,1	1,0	-	3,2	4,0	1,7	-	6,2	0,4	0,0	-	0,7
Cuiabá	2,0	1,3	-	2,8	3,9	2,4	-	5,4	0,3	0,0	-	0,6
Curitiba	1,6	0,9	-	2,3	3,0	1,6	-	4,5	0,3	0,0	-	0,6
Florianópolis	1,9	1,3	-	2,6	3,6	2,2	-	5,0	0,5	0,1	-	0,8
Fortaleza	1,5	0,7	-	2,3	2,4	1,4	-	3,5	0,7	0,5	-	2,0
Goiânia	2,7	1,7	-	3,7	5,7	3,6	-	7,9	0,1	0,1	-	0,3
João Pessoa	2,1	1,3	-	2,8	4,4	2,6	-	6,2	0,1	0,0	-	0,3
Macapá	1,5	1,0	-	2,1	2,8	1,7	-	3,9	0,3	0,1	-	0,8
Maceió	1,5	1,0	-	2,1	3,1	2,0	-	4,3	0,2	0,0	-	0,5
Manaus	1,3	0,5	-	2,2	2,7	1,0	-	4,4	0,1	0,0	-	0,2
Natal	2,1	1,0	-	3,2	4,4	2,0	-	6,8	0,2	0,0	-	0,3
Palmas	2,8	1,7	-	3,9	5,1	3,0	-	7,3	0,5	0,0	-	1,0
Porto Alegre	0,7	0,3	-	1,1	1,4	0,5	-	2,3	0,1	0,1	-	0,2
Porto Velho	2,8	1,3	-	4,3	3,8	2,3	-	5,3	1,8	0,7	-	4,4
Recife	1,8	0,8	-	2,9	4,0	1,7	-	6,3	0,1	0,0	-	0,2
Rio Branco	1,1	0,7	-	1,6	2,1	1,2	-	3,0	0,3	0,0	-	0,5
Rio de Janeiro	1,3	0,7	-	1,8	2,6	1,4	-	3,8	0,1	0,0	-	0,3
Salvador	1,5	0,6	-	2,4	3,0	1,1	-	4,9	0,3	0,1	-	0,6
São Luís	1,2	0,7	-	1,7	2,5	1,4	-	3,7	0,1	0,0	-	0,2
São Paulo	0,8	0,3	-	1,3	1,5	0,5	-	2,6	0,2	0,1	-	0,5
Teresina	3,2	2,1	-	4,3	6,5	4,1	-	9,0	0,4	0,0	-	0,9
Vitória	1,2	0,6	-	1,9	2,3	0,9	-	3,6	0,3	0,0	-	0,6
Distrito Federal	1,4	0,8	-	2,0	2,7	1,4	-	3,9	0,3	0,0	-	0,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 25 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, em pelo menos uma ocasião, conduziram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 26 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, em pelo menos uma ocasião, conduziram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, 1,4% dos indivíduos referiram que em pelo menos uma ocasião nos últimos 30 dias conduziram veículo motorizado após consumo abusivo de bebida alcoólica, sendo essa proporção maior em homens (2,8%) do que em mulheres (0,2%). A prática de dirigir após consumo abusivo de bebida alcoólica alcança maior frequência nas faixas etárias entre 25 e 34 e 35 e 44 anos (aproximadamente 2,0% no conjunto da população total avaliada) e no estrato de maior escolaridade (4,8% dos homens e 0,6% das mulheres) (Tabela 26).

Tabela 26 – Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, em pelo menos uma ocasião, conduziram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%		
Idade (anos)												
18 a 24	1,2	0,8	-	1,5	2,1	1,5	-	2,7	0,3	0,0	-	0,7
25 a 34	1,8	1,4	-	2,2	3,3	2,5	-	4,1	0,4	0,1	-	0,7
35 a 44	1,9	1,4	-	2,4	3,9	2,9	-	4,9	0,2	0,1	-	0,3
45 a 54	1,5	0,9	-	2,2	3,1	1,7	-	4,6	0,2	0,1	-	0,3
55 a 64	0,7	0,4	-	1,0	1,4	0,8	-	2,0	0,1	0,0	-	0,2
65 e mais	0,2	0,1	-	0,3	0,5	0,2	-	0,8	0,0	0,0	-	0,0
Anos de escolaridade												
0 a 8	1,0	0,7	-	1,3	2,0	1,4	-	2,6	0,1	0,0	-	0,3
9 a 11	1,5	1,2	-	1,8	3,0	2,5	-	3,5	0,3	0,0	-	0,5
12 e mais	2,6	2,2	-	3,0	4,8	3,9	-	5,7	0,6	0,4	-	0,8
Total	1,4	1,2	-	1,6	2,8	2,4	-	3,2	0,2	0,1	-	0,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Autoavaliação do estado de saúde

A autoavaliação do estado de saúde é considerada um indicador válido e relevante do estado de saúde de indivíduos e de populações. Esse indicador tem se revelado fortemente correlacionado com medidas objetivas de morbidade e de uso de serviços, constituindo-se um preditor poderoso da mortalidade, independentemente de fatores médicos, comportamentais e psicossociais. No entanto, esse poder preditor apresenta limitações, sendo fortemente influenciado por contextos sociais e culturais.

A autoavaliação da saúde, obtida com uma única questão que pede para o indivíduo classificar seu estado de saúde em *excelente*, *bom*, *regular* ou *ruim*, tem sido amplamente utilizada em inquéritos de saúde. De obtenção simples, a resposta a esta questão produz uma classificação global do estado de saúde capaz de captar, além de sinais e sintomas de doenças (diagnosticadas ou não por profissional de saúde), o impacto que essas doenças geram no bem-estar físico, mental e social dos indivíduos.

A frequência de adultos que autoavaliaram o estado de saúde como *ruim* variou entre 2,3% em Palmas e 7,7% em Macapá. No sexo masculino, as maiores frequências foram observadas em Manaus (6,5%), Macapá (6,4%) e João Pessoa (6,3%) e as menores em Palmas (1,1%), Porto Alegre (1,7%) e São Luís (1,9%). Entre mulheres, as maiores frequências foram observadas em Porto Velho (10,0%), Maceió (9,3%) e Macapá (8,9%) e as menores em Vitória (2,8%), João Pessoa (3,4%) e Aracaju (3,5%) (Tabela 27 e Figuras 27 e 28).

Tabela 27 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%		
Aracaju	4,0	2,2	-	5,9	4,7	1,0	-	8,3	3,5	2,2	-	4,9
Belém	4,5	2,9	-	6,1	3,1	0,6	-	5,7	5,7	3,7	-	7,7
Belo Horizonte	3,5	2,5	-	4,4	2,2	1,1	-	3,3	4,5	3,0	-	6,1
Boa Vista	4,9	3,3	-	6,4	2,5	1,0	-	3,9	7,2	4,6	-	9,9
Campo Grande	3,3	2,2	-	4,4	2,5	1,2	-	3,7	4,0	2,3	-	5,8
Cuiabá	5,0	3,6	-	6,3	4,1	2,0	-	6,1	5,8	3,9	-	7,6
Curitiba	4,8	3,3	-	6,3	4,1	1,3	-	6,9	5,5	4,0	-	6,9
Florianópolis	3,8	2,7	-	4,9	2,7	1,3	-	4,1	4,8	3,1	-	6,5
Fortaleza	4,4	2,8	-	6,1	2,2	0,7	-	3,7	6,2	3,6	-	8,9
Goiânia	3,6	2,8	-	4,5	2,2	1,2	-	3,3	4,9	3,5	-	6,2
João Pessoa	4,7	1,8	-	7,7	6,3	0,1	-	12,5	3,4	2,0	-	4,8
Macapá	7,7	5,2	-	10,2	6,4	2,7	-	10,2	8,9	5,6	-	12,3
Maceió	6,7	4,5	-	8,9	3,6	1,0	-	6,1	9,3	5,9	-	12,8
Manaus	6,6	4,5	-	8,7	6,5	2,8	-	10,2	6,7	4,6	-	8,8
Natal	5,8	4,0	-	7,6	3,5	1,4	-	5,7	7,7	4,9	-	10,5
Palmas	2,3	1,4	-	3,2	1,1	0,3	-	2,0	3,6	2,0	-	5,1
Porto Alegre	3,3	2,4	-	4,3	1,7	0,7	-	2,7	4,6	3,1	-	6,1
Porto Velho	6,4	4,3	-	8,5	2,7	1,1	-	4,3	10,0	6,2	-	13,8
Recife	4,9	3,3	-	6,6	2,0	0,8	-	3,3	7,3	4,6	-	10,0
Rio Branco	5,0	3,7	-	6,3	3,5	2,0	-	5,0	6,3	4,2	-	8,5
Rio de Janeiro	4,2	2,8	-	5,7	2,3	1,0	-	3,6	5,8	3,5	-	8,2
Salvador	5,4	3,8	-	6,9	2,4	1,0	-	3,7	7,8	5,2	-	10,4
São Luís	3,8	2,7	-	4,8	1,9	0,9	-	2,9	5,3	3,7	-	7,0
São Paulo	4,2	3,1	-	5,3	3,1	1,6	-	4,6	5,2	3,7	-	6,8
Teresina	4,1	2,9	-	5,4	2,5	1,5	-	3,6	5,4	3,3	-	7,5
Vitória	2,5	1,8	-	3,3	2,1	1,0	-	3,3	2,8	1,8	-	3,8
Distrito Federal	5,6	3,7	-	7,5	3,1	1,6	-	4,5	7,8	4,6	-	11,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 27 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 28 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, 4,5% das pessoas avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, sendo essa proporção maior em mulheres (5,9%) do que em homens (3,0%). Em ambos os sexos, a proporção daqueles que avaliaram seu estado de saúde como *ruim* aumenta com a idade e diminui com o nível de escolaridade (Tabela 28).

Tabela 28 – Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim* no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%		
Idade (anos)												
18 a 24	3,4	2,2	-	4,5	2,4	1,0	-	3,8	4,2	2,5	-	6,0
25 a 34	3,2	2,5	-	4,0	2,1	1,2	-	3,0	4,2	3,0	-	5,4
35 a 44	3,7	2,9	-	4,5	2,8	1,7	-	3,8	4,6	3,4	-	5,8
45 a 54	5,9	4,9	-	6,9	3,6	2,4	-	4,7	7,9	6,4	-	9,4
55 a 64	6,5	5,4	-	7,6	4,4	3,3	-	5,6	8,1	6,3	-	9,9
65 e mais	8,9	7,6	-	10,2	5,3	3,3	-	7,3	11,2	9,4	-	12,9
Anos de escolaridade												
0 a 8	6,3	5,6	-	7,0	3,8	2,9	-	4,7	8,5	7,3	-	9,6
9 a 11	2,8	2,4	-	3,2	2,2	1,5	-	2,8	3,4	2,8	-	3,9
12 e mais	1,9	1,5	-	2,3	1,6	1,0	-	2,1	2,2	1,7	-	2,8
Total	4,5	4,1	-	4,9	3,0	2,4	-	3,5	5,9	5,3	-	6,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Prevenção de câncer

O sistema Vigitel disponibiliza dois indicadores de acesso a serviços de diagnóstico precoce de câncer (mamografia e Papanicolau) e um indicador que avalia a proteção contra a radiação ultravioleta.

Realização de mamografia

Acompanhando recomendações internacionais, o Ministério da Saúde recomenda que todas as mulheres entre 50 e 69 anos de idade se submetam a exames de mamografia pelo menos uma vez a cada dois anos, além de recomendar o exame anual para mulheres acima de 35 anos que pertençam a grupos de alto risco.

As maiores frequências de mulheres entre 50 e 69 anos de idade que referem ter realizado exame de mamografia nos últimos dois anos foram observadas em Belo Horizonte (84,3%), Vitória (81,8%) e Florianópolis (80,7%) e as menores em Palmas (50,0%), Rio Branco (50,9%) e Macapá (52,9%) (Tabela 29 e Figura 29).

Tabela 29 – Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Realização de mamografia em algum momento				Realização de mamografia nos últimos 2 anos			
	%	IC95%			%	IC95%		
Aracaju	93,8	90,8	-	96,9	79,9	74,6	-	85,3
Belém	68,1	61,1	-	75,1	54,9	47,8	-	62,0
Belo Horizonte	95,4	93,0	-	97,8	84,3	80,0	-	88,6
Boa Vista	70,1	61,5	-	78,6	54,9	46,3	-	63,5
Campo Grande	90,1	86,3	-	93,8	71,3	65,4	-	77,3
Cuiabá	85,4	80,0	-	90,8	71,7	65,3	-	78,2
Curitiba	88,5	84,7	-	92,4	73,6	68,3	-	79,0
Florianópolis	94,8	91,1	-	98,5	80,7	74,8	-	86,6
Fortaleza	83,0	77,9	-	88,0	62,8	56,0	-	69,7
Goiânia	90,7	86,8	-	94,6	75,7	70,2	-	81,2
João Pessoa	87,5	83,0	-	91,9	63,5	56,5	-	70,5
Macapá	68,9	61,1	-	76,6	52,9	44,7	-	61,1
Maceió	87,8	83,4	-	92,1	67,5	61,2	-	73,9
Manaus	80,7	74,4	-	86,9	64,6	57,3	-	71,9
Natal	86,1	81,4	-	90,8	68,7	62,6	-	74,8
Palmas	76,5	66,8	-	86,3	50,0	39,0	-	61,1
Porto Alegre	90,6	86,6	-	94,7	77,6	72,5	-	82,8
Porto Velho	83,4	77,7	-	89,2	68,7	61,8	-	75,7
Recife	84,9	79,8	-	89,9	74,5	68,8	-	80,3
Rio Branco	66,4	58,7	-	74,1	50,9	43,3	-	58,6
Rio de Janeiro	80,0	75,0	-	85,1	64,9	59,2	-	70,7
Salvador	90,8	86,5	-	95,1	79,0	73,1	-	84,9
São Luís	85,8	80,2	-	91,3	71,8	65,0	-	78,7
São Paulo	89,0	84,9	-	93,1	74,4	68,8	-	80,0
Teresina	89,6	85,0	-	94,2	78,0	71,9	-	84,1
Vitória	91,2	87,3	-	95,1	81,8	76,5	-	87,2
Distrito Federal	80,8	74,7	-	86,9	65,7	58,7	-	72,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 29 – Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia pelo menos uma vez nos últimos dois anos, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população de mulheres entre 50 e 69 anos de idade das 27 cidades estudadas, a frequência de realização de mamografia nos últimos dois anos foi de 71,3%. A frequência de mamografia nos últimos dois anos foi maior na faixa etária entre 50 e 59 anos (73,7%) e com maior escolaridade, igual ou maior a 12 anos de estudo (88,8%) (Tabela 30).

Tabela 30 – Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Realização de mamografia em algum momento				Realização de mamografia nos últimos 2 anos			
	%	IC95%			%	IC95%		
Idade (anos)								
50 a 59	86,7	84,7	-	88,7	73,7	71,2	-	76,2
60 a 69	84,8	82,3	-	87,3	67,2	64,0	-	70,5
Anos de escolaridade								
0 a 8	83,1	81,0	-	85,2	66,4	63,7	-	69,1
9 a 11	90,0	87,8	-	92,2	78,1	75,2	-	81,0
12 e mais	96,2	94,8	-	97,6	88,8	86,3	-	91,2
Total	86,0	84,4	-	87,6	71,3	69,3	-	73,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Realização de Papanicolau

A realização de exame de colo do útero a cada três anos é preconizada pelo Ministério da Saúde para todas as mulheres com idade entre 25 e 59 anos (e, também, para mulheres mais jovens com vida sexual ativa). Exames anuais são recomendados para mulheres com citologia alterada.

As maiores frequências de mulheres entre 25 e 59 anos de idade que referem ter realizado pelo menos um exame de Papanicolau nos últimos três anos foram observadas em São Paulo (92,7%), Porto Alegre e Florianópolis (90,6%) e Palmas (90,0%) e as menores em Maceió (73,4%), Distrito Federal (74,4%) e Belém (74,6%) (Tabela 31 e Figura 30).

Tabela 31 – Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Realização de Papanicolau em				Realização de Papanicolau nos			
	algum momento				últimos 3 anos			
	%	IC95%			%	IC95%		
Aracaju	83,2	78,9	-	87,5	77,2	72,5	-	81,9
Belém	78,6	72,3	-	84,9	74,6	68,4	-	80,9
Belo Horizonte	88,4	85,0	-	91,8	83,2	79,4	-	86,9
Boa Vista	85,9	81,5	-	90,3	82,1	77,5	-	86,8
Campo Grande	89,4	85,6	-	93,2	85,0	80,8	-	89,1
Cuiabá	89,8	86,4	-	93,2	80,7	76,6	-	84,8
Curitiba	93,0	90,6	-	95,5	86,4	83,3	-	89,6
Florianópolis	95,4	92,9	-	97,9	90,6	87,4	-	93,7
Fortaleza	80,0	74,3	-	85,8	75,2	69,4	-	81,0
Goiânia	88,6	85,7	-	91,6	82,2	78,5	-	85,9
João Pessoa	81,7	77,1	-	86,3	75,5	70,7	-	80,4
Macapá	87,3	83,6	-	91,0	79,8	75,1	-	84,5
Maceió	80,9	76,2	-	85,7	73,4	68,3	-	78,5
Manaus	84,8	81,2	-	88,4	80,0	76,1	-	83,9
Natal	81,0	76,4	-	85,6	75,2	70,4	-	80,0
Palmas	93,6	90,8	-	96,4	90,0	86,3	-	93,7
Porto Alegre	94,7	92,7	-	96,8	90,6	88,0	-	93,2
Porto Velho	91,0	87,7	-	94,3	85,8	82,0	-	89,6
Recife	84,8	80,7	-	89,0	79,6	74,9	-	84,3
Rio Branco	87,5	82,3	-	92,6	80,1	74,6	-	85,6
Rio de Janeiro	84,2	80,5	-	87,9	79,9	76,0	-	83,9
Salvador	85,1	81,4	-	88,8	79,9	75,9	-	83,9
São Luís	86,7	83,1	-	90,2	81,9	77,7	-	86,2
São Paulo	96,9	95,4	-	98,5	92,7	90,5	-	94,9
Teresina	83,3	78,9	-	87,7	77,4	72,8	-	82,1
Vitória	91,6	89,0	-	94,3	89,1	86,1	-	92,1
Distrito Federal	83,6	80,1	-	87,2	74,4	70,3	-	78,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 30 – Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram Papanicolau pelo menos uma vez nos últimos três anos, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população de mulheres entre 25 e 59 anos de idade das 27 cidades estudadas, observa-se que a frequência de realização de exame de Papanicolau nos últimos três anos foi de 83,2%. A cobertura do exame aumentou a partir de 35 anos idade, mantendo-se estável a partir daí, e aumentou com o nível de escolaridade, chegando a 91,1% no estrato correspondente a 12 ou mais anos de estudo (Tabela 32).

Tabela 32 – Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Realização de Papanicolau em algum momento				Realização de Papanicolau nos últimos 3 anos			
	%	IC95%			%	IC95%		
Idade (anos)								
25 a 34	81,8	79,8	-	83,8	79,0	76,9	-	81,2
35 a 44	91,3	90,0	-	92,5	86,2	84,6	-	87,9
45 a 54	92,9	91,5	-	94,3	85,9	84,0	-	87,7
55 a 59	93,9	92,1	-	95,6	82,5	79,4	-	85,7
Anos de escolaridade								
0 a 8	86,8	85,2	-	88,4	79,9	78,1	-	81,8
9 a 11	87,5	86,1	-	88,9	83,7	82,2	-	85,1
12 e mais	93,5	92,4	-	94,5	91,1	89,9	-	92,3
Total	88,3	87,3	-	89,2	83,2	82,1	-	84,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Proteção contra radiação ultravioleta

Considera-se como proteção eficaz contra raios ultravioleta o uso de filtro solar e/ou de chapéu/sombrinha e roupas adequadas. O indicador de proteção contra a radiação ultravioleta adotado pelo Vigitel leva em conta a proporção de indivíduos que não costumam se expor ao sol por mais de 30 minutos por dia ou o fazem utilizando filtro solar e/ou chapéu/sombrinha e roupas adequadas.

A frequência de adultos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta variou entre 37,5% no Rio de Janeiro e 56,1% em Florianópolis. No sexo masculino, as maiores frequências foram observadas em Florianópolis (44,8%), Maceió (44,4%) e Porto Alegre (42,0%), e as menores em Belo Horizonte (27,9%), São Paulo (28,8%) e Rio de Janeiro (30,0%). Entre mulheres, as maiores frequências foram observadas em Florianópolis (66,3%), Palmas (65,9%) e Curitiba (63,2%), e as menores em Rio Branco (42,9%), Rio de Janeiro (43,9%) e Salvador (45,9%) (Tabela 33 e Figuras 31 e 32).

Tabela 33 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Aracaju	50,7	46,7 - 54,7	41,0	34,7 - 47,4	58,6	53,6 - 63,7				
Belém	46,9	43,5 - 50,4	35,8	31,2 - 40,4	56,5	51,7 - 61,3				
Belo Horizonte	43,1	39,5 - 46,7	27,9	23,7 - 32,0	56,0	50,6 - 61,4				
Boa Vista	50,1	46,0 - 54,1	41,4	35,1 - 47,8	58,6	53,5 - 63,7				
Campo Grande	44,3	41,0 - 47,6	35,0	30,0 - 40,0	52,7	48,3 - 57,0				
Cuiabá	45,8	42,3 - 49,3	35,8	30,6 - 40,9	55,0	50,3 - 59,6				
Curitiba	50,9	47,9 - 54,0	37,0	32,6 - 41,5	63,2	59,2 - 67,1				
Florianópolis	56,1	53,0 - 59,3	44,8	40,3 - 49,4	66,3	62,0 - 70,6				
Fortaleza	43,6	39,8 - 47,4	31,9	26,9 - 36,9	53,1	48,1 - 58,2				
Goiânia	44,6	41,1 - 48,2	31,8	27,5 - 36,1	55,8	49,8 - 61,8				
João Pessoa	49,1	44,6 - 53,6	41,0	32,7 - 49,3	55,7	50,7 - 60,6				
Macapá	44,0	40,0 - 48,0	40,6	34,6 - 46,6	47,2	41,9 - 52,5				
Maceió	49,2	44,9 - 53,4	44,4	37,5 - 51,4	53,2	47,9 - 58,4				
Manaus	45,1	41,7 - 48,5	38,1	33,1 - 43,1	51,5	47,0 - 56,0				
Natal	45,8	42,2 - 49,3	35,3	30,4 - 40,3	54,4	49,8 - 59,0				
Palmas	52,1	47,2 - 57,0	38,5	31,7 - 45,2	65,9	59,5 - 72,2				
Porto Alegre	49,8	46,6 - 52,9	42,0	37,3 - 46,8	56,1	51,9 - 60,3				
Porto Velho	47,8	44,2 - 51,5	39,9	34,7 - 45,1	55,6	50,5 - 60,7				
Recife	41,9	38,5 - 45,3	34,7	29,3 - 40,1	47,7	43,5 - 51,9				
Rio Branco	42,2	37,2 - 47,2	41,5	33,9 - 49,1	42,9	36,2 - 49,6				
Rio de Janeiro	37,5	34,7 - 40,4	30,0	25,7 - 34,3	43,9	40,1 - 47,6				
Salvador	40,8	37,6 - 44,0	34,7	30,2 - 39,1	45,9	41,5 - 50,3				
São Luís	43,2	40,0 - 46,5	36,2	31,4 - 41,0	49,0	44,6 - 53,5				
São Paulo	39,5	36,3 - 42,6	28,8	24,4 - 33,2	48,7	44,7 - 52,7				
Teresina	44,0	40,3 - 47,8	34,4	29,0 - 39,8	51,9	47,1 - 56,7				
Vitória	45,6	42,1 - 49,1	36,6	31,6 - 41,6	53,2	48,3 - 58,1				
Distrito Federal	51,0	47,5 - 54,4	39,1	33,8 - 44,3	61,4	56,9 - 66,0				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 31 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 32 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, 43,1% das pessoas referem se proteger contra a radiação ultravioleta, sendo essa proporção maior em mulheres (51,4%) do que em homens (33,3%). Entre homens, não há uma relação bem definida entre proteção e idade; entre mulheres, a frequência de proteção é menor para as mais jovens (18-24 anos). A frequência de proteção contra a radiação ultravioleta aumenta fortemente com escolaridade nos dois sexos (Tabela 34).

Tabela 34 – Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo									
	Total		Masculino				Feminino			
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)										
18 a 24	36,4	33,3 - 39,4	27,7	23,9 - 31,6	44,4	40,2 - 48,5				
25 a 34	41,9	39,8 - 44,0	31,5	28,4 - 34,5	51,3	48,6 - 54,0				
35 a 44	46,2	44,4 - 48,0	34,1	31,6 - 36,6	56,7	54,4 - 59,1				
45 a 54	46,9	44,9 - 48,9	38,9	35,7 - 42,0	53,7	51,1 - 56,2				
55 a 64	44,5	42,0 - 46,9	36,9	33,1 - 40,7	50,4	47,3 - 53,5				
65 e mais	47,5	45,1 - 49,9	40,1	35,9 - 44,3	52,1	49,3 - 55,0				
Anos de escolaridade										
0 a 8	36,6	34,9 - 38,2	28,4	26,0 - 30,7	43,7	41,5 - 45,9				
9 a 11	45,6	44,3 - 46,9	35,0	33,1 - 36,8	54,2	52,5 - 55,9				
12 e mais	59,2	57,6 - 60,8	46,2	43,7 - 48,8	71,1	69,1 - 73,0				
Total	43,1	42,0 - 44,1	33,3	31,8 - 34,9	51,4	50,0 - 52,7				

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Morbidade referida

Por se apoiar em entrevistas telefônicas, o Vigitel não pode aferir diretamente a frequência de fatores de risco para doenças crônicas que necessitem de diagnóstico médico. Nesses casos, de forma semelhante à empregada por outros sistemas de vigilância (CDC, 2008), o Vigitel estima a frequência de indivíduos que referem diagnóstico médico prévio do fator de risco. É evidente que as frequências estimadas dessa maneira serão influenciadas pela cobertura da assistência à saúde existente em cada cidade, podendo, assim, subestimar, em maior ou menor grau, a prevalência real do fator de risco na população. De qualquer modo, de imediato, fornecem informações úteis para avaliar a demanda por cuidados de saúde originada pela presença do fator. Em médio prazo, com a expansão e a universalização da cobertura da atenção à saúde da população adulta do País, espera-se que a frequência de casos diagnosticados se aproxime da prevalência real daquelas condições na população, propiciando, assim, informações seguras para o seu acompanhamento ao longo do tempo. A seguir, apresentam-se estimativas do Vigitel para a frequência de adultos com diagnóstico médico de hipertensão arterial e de diabetes.

Diagnóstico médico prévio de hipertensão arterial

A frequência de adultos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial variou entre 14,7% em Palmas e 29,5% no Rio de Janeiro. No sexo masculino, as maiores frequências foram observadas em São Paulo (25,0%), Campo Grande (23,7%) e Rio de Janeiro (23,4%), e as menores em São Luís (12,8%), Manaus (12,9%) e Macapá (13,3%). Entre mulheres, as maiores frequências foram observadas no Rio de Janeiro (34,6%), Recife (30,5%) e Porto Alegre (29,4%) e as menores em Palmas (14,1%), Belém (18,1%) e Boa Vista (19,1%) (Tabela 35 e Figuras 33 e 34).

Tabela 35 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo									
	Total			Masculino			Feminino			
	%	IC95%		%	IC95%		%	IC95%		
Aracaju	21,9	19,2 - 24,5		16,8	13,4 - 20,2		26,1	22,3 - 29,9		
Belém	17,3	15,1 - 19,5		16,3	13,0 - 19,6		18,1	15,1 - 21,0		
Belo Horizonte	24,5	22,0 - 27,0		20,2	16,9 - 23,6		28,2	24,3 - 32,0		
Boa Vista	18,9	15,2 - 22,5		18,7	12,4 - 24,9		19,1	15,2 - 23,0		
Campo Grande	24,2	21,6 - 26,8		23,7	19,5 - 27,8		24,6	21,3 - 27,9		
Cuiabá	22,3	19,8 - 24,7		19,3	15,9 - 22,7		25,0	21,5 - 28,5		
Curitiba	21,2	19,1 - 23,4		17,5	14,5 - 20,4		24,5	21,6 - 27,5		
Florianópolis	21,7	19,3 - 24,2		19,5	15,9 - 23,2		23,7	20,4 - 27,1		
Fortaleza	20,0	17,4 - 22,6		18,0	14,1 - 21,9		21,7	18,2 - 25,2		
Goiânia	18,9	16,8 - 21,1		18,5	15,5 - 21,5		19,4	16,4 - 22,3		
João Pessoa	24,1	21,2 - 27,1		22,2	17,6 - 26,9		25,7	22,0 - 29,4		
Macapá	17,6	15,0 - 20,2		13,3	10,1 - 16,5		21,8	17,8 - 25,7		
Maceió	21,8	18,6 - 25,0		19,4	14,3 - 24,5		23,8	19,8 - 27,8		
Manaus	16,3	14,1 - 18,5		12,9	10,1 - 15,8		19,4	16,2 - 22,7		
Natal	24,5	21,8 - 27,3		20,5	16,6 - 24,5		27,8	24,1 - 31,6		
Palmas	14,7	11,9 - 17,6		15,3	11,2 - 19,4		14,1	10,3 - 18,0		
Porto Alegre	26,2	23,5 - 28,8		22,3	18,5 - 26,0		29,4	25,7 - 33,0		
Porto Velho	19,7	17,0 - 22,3		17,4	13,8 - 20,9		22,0	18,0 - 25,9		
Recife	26,6	23,7 - 29,4		21,6	17,5 - 25,7		30,5	26,7 - 34,3		
Rio Branco	22,4	18,8 - 26,0		18,1	13,8 - 22,4		26,4	20,7 - 32,1		
Rio de Janeiro	29,5	26,7 - 32,3		23,4	19,0 - 27,7		34,6	31,0 - 38,2		
Salvador	23,7	20,9 - 26,4		21,2	17,4 - 25,1		25,7	21,8 - 29,6		
São Luís	16,7	14,5 - 19,0		12,8	9,6 - 16,0		20,0	16,9 - 23,0		
São Paulo	26,3	23,7 - 28,9		25,0	20,7 - 29,3		27,4	24,2 - 30,5		
Teresina	19,9	17,1 - 22,7		16,7	12,9 - 20,5		22,5	18,6 - 26,4		
Vitória	23,3	20,6 - 26,0		22,9	18,8 - 26,9		23,7	20,0 - 27,4		
Distrito Federal	20,4	18,0 - 22,8		19,3	15,8 - 22,8		21,4	18,2 - 24,6		

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 33 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 34 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, a frequência de diagnóstico médico prévio de hipertensão arterial alcançou 23,9%, sendo ligeiramente maior em mulheres (26,3%) do que em homens (21,0%). Em ambos os sexos, o diagnóstico de hipertensão arterial se torna mais comum com a idade, alcançando cerca de 6% dos indivíduos entre os 18 e os 24 anos de idade e mais de 50% na faixa etária de 65 anos ou mais de idade. Em ambos os sexos, indivíduos com até 8 anos de escolaridade são os que mais referem diagnóstico médico de hipertensão arterial. Entre mulheres, é mais marcada a associação inversa entre nível de escolaridade e diagnóstico da doença: enquanto 36,1% das mulheres com até 8 anos de escolaridade referem diagnóstico de hipertensão arterial, a mesma condição é observada em apenas 14,0% das mulheres com 12 ou mais anos de escolaridade (Tabela 36).

Tabela 36 – Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial no conjunto da população adulta nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo											
	Total			Masculino				Feminino				
	%	IC95%		%	IC95%			%	IC95%			
Idade (anos)												
18 a 24	6,5	4,8	- 8,1	6,0	3,4	- 8,7		6,9	4,8	- 9,0		
25 a 34	11,1	9,7	- 12,6	10,7	8,2	- 13,1		11,6	9,9	- 13,3		
35 a 44	21,1	19,6	- 22,7	18,9	16,7	- 21,0		23,1	20,9	- 25,3		
45 a 54	37,0	35,0	- 39,1	35,4	32,2	- 38,7		38,4	35,8	- 40,9		
55 a 64	52,0	49,5	- 54,5	47,4	43,2	- 51,5		55,7	52,6	- 58,8		
65 e mais	61,0	58,7	- 63,4	52,1	47,8	- 56,5		66,6	64,1	- 69,2		
Anos de escolaridade												
0 a 8	30,3	28,8	- 31,8	23,5	21,2	- 25,8		36,1	34,2	- 38,1		
9 a 11	16,0	15,2	- 16,9	16,1	14,8	- 17,4		15,9	14,8	- 17,0		
12 e mais	17,5	16,3	- 18,8	21,4	19,3	- 23,6		14,0	12,7	- 15,4		
Total	23,9	23,0	- 24,7	21,0	19,7	- 22,3		26,3	25,2	- 27,4		

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Diagnóstico médico prévio de diabetes

A frequência de adultos que referem diagnóstico médico prévio de diabetes variou entre 2,4% em Palmas e 6,7% em Natal e no Rio de Janeiro. No sexo masculino, as maiores frequências foram observadas em Porto Alegre (6,8%), Natal (6,6%) e São Paulo (6,0%), e as menores em Palmas (2,4%), Boa Vista (2,6%) e São Luís (2,7%). Entre mulheres, o diagnóstico de diabetes foi mais frequente no Rio de Janeiro (8,0%) e em São Paulo e Campo Grande (7,0%), e menos frequente em Palmas (2,4%), Manaus (3,3%) e Goiânia (3,6%) (Tabela 37 e Figuras 35 e 36).

Tabela 37 – Percentual de adultos (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal* – Vigitel 2008


Capitais/DF	Sexo										
	Total				Masculino				Feminino		
	%	IC95%			%	IC95%			%	IC95%	
Aracaju	5,7	4,5	-	6,9	4,8	3,1	-	6,4	6,4	4,7	- 8,1
Belém	3,9	2,8	-	5,1	3,8	2,0	-	5,6	4,0	2,5	- 5,5
Belo Horizonte	5,0	3,9	-	6,1	4,3	2,8	-	5,8	5,5	4,0	- 7,1
Boa Vista	3,4	2,2	-	4,7	2,6	1,4	-	3,8	4,3	2,1	- 6,5
Campo Grande	6,1	4,9	-	7,2	5,0	3,3	-	6,6	7,0	5,3	- 8,7
Cuiabá	4,2	3,2	-	5,1	4,3	2,8	-	5,7	4,0	2,8	- 5,3
Curitiba	4,5	3,6	-	5,4	4,6	3,1	-	6,1	4,3	3,2	- 5,4
Florianópolis	4,6	3,6	-	5,6	3,7	2,5	-	5,0	5,4	3,8	- 7,0
Fortaleza	5,3	4,1	-	6,5	4,3	2,7	-	5,9	6,1	4,3	- 7,8
Goiânia	3,7	2,9	-	4,5	3,8	2,5	-	5,2	3,6	2,6	- 4,6
João Pessoa	5,4	4,1	-	6,7	4,8	2,7	-	6,9	5,9	4,3	- 7,5
Macapá	4,1	2,8	-	5,4	4,6	2,1	-	7,0	3,6	2,5	- 4,8
Maceió	4,9	3,7	-	6,1	4,6	2,8	-	6,5	5,2	3,6	- 6,7
Manaus	4,3	2,9	-	5,6	5,3	2,8	-	7,9	3,3	2,2	- 4,4
Natal	6,7	5,2	-	8,3	6,6	4,0	-	9,2	6,9	5,2	- 8,7
Palmas	2,4	1,4	-	3,4	2,4	0,6	-	4,1	2,4	1,4	- 3,5
Porto Alegre	6,4	5,2	-	7,7	6,8	4,8	-	8,9	6,1	4,6	- 7,6
Porto Velho	4,8	3,6	-	6,0	3,9	2,3	-	5,5	5,6	3,8	- 7,5
Recife	5,2	4,0	-	6,4	4,9	3,0	-	6,9	5,4	4,0	- 6,8
Rio Branco	4,4	3,2	-	5,6	4,0	2,3	-	5,7	4,7	3,0	- 6,4
Rio de Janeiro	6,7	5,5	-	7,9	5,1	3,3	-	6,8	8,0	6,4	- 9,7
Salvador	4,7	3,5	-	5,8	4,4	2,4	-	6,3	5,0	3,6	- 6,3
São Luís	3,3	2,4	-	4,2	2,7	1,5	-	3,9	3,8	2,5	- 5,0
São Paulo	6,5	5,3	-	7,7	6,0	4,2	-	7,8	7,0	5,4	- 8,6
Teresina	4,9	3,6	-	6,1	4,2	2,6	-	5,7	5,5	3,5	- 7,4
Vitória	4,3	3,3	-	5,2	3,9	2,5	-	5,3	4,6	3,3	- 6,0
Distrito Federal	4,5	3,5	-	5,5	4,7	3,0	-	6,3	4,3	3,1	- 5,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos).


IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Figura 35 – Percentual de homens (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de diabetes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

Figura 36 – Percentual de mulheres (≥ 18 anos) que referem diagnóstico médico de diabetes, segundo as capitais dos estados brasileiros e o Distrito Federal – Vigitel 2008



Fonte: VIGITEL 2008

No conjunto da população adulta das 27 cidades estudadas, a frequência do diagnóstico médico prévio de diabetes foi de 5,5%, sendo semelhante em ambos os sexos. Em ambos os sexos, o diagnóstico da doença se torna mais comum com a idade, alcançando menos de 1% dos indivíduos entre 18 e 24 anos de idade e mais de 20% após os 64 anos. Em ambos os sexos, indivíduos com até oito anos de escolaridade são os que mais referem o diagnóstico médico de diabetes. A associação inversa entre diagnóstico de diabetes e nível de escolaridade é bem marcante em ambos os sexos: enquanto 6,3% dos homens e 8,7% das mulheres com até 8 anos de escolaridade referem diagnóstico da doença, a mesma condição é observada em 3,8% dos homens e 2,6% das mulheres com 12 ou mais anos de escolaridade (Tabela 38).

Tabela 38 – Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes no conjunto das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade* – Vigitel 2008

Variáveis	Sexo											
	Total				Masculino				Feminino			
	%		IC95%		%		IC95%		%		IC95%	
Idade (anos)												
18 a 24	0,6	0,3	-	0,9	0,9	0,3	-	1,4	0,3	0,1	-	0,5
25 a 34	0,9	0,6	-	1,2	0,9	0,4	-	1,3	0,9	0,5	-	1,3
35 a 44	3,4	2,7	-	4,1	3,5	2,4	-	4,6	3,3	2,4	-	4,3
45 a 54	8,8	7,5	-	10,0	7,6	5,8	-	9,4	9,7	7,9	-	11,5
55 a 64	15,5	13,5	-	17,4	15,2	12,1	-	18,2	15,7	13,3	-	18,1
65 e mais	20,9	18,9	-	23,0	20,1	16,4	-	23,8	21,5	19,1	-	23,8
Anos de escolaridade												
0 a 8	7,6	6,9	-	8,3	6,3	5,3	-	7,3	8,7	7,8	-	9,6
9 a 11	3,1	2,7	-	3,4	3,2	2,6	-	3,8	3,0	2,5	-	3,4
12 e mais	3,1	2,6	-	3,7	3,8	2,9	-	4,7	2,6	2,0	-	3,1
Total	5,5	5,1	-	5,9	5,0	4,4	-	5,5	5,9	5,4	-	6,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

VARIAÇÃO TEMPORAL 2006-2008

Um dos principais objetivos do Vigitel é propiciar séries históricas que caracterizem a evolução anual da frequência dos principais fatores de risco e proteção para doenças crônicas no País. Essas séries históricas dependerão, obviamente, da continuidade da operação do sistema e do acúmulo de estimativas que cubram um período suficientemente longo de tempo.

A seguir, destacaremos, entre os indicadores divulgados neste relatório, aqueles cuja frequência no conjunto das 27 cidades tenha variado, de forma uniforme e significativa, ao longo do período. Para tanto, excluímos inicialmente indicadores cuja definição tenha sofrido alteração no período 2006-2008, caso dos indicadores relacionados ao consumo de frutas e hortaliças, que passaram a incluir o consumo de sucos de fruta. A seguir, selecionamos todos os indicadores cuja frequência, em pelo menos um dos sexos, tenha mostrado aumento ou declínio contínuo ao longo do período, portanto, entre 2006 e 2007 e entre 2007 e 2008. Para cada um dos indicadores que atendiam esta condição, desenvolvemos modelos de regressão logística que levaram em conta o conjunto de dados gerados pelas entrevistas realizadas nos três inquéritos. A variável dependente desses modelos foi sempre o *status* do indivíduo entrevistado em relação ao indicador (negativo=0; positivo=1), sendo o ano do inquérito a variável explanatória expressa de forma contínua. Considerou-se significativa a evolução correspondente a um coeficiente de regressão para a variável ano estatisticamente diferente de zero (p valor < 0,05).

Os resultados apresentados nesta seção devem ser vistos com cautela, em face de que o exíguo período de tempo que separa os três inquéritos pode não ter sido suficiente para produzir variações temporais estatisticamente detectáveis. Ou seja, o poder estatístico da análise, embora elevado em face do tamanho amostral dos três inquéritos, pode não ter sido suficiente para detectar variações reais, porém de magnitude muito pequena. Deve-se também levar em conta que critérios estatísticos dizem respeito apenas a erros amostrais. Diferenças estatisticamente significantes informam apenas que variações no período, como as observadas, são improváveis na ausência de diferenças reais entre as correspondentes populações estudadas em 2006, 2007 e 2008. Erros não amostrais não são considerados pelo critério estatístico. Por essas razões, as tendências de evolução dos vários indicadores disponibilizados pelo Vigitel poderão ser estabelecidas com confiança apenas com a continuidade do sistema e o acúmulo de informações.

No Quadro 2 apresenta-se a evolução de indicadores do Vigitel que variaram de forma uniforme e significativa no período 2006-2008 em pelo menos um dos sexos, levando em conta a população adulta do conjunto das 27 cidades cobertas pelo sistema.

No período 2006-2008 foram registradas variações temporais significativas na frequência de obesidade, no consumo de carnes com excesso de gordura, consumo abusivo de bebida alcoólica e diagnóstico médico prévio de hipertensão arterial.

Quadro 2 – Variações no percentual de indivíduos expostos a fatores de risco e proteção para doenças crônicas no conjunto da população adulta das capitais nos estados brasileiros e no Distrito Federal entre 2006 e 2008 – Vigitel 2006, 2007 e 2008

Fator	Sexo	2006	2007	2008	p valor
Obesidade (IMC $\geq$ 30 kg/m ²)	Masculino	11,4	12,0	13,1	0,014
	Feminino	11,4	13,5	13,1	0,004
	Ambos	11,4	12,7	13,1	< 0,001
Consumo de carnes com excesso de gordura	Masculino	51,0	43,0	44,1	< 0,001
	Feminino	28,9	24,6	24,2	< 0,001
	Ambos	39,1	33,1	33,4	< 0,001
Consumo abusivo de bebidas alcoólicas*	Masculino	25,5	27,1	26,6	0,296
	Feminino	8,2	9,2	9,8	0,001
	Ambos	16,2	17,5	17,6	0,012
Hipertensão arterial diagnosticada por médico	Masculino	18,4	19,9	21,0	0,002
	Feminino	24,2	24,5	26,3	0,005
	Ambos	21,5	22,3	23,9	< 0,001

Fonte: VIGITEL 2006, 2007 e 2008

* Adultos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou mais do que cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião.

A frequência da obesidade tendeu a aumentar em homens e mulheres, sendo uniforme e estatisticamente significativo o aumento em homens e nos dois sexos combinados.

A frequência do consumo de carnes com excesso de gordura apresentou queda estatisticamente significante em ambos os sexos e uniforme em mulheres.

A frequência do consumo abusivo de bebida alcoólica aumentou uniforme e significativamente em mulheres e nos dois sexos combinados.

Finalmente, a frequência de indivíduos que referiram hipertensão arterial diagnosticada por médico tendeu a aumentar em homens e mulheres, sendo uniforme e significativo o aumento observado em ambos os sexos e nos dois sexos combinados.

REFERÊNCIAS

AINSWORTH, B. E. et al. Compendium of physical activity codes and MET intensities. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, Indianapolis, v. 32, p. 498-504, 2000.

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (Inca). *Controle do câncer de mama: documento de consenso*. Rio de Janeiro, 2003.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. *Vigitel Brasil 2006: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico*. Brasília, 2007.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação em Saúde. *Saúde Brasil 2007: uma análise da situação de saúde no Brasil*. Brasília, 2008a.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Diretrizes e recomendações para o cuidado integral de doenças crônicas não transmissíveis: promoção da saúde, vigilância, prevenção e assistência*. Brasília, 2008b.

_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. *Vigitel Brasil 2007: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico*. Brasília, 2008c.

CARVALHAES, M. A. B. L.; MOURA, E. C.; MONTEIRO, C. A. Prevalência de fatores de risco para doenças crônicas: inquérito populacional mediante entrevistas telefônicas em Botucatu, São Paulo, 2004. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 11, p. 14-23, 2008.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION – CDC. Behavioral Risk Factor Surveillance System – BRFSS. *About the BRFSS*, 2008. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/brfss/about/htm>>. Acesso em: 20 fev. 2009.

MALTA, D. C. et al. Padrão de atividade física em adultos brasileiros: resultados de um inquérito por entrevistas telefônicas, 2006. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, volume 18, número 1, p. 7-16, 2009.

MONTEIRO, C. A. et al. Monitoramento de fatores de risco para as doenças crônicas por entrevistas telefônicas. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 39, p. 47-57, 2005.

_____. *Simtel* – cinco cidades: implantação, avaliação e resultados de um sistema municipal de monitoramento de fatores de risco nutricionais para doenças crônicas não transmissíveis a partir de entrevistas telefônicas em cinco municípios brasileiros. São Paulo: Nupens/USP, 2007. 41 p. Relatório Técnico.

MOURA, E. C. et al. Vigilância de fatores de risco para doenças crônicas por inquérito telefônico nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal (2006). *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 11, p. 20-37, 2008.

PATE, R. R. et al. Physical activity and public health: a recommendation from the centers for disease control and prevention and the american college of sports medicine. *Journal of the American Medical Association*, Columbia, v. 273, p. 402-407, 1995.

REMINGTON, P. L. et al. Design, characteristics, and usefulness of state-based behavioral risk factor surveillance: 1981-87. *Public Health Reports*, Washington DC, v. 103, p. 366-375, 1988.

STATA CORPORATION. *Stata Statistical Software*: Release 9.0. Stata Corporation: College Station, TX, 2005.

WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO. *Sample size determination in health studies*: a practical manual. Geneva, 1991.

_____. *Obesity*: preventing and managing the global epidemic. Report a WHO Consultation on Obesity. Geneva, 2000 (WHO Technical Report Series, 894).

_____. *Summary*: surveillance of risk factors for noncommunicable diseases. The WHO Step wise approach. Geneva, 2001.

_____. *World Health Report 2002*. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva: WHO, 2002.

_____. *Diet, nutrition and the prevention chronic diseases*. Geneva: WHO, 2003. (WHO Technical Report Series, 916).

_____. *Global strategy on diet, physical activity and health*. Geneva: WHO, 2004. (Fifty-Seventh World Health Assembly, WHA57.17).

_____. *Preventing Chronic Diseases*: a vital investments. Geneva: WHO, v. 1., 2005. 182 p.



ANEXOS



ANEXO A

Modelo do Questionário Eletrônico

QUESTIONÁRIO 2008

MINISTÉRIO DA SAÚDE – SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

VIGILÂNCIA DE FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA DOENÇAS CRÔNICAS
NÃO TRANSMISSÍVEIS POR ENTREVISTAS TELEFÔNICAS – VIGITEL – 2008

Apoio: Nupens-USP e Segep-MS

Disque Saúde = 0800-61-1997

Operador: **xx**

Réplica: **xx**

Cidade: **xx**, confirma a cidade: ☐ sim ☐ não (agradeça e encerre; excluir do banco amostral e da agenda)

1. Réplica **XX** número de moradores **XX** número de adultos **XX**
2. Bom dia/tarde/noite. Meu nome é **XXXX**. Estou falando do Ministério da Saúde, o número do seu telefone é **XXXX**?
☐ sim
☐ não – Desculpe, liguei no número errado.
3. Sr(a) gostaria de falar com o(a) sr(a) **NOME DO SORTEADO**. Ele(a) está?
☐ sim
☐ não - Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos com o(a) Sr(a) **NOME DO SORTEADO**?
☐ residência a retornar. Obrigado(a), retornaremos a ligação. Encerre.

3.a Posso falar com ele agora?
☐ sim
☐ não - Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos com o(a) Sr(a) **NOME DO SORTEADO**?
☐ residência a retornar. Obrigado(a), retornaremos a ligação. Encerre.
4. O(a) sr(a) foi informado sobre a avaliação que o Ministério da Saúde está fazendo?
☐ sim (pule para q5)
☐ não - O Ministério da Saúde está avaliando as condições de saúde da população brasileira e o seu número de telefone e o(a) sr(a) foram selecionados para participar de uma entrevista. A entrevista deverá durar cerca de 7 minutos. Suas respostas serão mantidas em total sigilo e serão utilizadas junto com as respostas dos demais entrevistados para fornecer um retrato das condições atuais de saúde da população brasileira. Para sua segurança, esta entrevista poderá ser gravada. Caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa, poderá esclarecê-la diretamente no Disque Saúde do Ministério da Saúde, no telefone: 0800-61-1997. O(a) sr(a) gostaria de anotar o telefone agora ou no final da entrevista?

5. Podemos iniciar a entrevista?
 - ☐ sim (pule para q6)
 - ☐ não - Qual o melhor dia da semana e período para conversarmos?
 - ☐ residência a retornar. Obrigado(a), retornaremos a ligação. Encerre.

6. Qual sua idade? (só aceita ≥ 18 anos e < 150) ____anos (se < 21 anos, pule q12 a q13)

7. Sexo:
 - ☐ masculino (pule a q14)
 - ☐ feminino (se > 50 anos, pule a q14)

8. Até que série e grau o(a) sr(a) estudou?

8a ☐ curso primário ☐ admissão ☐ curso ginásial ou ginásio ☐ 1º grau ou fundamental ou supletivo de 1º grau ☐ 2º grau ou colégio ou técnico ou normal ou científico ou ensino médio ou supletivo de 2º grau ☐ 3º grau ou curso superior ☐ pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado) ☐ nunca estudou ☐ Não sabe (só aceita q6>60) ☐ Não quis responder	8b ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ou + ☐ 1 ou +

9. O(a) sr(a) sabe seu peso (mesmo que seja valor aproximado)? (só aceita ≥ 30 Kg e < 300 kg)
 ____ , ____ kg ☐ não sabe ☐ não quis informar

10. Quanto tempo faz que se pesou da última vez?
 - ☐ menos de 1 semana
 - ☐ entre 1 semana e 1 mês
 - ☐ entre 1 mês e 3 meses
 - ☐ entre 3 e 6 meses
 - ☐ 6 ou mais meses
 - ☐ nunca se pesou
 - ☐ não lembra

11. O(a) sr(a) sabe sua altura? (só aceita $\geq 1,20$ m e $< 2,20$ m)
 ____ m ____ cm ☐ não sabe ☐ não quis informar

12. O(a) sr(a) lembra qual seu peso aproximado por volta dos 20 anos de idade? (apenas para q6 > 20 anos)
 - ☐ sim
 - ☐ não (pule para q14)

13. Qual era? (só aceita ≥ 30 Kg e < 300 kg) _____ kg
 - ☐ não quis informar

14. A sra está grávida no momento?

☐ sim

☐ não

☐ não sabe

Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre sua alimentação:

15. Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma comer feijão?

☐ 1 a 2 dias por semana

☐ 3 a 4 dias por semana

☐ 5 a 6 dias por semana

☐ todos os dias (inclusive sábado e domingo)

☐ quase nunca

☐ nunca

16. Em quantos dias da semana, o(a) sr(a) costuma comer pelo menos um tipo de verdura ou legume (alface, tomate, couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha – não vale batata, mandioca ou inhame)?

☐ 1 a 2 dias por semana

☐ 3 a 4 dias por semana

☐ 5 a 6 dias por semana

☐ todos os dias

☐ quase nunca (pule para q21)

☐ nunca (pule para q21)

17. Em quantos dias da semana, o(a) sr(a) costuma comer salada de alface e tomate ou salada de qualquer outra verdura ou legume cru?

☐ 1 a 2 dias por semana

☐ 3 a 4 dias por semana

☐ 5 a 6 dias por semana

☐ todos os dias

☐ quase nunca (pule para q19)

☐ nunca (pule para q19)

18. Num dia comum, o(a) sr(a) come este tipo de salada:

☐ no almoço (1 vez no dia)

☐ no jantar ou

☐ no almoço e no jantar (2 vezes no dia)

19. Em quantos dias da semana, o(a) sr(a) costuma comer verdura ou legume cozido junto com a comida ou na sopa, como por exemplo, couve, cenoura, chuchu, berinjela, abobrinha, sem contar batata, mandioca ou inhame?

☐ 1 a 2 dias por semana

☐ 3 a 4 dias por semana

☐ 5 a 6 dias por semana

☐ todos os dias

☐ quase nunca (pule para q21)

☐ nunca (pule para q21)

20. Num dia comum, o(a) sr(a) come verdura ou legume cozido:

☐ no almoço (1 vez no dia)

- ☐ no jantar ou
 - ☐ no almoço e no jantar (2 vezes no dia)
21. Em quantos dias da semana o (a) sr(a) costuma comer carne vermelha (boi, porco, cabrito)?
- ☐ 1 a 2 dias por semana
 - ☐ 3 a 4 dias por semana
 - ☐ 5 a 6 dias por semana
 - ☐ todos os dias
 - ☐ quase nunca (pule para q23)
 - ☐ nunca (pule para q23)
22. Quando o(a) sr(a) come carne vermelha com gordura, o(a) sr(a) costuma:
- ☐ tirar sempre o excesso de gordura visível
 - ☐ comer com a gordura
 - ☐ não come carne vermelha com muita gordura
23. Em quantos dias da semana o (a) sr(a) costuma comer frango?
- ☐ 1 a 2 dias por semana
 - ☐ 3 a 4 dias por semana
 - ☐ 5 a 6 dias por semana
 - ☐ todos os dias
 - ☐ quase nunca (pule para q25)
 - ☐ nunca (pule para q25)
24. Quando o(a) sr(a) come frango com pele, o(a) sr(a) costuma:
- ☐ tirar sempre a pele
 - ☐ comer com a pele
 - ☐ não come pedaços de frango com pele
25. Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma tomar suco de frutas natural?
- ☐ 1 a 2 dias por semana
 - ☐ 3 a 4 dias por semana
 - ☐ 5 a 6 dias por semana
 - ☐ todos os dias
 - ☐ quase nunca (pule para q27)
 - ☐ nunca (pule para q27)
26. Num dia comum, quantas copos o(a) sr(a) toma de suco de frutas natural?
- ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 3 ou mais
27. Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma comer frutas?
- ☐ 1 a 2 dias por semana
 - ☐ 3 a 4 dias por semana
 - ☐ 5 a 6 dias por semana
 - ☐ todos os dias
 - ☐ quase nunca (pule para q29)
 - ☐ nunca (pule para q29)

28. Num dia comum, quantas vezes o(a) sr(a) come frutas?
- ☐ 1 vez no dia
 - ☐ 2 vezes no dia
 - ☐ 3 ou mais vezes no dia
29. Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma tomar refrigerante (ou suco artificial tipo **tampico**)?
- ☐ 1 a 2 dias por semana
 - ☐ 3 a 4 dias por semana
 - ☐ 5 a 6 dias por semana
 - ☐ todos os dias
 - ☐ quase nunca (pule para q32)
 - ☐ nunca (pule para q32)
30. Que tipo?
- ☐ normal
 - ☐ diet/light
 - ☐ ambos
31. Quantos copos/latinhas costuma tomar por dia?
- ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6 ou +
 - ☐ não sabe
32. Em quantos dias da semana o(a) sr(a) costuma tomar leite? (**não vale leite de soja**)
- ☐ 1 a 2 dias por semana
 - ☐ 3 a 4 dias por semana
 - ☐ 5 a 6 dias por semana
 - ☐ todos os dias
 - ☐ quase nunca (pule para q34)
 - ☐ nunca (pule para q34)
33. Quando o sr(a) toma leite, que tipo de leite costuma tomar?
- ☐ integral
 - ☐ desnatado ou semi-desnatado
 - ☐ os dois tipos
 - ☐ não sabe
34. Quantos dias na última semana, o (a) sr(a) comeu fora de casa?
- ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5
 - ☐ 6
 - ☐ Todos os dias da semana
 - ☐ Nenhum
35. O(a) sr(a) costuma consumir bebida alcoólica?
- ☐ sim
 - ☐ não (pula para q41)
36. Com que frequência o(a) sr(a) costuma ingerir alguma bebida alcoólica?
- ☐ 1 a 2 dias por semana
 - ☐ 3 a 4 dias por semana
 - ☐ 5 a 6 dias por semana
 - ☐ todos os dias
 - ☐ menos de 1 dia por semana
 - ☐ menos de 1 dia por mês (pule para q41)

37. Nos últimos 30 dias, o sr chegou a consumir mais do que 5 doses de bebida alcoólica em uma única ocasião? (mais de 5 doses de bebida alcoólica seriam mais de 5 latas de cerveja, mais de 5 taças de vinho ou mais de 5 doses de cachaça, whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada) (só para homens)
- ☐ sim (pule para q39)
- ☐ não (pule para q41)
38. Nos últimos 30 dias, a sra chegou a consumir mais do que 4 doses de bebida alcoólica em uma única ocasião? (mais de 4 doses de bebida alcoólica seriam mais de 4 latas de cerveja, mais de 4 taças de vinho ou mais de 4 doses de cachaça, whisky ou qualquer outra bebida alcoólica destilada) (só para mulheres)
- ☐ sim
- ☐ não (pule para q41)
39. Em quantos dias do mês isto ocorreu?
- ☐ em um único dia no mês; ☐ em 2 dias ☐ em 3 dias ☐ em 4 dias
- ☐ em 5 dias ☐ em 6 dias ☐ em 7 ou mais dias ☐ Não sabe
40. Neste dia (ou em algum destes dias), o(a) sr(a) dirigiu logo depois de beber?
- ☐ sim ☐ não
41. O(a) sr(a) costuma adicionar sal na comida pronta, no seu prato, sem contar a salada?
- ☐ não
- ☐ sim, sempre ou quase sempre
- ☐ sim, de vez em quando

Nas próximas questões, vamos perguntar sobre suas atividades físicas do dia-a-dia.

42. Nos últimos três meses, o(a) sr(a) praticou algum tipo de exercício físico ou esporte? (não vale fisioterapia)
- ☐ sim ☐ não (pule para q47)
43. Qual o tipo principal de exercício físico ou esporte que o(a) sr(a) praticou? ANOTAR APENAS O PRIMEIRO CITADO
- ☐ caminhada (não vale deslocamento para trabalho)
- ☐ caminhada em esteira
- ☐ corrida
- ☐ corrida em esteira
- ☐ musculação
- ☐ ginástica aeróbica
- ☐ hidroginástica
- ☐ ginástica em geral
- ☐ natação
- ☐ artes marciais e luta
- ☐ bicicleta
- ☐ futebol
- ☐ basquetebol
- ☐ voleibol
- ☐ tênis
- ☐ outros

44. O(a) sr(a) pratica o exercício pelo menos uma vez por semana?
☐ sim
☐ não – (pule para q47)
45. Quantos dias por semana o(a) sr(a) costuma praticar exercício físico ou esporte?
☐ 1 a 2 dias por semana
☐ 3 a 4 dias por semana
☐ 5 a 6 dias por semana
☐ todos os dias
46. No dia que o(a) sr(a) pratica exercício ou esporte, quanto tempo dura esta atividade?
☐ menos que 10 minutos
☐ entre 10 e 19 minutos
☐ entre 20 e 29 minutos
☐ entre 30 e 44 minutos
☐ entre 45 e 59 minutos
☐ 60 minutos ou mais
47. Nos últimos três meses, o(a) sr(a) trabalhou?
☐ sim ☐ não – (pule para q52)
48. No seu trabalho, o(a) sr(a) anda bastante a pé?
☐ sim ☐ não ☐ não sabe
49. No seu trabalho, o(a) sr(a) carrega peso ou faz outra atividade pesada?
☐ sim ☐ não ☐ não sabe
50. O(a) sr(a) costuma ir a pé ou de bicicleta de casa para o trabalho:
☐ sim ☐ não (pule para q52)
51. Quanto tempo o(a) sr(a) gasta para ir e voltar do trabalho?
☐ menos que 20 minutos
☐ entre 20 e 29 minutos
☐ 30 minutos ou mais
52. Quem costuma fazer a faxina da sua casa?
☐ eu sozinho (pula)
☐ eu com outra pessoa
☐ outra pessoa (pule para q54)
53. A parte mais pesada da faxina fica com:
☐ o(a) sr(a) ou ☐ outra pessoa ☐ ambos
54. O(a) sr(a) costuma assistir televisão todos os dias?
☐ sim (pule para q56) ☐ não
55. Quantos dias por semana o(a) sr(a) costuma assistir televisão?
☐ 5 ou mais ☐ 3 a 4 ☐ 1 a 2
☐ não costuma assistir televisão (pule para q57)

56. Quantas horas por dia o(a) sr(a) costuma assistir televisão?
- ☐ menos de 1 hora
 - ☐ entre 1 e 2 horas
 - ☐ entre 2 e 3 horas
 - ☐ entre 3 e 4 horas
 - ☐ entre 4 e 5 horas
 - ☐ entre 5 e 6 horas
 - ☐ mais de 6 horas
57. O(a) sr(a) fuma?
- ☐ sim, diariamente
 - ☐ sim, ocasionalmente
 - ☐ não – (pule para q61)
58. Quantos cigarros o(a) sr(a) fuma por dia?
- ☐ 1-4 ☐ 5-9 ☐ 10-14 ☐ 15-19 ☐ 20-29 ☐ 30-39 ☐ 40 ou +
59. Que idade o(a) sr(a) tinha quando começou a fumar regularmente? (só aceita ≥ 5 anos e $\leq q6$)
- _____ anos ☐ não lembra
60. O(a) senhor(a) já tentou parar de fumar?
- ☐ sim (pule para q64) ☐ não (pule para q64)
61. O(a) sr(a) já fumou?
- ☐ sim ☐ não (pule para q64)
62. Que idade o(a) sr(a) tinha quando começou a fumar regularmente? (só aceita ≥ 5 anos e $\leq q6$)
- _____ anos ☐ não lembra
63. Que idade o(a) sr(a) tinha quando parou de fumar? (só aceita ≥ 62 e $\leq q6$)
- _____ anos ☐ não lembra

Para finalizar, nós precisamos saber:

64. Qual seu estado civil atual?
- ☐ solteiro
 - ☐ casado / juntado
 - ☐ viúvo
 - ☐ separado/divorciado
65. A cor de sua pele é:
- ☐ branca
 - ☐ negra
 - ☐ parda ou morena
 - ☐ amarela (apenas ascendência oriental)
 - ☐ vermelha (confirmar ascendência indígena)
 - ☐ não sabe
 - ☐ não quis informar

66. Além deste número de telefone, tem outro número de telefone fixo em sua casa?
(não vale extensão)
☐ sim ☐ não – (pule a q93)
67. Se sim: Quantos no total? ____ números ou linhas telefônicas
68. Há quanto tempo tem telefone fixo em sua residência?
☐ menos de 1 ano ☐ entre 1 e 2 anos ☐ entre 2 e 3 anos
☐ entre 3 e 4 anos ☐ entre 4 e 5 anos
☐ mais de 5 anos ☐ não lembra
69. O(a) sr(a) tem celular?
☐ sim ☐ não ☐ não quis informar

Agora estamos chegando ao final do questionário e gostaríamos de saber sobre seu estado de saúde.

70. O(a) sr(a) classificaria seu estado de saúde como:
☐ muito bom,
☐ bom,
☐ regular ou
☐ ruim
☐ muito ruim
☐ não sabe
☐ não quis informar
71. Algum médico já lhe disse que o(a) sr(a) tem pressão alta?
☐ sim ☐ não ☐ não lembra
72. E diabetes?
☐ sim ☐ não ☐ não lembra
73. E infarto, derrame ou acidente vascular cerebral (AVC)?
☐ sim ☐ não ☐ não lembra
74. E colesterol ou triglicérides elevado?
☐ sim ☐ não ☐ não lembra
75. E osteoporose (doença/fraqueza dos ossos)?
☐ sim ☐ não ☐ não lembra
76. E doenças como asma, bronquite asmática, bronquite crônica ou enfisema?
☐ sim ☐ não (pule para q78) ☐ não lembra (pule para q78)
77. E ainda tem? (asma, bronquite asmática, bronquite crônica ou enfisema)
☐ sim ☐ não ☐ não sabe
78. A sra já fez alguma vez exame de papanicolau, exame do colo do útero? (apenas para sexo feminino)
☐ sim ☐ não (pule para q80) ☐ não sabe (pule para q80)

79. Quanto tempo faz que a sra fez exame de papanicolau?
☐ menos de 1 ano ☐ entre 1 e 2 anos ☐ entre 2 e 3 anos
☐ entre 3 e 5 anos ☐ 5 ou mais anos ☐ não lembra
80. A sra já fez alguma vez mamografia, raio x das mamas? (apenas para sexo feminino)
☐ sim ☐ não (pule para q82) ☐ não sabe (pule para q82)
81. Quanto tempo faz que a sra fez mamografia?
☐ menos de 1 ano ☐ entre 1 e 2 anos ☐ entre 2 e 3 anos
☐ entre 3 e 5 anos ☐ 5 ou mais anos
☐ não lembra
82. Quando o(a) sr(a) fica exposto ao sol, por mais de 30 minutos seja andando na rua, no trabalho ou no lazer, costuma usar alguma proteção?
☐ sim
☐ não (pule para q84)
☐ não fica exposto mais de 30 minutos (pule para q84)
83. Que tipo de proteção o(a) sr(a) costuma usar?
☐ filtro solar ☐ chapéu, sombrinha ☐ ambos
84. Nos últimos 12 meses, o(a) sr(a) sentiu necessidade ou precisou buscar atendimento médico ou psicológico para problemas relacionados a sua saúde mental, como ansiedade, nervosismo, angústia ou depressão?
☐ sim ☐ não (pule para q86) ☐ não quis informar (pule para q86)
85. O(a) sr(a) conseguiu ser atendido?
☐ sim ☐ não ☐ não quis informar
86. Atualmente, o(a) sr(a) usa algum método para evitar a gravidez?
☐ Sim
☐ Não, não uso (pule para q89)
☐ Não, não tenho atividade sexual (pule para q89)
☐ Não quis informar (pule para q89)
87. Que método o(a) sr(a) usa atualmente com maior frequência?
87a se mulher
☐ Laqueadura – ligadura de trompa
☐ Camisinha ☐ Pílula ☐ DIU ☐ Diafragma
☐ Injeção ☐ Implante hormonal ☐ Outros
87b se homem
☐ Vasectomia ☐ Camisinha ☐ Outros
88. Qual método o(a) sr(a) gostaria de usar?
88a se mulher
☐ Laqueadura – ligadura de trompa
☐ Camisinha ☐ Pílula ☐ DIU ☐ Diafragma
☐ Injeção ☐ Implante hormonal ☐ Outros
88b se homem
☐ Vasectomia ☐ Camisinha ☐ Outros

89. O(a) sr(a) tem plano de saúde ou convênio médico?

☐ Sim, apenas 1 ☐ Sim, mais de um ☐ Não ☐ Não quis informar

90. Qual é o nome da operadora ou plano de saúde?

Sr(a) **XX Agradecemos pela sua colaboração. Se tivermos alguma dúvida voltaremos a lhe telefonar. Se não anotou o telefone no início da entrevista: Gostaria de anotar o número de telefone do Disque Saúde?**

Se sim: O número é 0800-61-1997.

Observações (entrevistador):

Nota: Mencionar para o entrevistado as alternativas de resposta apenas quando as mesmas se iniciarem por parêntesis



ANEXO B

Estimativas para a Distribuição (%) da População
Adulta Total e da População Adulta com Telefone
Segundo Variáveis Sociodemográficas.
2000/2008

Estimativas para a Distribuição (%) da População Adulta Total e da População Adulta com Telefone Segundo Variáveis Sociodemográficas. 2000/2008.

Cidade	População adulta	Sexo		Idade (anos)							Anos de escolaridade			
		Masculino	Feminino	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e+	0-8	9-11	12 e+		
Aracaju (n=2014)	total	45,1	54,9	24,0	26,5	20,7	13,8	7,6	7,5	54,7	30,2	15,1		
	com telefone	38,4	61,6	19,5	20,4	17,7	17,6	13,8	10,9	24,9	41,2	33,9		
Belém (n=2012)	total	46,2	53,8	24,6	27,1	20,2	13,1	7,7	7,3	54,0	34,5	11,5		
	com telefone	42,6	57,4	18,9	21,8	19,0	17,5	12,7	10,1	27,5	46,1	26,4		
Belo Horizonte (n=2016)	total	45,9	54,1	20,9	24,3	21,7	15,0	9,3	8,9	51,6	30,2	18,2		
	com telefone	40,4	59,6	16,7	19,3	18,9	20,1	13,4	11,6	32,5	40,9	26,6		
Boa Vista (n=2013)	total	49,8	50,2	27,4	29,6	21,6	11,7	5,1	4,6	59,2	31,8	9,0		
	com telefone	42,5	57,5	21,3	24,5	20,3	17,6	10,8	5,5	26,9	45,1	27,9		
Campo Grande (n=2012)	total	47,6	52,4	21,6	25,8	22,3	14,4	8,5	7,4	58,1	25,8	16,0		
	com telefone	39,4	60,6	15,8	18,0	20,8	20,4	13,0	11,9	35,1	37,9	27,0		
Cuiabá (n=2012)	total	47,8	52,2	24,1	26,9	22,3	13,7	7,4	5,7	51,1	32,5	16,4		
	com telefone	40,7	59,3	18,3	20,5	20,8	19,5	12,0	9,0	26,7	40,5	32,8		
Curitiba (n=2012)	total	46,7	53,3	20,4	25,3	22,0	15,3	8,9	8,2	47,1	31,3	21,6		
	com telefone	40,1	59,9	14,3	19,9	21,6	18,2	14,2	11,9	32,6	38,1	29,3		
Florianópolis (n=2011)	total	47,4	52,6	20,8	24,2	22,4	15,8	8,8	8,0	41,7	29,8	28,4		
	com telefone	43,6	56,4	16,9	19,0	16,5	20,4	14,3	12,9	23,3	35,1	41,6		
Fortaleza (n=2010)	total	45,0	55,0	22,7	26,4	21,1	13,8	8,0	7,9	59,9	28,4	11,8		
	com telefone	41,8	58,2	18,9	19,6	18,6	17,9	12,9	12,1	28,4	39,9	31,7		
Goiânia (n=2014)	total	46,6	53,4	23,2	26,3	21,5	14,2	8,1	6,6	52,0	31,8	16,1		
	com telefone	42,0	58,0	16,6	21,3	20,2	19,6	12,9	9,5	33,1	40,1	26,8		
João Pessoa (n=2012)	total	45,0	55,0	22,3	25,8	21,1	13,9	8,5	8,5	54,4	28,2	17,5		
	com telefone	38,7	61,3	19,5	16,8	16,7	19,8	13,7	13,6	24,2	36,9	38,9		
Macapá (n=2014)	total	48,5	51,5	28,3	30,2	19,9	10,9	5,6	5,1	56,9	35,5	7,6		
	com telefone	42,1	57,9	23,3	23,3	20,2	16,9	8,6	7,7	24,7	45,6	29,7		
Maceió (n=2016)	total	45,5	54,5	23,3	27,6	21,1	13,6	7,5	6,9	62,4	25,6	12,0		
	com telefone	38,8	61,2	18,9	17,8	19,5	19,8	13,4	10,6	28,1	40,0	31,9		
Manaus (n=2012)	total	48,0	52,0	27,0	29,3	20,8	11,8	6,0	5,2	58,0	33,7	8,4		
	com telefone	42,7	57,3	21,6	23,1	19,6	17,9	9,9	8,0	29,3	49,8	20,9		

Cidade	População adulta	Sexo		Idade (anos)							Anos de escolaridade			
		Masculino	Feminino	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 e+	0-8	9-11	12 e+		
Natal (n=2019)	total	45,3	54,7	22,3	25,2	21,6	14,1	8,4	8,3	55,8	30,8	13,4		
	com telefone	41,7	58,3	18,7	19,0	17,0	18,7	14,2	12,4	28,5	43,2	28,3		
Palmas (n=2014)	total	50,3	49,7	29,1	32,1	21,0	10,5	4,7	2,6	54,9	32,9	12,2		
	com telefone	44,4	55,6	21,3	24,6	24,2	16,9	8,4	4,5	18,4	37,7	43,9		
Porto Alegre (n=2013)	total	45,1	54,9	18,2	21,1	21,6	16,8	10,7	11,6	45,9	27,7	26,5		
	com telefone	41,3	58,7	13,2	17,3	16,1	22,2	15,4	15,7	27,4	36,8	35,8		
Porto Velho (n=2014)	total	49,4	50,6	25,1	29,1	22,7	12,4	5,9	4,8	60,1	31,2	8,7		
	com telefone	42,8	57,2	19,7	22,0	22,2	19,1	9,9	7,0	30,9	41,0	28,1		
Recife (n=2010)	total	44,6	55,4	20,7	25,0	21,1	14,6	9,0	9,6	54,8	28,3	17,0		
	com telefone	39,7	60,3	17,4	18,4	17,2	19,7	15,4	11,9	27,9	39,9	32,2		
Rio Branco (n=2012)	total	47,8	52,2	26,8	28,3	19,8	12,2	6,3	6,5	65,9	24,4	9,7		
	com telefone	39,6	60,4	20,2	23,5	21,0	17,0	10,9	7,4	27,0	42,0	31,0		
Rio de Janeiro (n=2012)	total	45,5	54,5	17,3	21,6	21,1	16,5	10,9	12,6	50,1	29,7	20,2		
	com telefone	39,4	60,6	13,0	17,5	17,9	20,6	14,9	16,2	31,0	39,8	29,2		
Salvador (n=2012)	total	45,5	54,5	24,1	26,5	21,6	13,7	7,3	6,8	52,3	35,6	12,1		
	com telefone	39,7	60,3	18,1	21,2	20,2	17,9	12,5	10,1	28,1	47,5	24,4		
São Luís (n=2013)	total	45,3	54,7	26,8	28,0	20,2	12,0	6,8	6,2	50,0	40,8	9,3		
	com telefone	41,1	58,9	21,9	23,1	19,6	16,0	10,3	9,2	25,0	51,3	23,6		
São Paulo (n=2013)	total	46,5	53,5	19,8	25,1	21,4	15,3	9,2	9,2	54,5	27,4	18,1		
	com telefone	40,0	60,0	15,3	20,0	20,0	19,8	12,7	12,2	37,1	36,8	26,1		
Teresina (n=2014)	total	45,1	54,9	25,4	26,4	21,0	13,4	7,1	6,8	60,5	29,7	9,7		
	com telefone	40,0	60,0	23,5	20,9	17,3	16,0	13,1	9,2	29,5	41,3	29,2		
Vitória (n=2013)	total	45,7	54,3	21,0	22,8	22,5	15,9	8,9	8,9	42,3	33,5	24,3		
	com telefone	41,5	58,5	15,3	18,7	16,9	21,3	15,2	12,6	24,6	38,5	36,9		
Brasília (n=2013)	total	46,7	53,3	24,8	28,6	21,1	13,4	7,1	5,0	50,1	31,3	18,5		
	com telefone	41,6	58,4	17,4	23,2	23,5	18,2	9,2	8,6	28,2	38,5	33,3		
Total (n=54353)	total	46,1	53,9	21,3	25,2	21,3	14,7	8,8	8,7	53,1	29,9	16,9		
	com telefone	41,0	59,0	18,6	20,6	19,4	18,7	12,4	10,3	28,1	41,4	30,5		

Fontes: Amostra de 10% dos domicílios do Censo Demográfico para população adulta em 2000 (IBGE-CD-ROM) e amostra estudada pelo VIGITEL para população adulta com telefone em 2008.



ANEXO C

Resultados por Cidade

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,0	5,2-20,8	25,9	11,3-40,5	1,5	0,2-3,3
25 a 34	8,6	3,5-13,7	9,1	0,7-17,5	8,2	2,0-14,5
35 a 44	14,3	9,0-19,6	15,5	8,0-23,0	13,3	5,7-20,8
45 a 54	13,8	8,8-18,8	17,4	8,5-26,2	10,8	5,5-16,2
55 a 64	16,7	10,2-23,3	23,7	12,7-34,7	11,4	3,7-19,1
65 e mais	6,5	2,9-10,1	6,2	0,0-12,4	6,6	2,3-11,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,9	10,1-19,6	19,9	11,3-28,6	10,5	5,9-15,1
9 a 11	9,2	7,0-11,5	13,5	9,4-17,7	6,0	3,5-8,4
12 e mais	7,2	4,8-9,6	10,6	5,8-15,3	4,5	2,4-6,6
Total	12,0	9,3-14,7	16,7	11,6-21,7	8,2	5,6-10,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,4	1,0-3,8	3,2	0,9-5,6	1,6	0,1-3,2
25 a 34	11,5	3,5-19,5	15,9	0,4-31,3	7,8	1,8-13,9
35 a 44	17,3	11,9-22,8	21,3	12,0-30,7	14,0	7,9-20,1
45 a 54	29,1	23,0-35,2	31,5	21,6-41,4	27,1	19,6-34,6
55 a 64	33,6	26,3-40,8	41,0	29,0-53,0	27,9	19,0-36,7
65 e mais	31,7	24,4-39,0	56,8	43,5-70,1	17,4	11,2-23,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,3	14,4-24,2	23,2	14,4-32,1	15,9	11,1-20,6
9 a 11	11,6	9,3-13,9	14,8	10,6-19,0	9,1	6,6-11,6
12 e mais	13,9	11,1-16,7	20,3	15,1-25,5	8,8	5,9-11,8
Total	16,1	13,4-18,9	20,3	15,2-25,5	12,7	10,1-15,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,4	0,0-7,4	7,3	0,0-15,5	0,0	0,0-0,0
25 a 34	4,1	0,0-8,2	6,2	0,0-14,3	2,3	0,0-5,5
35 a 44	4,5	1,3-7,7	9,7	2,9-16,5	0,2	0,0-0,5
45 a 54	6,0	2,3-9,7	11,0	3,3-18,7	1,9	0,4-3,3
55 a 64	6,0	2,0-9,9	11,8	3,4-20,2	1,5	0,0-3,6
65 e mais	2,5	0,0-5,0	4,2	0,0-9,8	1,5	0,0-3,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,4	2,5-8,4	10,5	4,4-16,5	1,1	0,0-2,7
9 a 11	2,8	1,5-4,0	5,2	2,5-7,9	0,9	0,0-1,7
12 e mais	3,3	1,3-5,3	5,3	1,2-9,4	1,7	0,4-3,0
Total	4,3	2,6-6,0	8,2	4,6-11,7	1,1	0,2-2,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	49,8	39,5-60,1	58,7	45,4-72,0	42,0	27,3-56,7
25 a 34	40,9	31,2-50,6	37,2	20,7-53,8	44,0	32,8-55,1
35 a 44	33,6	27,3-39,9	31,6	21,8-41,4	35,3	27,1-43,5
45 a 54	38,3	31,5-45,1	42,7	31,7-53,6	34,7	26,3-43,1
55 a 64	33,2	25,8-40,6	35,5	23,3-47,6	31,4	22,3-40,5
65 e mais	18,4	12,4-24,3	13,6	4,1-23,2	21,1	13,5-28,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,5	34,5-48,5	44,1	33,1-55,2	39,3	30,5-48,2
9 a 11	40,3	36,2-44,4	41,7	35,4-48,0	39,2	33,8-44,6
12 e mais	26,6	22,8-30,3	25,2	19,5-31,0	27,6	22,7-32,5
Total	38,9	34,8-43,0	40,6	34,0-47,2	37,5	32,4-42,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,4	14,7-32,2	23,4	13,4-33,3	23,5	8,8-38,1
25 a 34	32,8	24,5-41,2	34,9	20,8-49,0	30,9	21,4-40,4
35 a 44	51,3	44,4-58,2	57,6	47,0-68,1	45,4	36,6-54,2
45 a 54	58,4	51,6-65,3	60,1	49,5-70,8	56,8	48,0-65,7
55 a 64	56,8	48,7-65,0	51,0	38,2-63,8	61,8	51,7-71,8
65 e mais	58,7	50,1-67,4	53,2	39,2-67,2	62,8	51,8-73,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	42,4	35,4-49,4	34,5	24,9-44,1	51,2	41,6-60,8
9 a 11	41,1	37,0-45,2	50,8	44,3-57,2	33,4	28,3-38,4
12 e mais	42,1	37,8-46,5	57,7	50,9-64,5	29,2	24,1-34,2
Total	41,9	38,1-45,8	42,9	36,8-49,0	41,0	36,2-45,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,0	1,3-14,7	6,0	0,6-11,5	10,2	0,0-22,4
25 a 34	8,2	4,7-11,7	6,9	2,8-10,9	9,4	4,0-14,8
35 a 44	13,5	8,9-18,1	9,5	4,5-14,5	17,3	10,0-24,7
45 a 54	25,2	19,0-31,5	24,4	14,7-34,2	26,0	18,0-34,1
55 a 64	20,0	13,2-26,8	16,8	7,3-26,2	22,7	13,1-32,3
65 e mais	22,0	14,8-29,2	15,5	4,4-26,6	26,8	17,4-36,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,3	10,9-19,6	8,6	4,4-12,8	22,6	15,2-30,1
9 a 11	12,8	10,1-15,5	14,9	10,4-19,4	11,1	7,8-14,4
12 e mais	10,0	7,4-12,6	12,1	7,9-16,3	8,2	5,0-11,5
Total	13,6	11,2-16,0	11,0	8,2-13,9	16,0	12,3-19,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,3	11,5-27,2	12,2	5,8-18,7	25,6	12,5-38,7
25 a 34	29,2	21,2-37,2	15,4	6,2-24,5	41,0	30,1-51,9
35 a 44	36,7	30,6-42,8	28,6	19,9-37,4	43,4	35,2-51,6
45 a 54	38,7	32,3-45,1	37,4	27,4-47,4	39,8	31,5-48,1
55 a 64	42,7	35,1-50,3	28,5	18,4-38,7	53,5	43,6-63,5
65 e mais	45,9	38,2-53,7	34,8	22,2-47,3	52,3	43,0-61,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	27,6	21,9-33,2	13,9	8,0-19,8	39,3	31,0-47,7
9 a 11	32,0	28,2-35,8	28,4	22,9-34,0	34,7	29,5-39,9
12 e mais	47,9	43,7-52,2	43,7	36,9-50,6	51,3	45,9-56,7
Total	32,0	28,5-35,4	22,5	18,3-26,7	39,7	34,9-44,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,6	6,2-21,0	7,6	2,3-12,9	18,9	6,2-31,5
25 a 34	19,6	12,3-26,9	8,7	0,5-16,9	28,9	18,4-39,4
35 a 44	20,4	15,3-25,4	17,3	9,7-24,9	22,9	16,2-29,5
45 a 54	21,8	16,3-27,2	20,2	11,9-28,5	23,1	15,9-30,3
55 a 64	22,9	16,5-29,3	14,9	6,9-22,8	29,1	20,0-38,2
65 e mais	19,5	13,8-25,2	14,8	5,9-23,8	22,2	14,9-29,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,1	12,0-22,2	9,8	4,3-15,2	23,4	15,6-31,2
9 a 11	17,7	14,6-20,9	12,7	8,8-16,5	21,7	17,1-26,2
12 e mais	27,5	23,7-31,3	23,5	17,7-29,3	30,6	25,6-35,7
Total	18,9	15,9-21,9	12,6	9,2-16,1	24,0	19,5-28,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,5	23,6-43,4	44,7	30,3-59,2	23,5	10,4-36,6
25 a 34	35,8	25,7-45,8	51,3	34,7-67,8	22,6	12,3-32,8
35 a 44	32,5	25,9-39,1	47,4	36,8-57,9	20,1	12,9-27,3
45 a 54	24,8	18,6-31,0	38,8	27,8-49,7	13,3	8,3-18,2
55 a 64	24,2	17,4-31,0	37,6	25,5-49,7	13,9	7,1-20,6
65 e mais	15,0	9,2-20,8	28,9	16,7-41,1	7,1	1,6-12,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	35,3	28,4-42,2	53,8	43,0-64,6	19,4	11,5-27,2
9 a 11	26,9	23,2-30,7	35,6	29,5-41,7	20,2	15,7-24,8
12 e mais	21,0	17,6-24,4	28,4	22,4-34,4	15,1	11,3-18,9
Total	30,6	26,6-34,6	44,7	38,2-51,3	19,0	14,5-23,5

*Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	56,4	46,1-66,7	56,2	41,5-70,9	56,6	42,1-71,1
25 a 34	48,3	38,6-57,9	48,2	31,6-64,7	48,3	37,4-59,2
35 a 44	49,6	43,0-56,2	47,0	36,6-57,4	51,7	43,4-60,1
45 a 54	46,2	39,4-53,1	53,9	43,2-64,6	39,9	31,5-48,3
55 a 64	36,9	29,4-44,4	33,0	21,4-44,6	39,9	30,1-49,7
65 e mais	32,3	24,9-39,7	40,5	26,6-54,3	27,6	19,4-35,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,6	39,8-53,4	44,6	33,8-55,3	48,3	39,7-57,0
9 a 11	52,2	48,0-56,3	56,8	50,5-63,1	48,6	43,1-54,1
12 e mais	45,8	41,5-50,1	51,6	44,8-58,4	41,2	35,9-46,6
Total	48,2	44,2-52,2	49,2	42,7-55,6	47,3	42,3-52,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,6	10,0-23,1	15,5	6,5-24,5	17,5	8,1-26,9
25 a 34	18,2	10,6-25,9	27,1	12,2-41,9	10,7	5,5-16,0
35 a 44	13,4	8,8-17,9	18,1	9,9-26,3	9,4	4,9-13,9
45 a 54	6,2	3,1-9,3	6,7	2,0-11,3	5,9	1,8-10,0
55 a 64	7,4	3,3-11,6	13,6	4,9-22,4	2,7	0,6-4,7
65 e mais	7,1	2,8-11,5	13,2	3,2-23,3	3,6	0,3-7,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,5	7,7-17,2	18,6	9,9-27,3	7,2	2,7-11,7
9 a 11	17,1	13,8-20,4	19,7	14,5-25,0	15,1	11,0-19,2
12 e mais	10,2	7,7-12,7	10,0	6,3-13,7	10,3	6,9-13,7
Total	13,5	10,7-16,3	17,7	12,5-22,8	10,1	7,3-12,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,8	12,5-27,2	24,7	13,0-36,4	15,5	6,4-24,6
25 a 34	10,3	5,7-14,9	14,3	5,3-23,3	6,9	3,1-10,6
35 a 44	15,3	10,7-19,8	14,5	7,6-21,4	15,9	9,9-21,9
45 a 54	11,4	7,9-14,9	8,7	4,3-13,2	13,6	8,5-18,8
55 a 64	17,2	11,9-22,4	19,3	10,5-28,1	15,5	9,1-21,9
65 e mais	11,7	7,5-16,0	21,0	11,0-31,0	6,4	3,2-9,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,0	6,0-13,9	12,2	5,4-18,9	8,0	3,6-12,4
9 a 11	20,5	17,1-23,8	23,5	18,1-28,8	18,1	13,9-22,4
12 e mais	18,4	15,2-21,6	22,2	16,8-27,5	15,4	11,6-19,2
Total	14,4	11,9-16,9	16,9	12,7-21,2	12,3	9,5-15,1

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	51,6	41,4-61,8	60,4	47,1-73,7	43,7	28,7-58,7
25 a 34	50,4	40,8-60,1	61,3	46,4-76,1	41,2	29,9-52,5
35 a 44	47,2	40,6-53,8	57,4	47,1-67,6	38,7	30,6-46,8
45 a 54	43,2	36,3-50,0	56,3	45,8-66,9	32,2	24,2-40,2
55 a 64	38,9	30,9-46,8	52,7	40,4-64,9	28,2	18,4-38,0
65 e mais	7,5	4,0-11,1	13,3	5,5-21,1	4,2	0,9-7,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	51,3	44,5-58,1	68,4	59,1-77,8	36,5	27,3-45,7
9 a 11	40,7	36,6-44,7	46,8	40,4-53,1	36,0	30,8-41,2
12 e mais	30,7	26,7-34,6	27,3	21,5-33,2	33,3	28,1-38,5
Total	45,0	40,8-49,1	56,0	49,9-62,2	35,8	30,6-41,1

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,9	6,3-23,5	19,6	6,3-32,8	10,7	0,0-21,8
25 a 34	26,5	15,9-37,1	35,3	17,6-53,0	18,9	7,2-30,7
35 a 44	13,8	8,8-18,8	16,3	8,4-24,2	11,7	5,3-18,1
45 a 54	13,6	8,1-19,0	20,5	10,4-30,6	7,8	3,0-12,6
55 a 64	5,9	2,1-9,7	8,7	1,5-15,8	3,8	0,0-7,7
65 e mais	2,2	0,1-4,3	3,9	0,0-8,7	1,2	0,0-3,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,6	15,8-29,3	31,1	20,1-42,1	15,2	7,4-23,0
9 a 11	10,0	7,4-12,5	12,7	8,3-17,0	7,9	5,0-10,8
12 e mais	3,7	2,3-5,1	2,6	0,8-4,3	4,7	2,6-6,7
Total	15,9	12,0-19,8	21,5	14,9-28,2	11,3	6,9-15,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,3	13,8-32,9	5,6	0,0-12,7	39,1	24,3-53,9
25 a 34	32,0	23,8-40,2	6,8	2,8-10,8	53,4	42,5-64,3
35 a 44	39,0	32,7-45,4	16,7	9,2-24,2	57,7	49,4-66,0
45 a 54	36,1	29,8-42,5	12,4	6,7-18,0	55,9	47,4-64,5
55 a 64	36,4	28,9-43,8	12,1	3,7-20,4	55,0	45,2-64,9
65 e mais	19,4	14,2-24,7	4,7	0,5-9,0	27,9	20,3-35,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	35,1	28,9-41,4	8,0	3,5-12,5	58,5	49,9-67,2
9 a 11	32,6	28,8-36,4	14,6	10,2-19,0	46,4	41,0-51,8
12 e mais	15,1	12,2-18,0	5,8	3,1-8,6	22,5	18,0-26,9
Total	31,4	27,8-34,9	9,6	6,7-12,5	49,2	44,2-54,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,1	13,0-29,2	31,3	17,6-45,0	12,0	4,1-19,9
25 a 34	23,1	14,3-31,9	38,7	22,2-55,2	9,9	5,0-14,7
35 a 44	22,2	16,1-28,2	40,4	29,8-51,1	6,9	2,8-11,0
45 a 54	17,8	12,4-23,2	29,8	19,7-39,9	7,8	3,4-12,3
55 a 64	13,7	8,5-19,0	23,8	13,6-34,0	6,0	1,5-10,4
65 e mais	3,1	0,5-5,7	4,6	0,0-9,5	2,3	0,0-5,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,3	13,4-25,2	34,8	24,1-45,5	6,0	2,0-10,0
9 a 11	19,6	16,2-23,0	30,6	24,8-36,5	11,1	7,5-14,7
12 e mais	19,9	16,4-23,5	29,9	23,5-36,3	12,0	8,4-15,5
Total	19,5	16,1-22,9	32,8	26,5-39,2	8,5	6,0-11,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,1	0,1-2,2	2,4	0,1-4,7	0,0	0,0-0,0
25 a 34	5,5	0,2-10,7	11,6	0,6-22,6	0,2	0,0-0,7
35 a 44	3,6	0,8-6,5	7,6	1,6-13,6	0,4	0,0-1,1
45 a 54	1,3	0,2-2,4	2,3	0,1-4,5	0,4	0,0-1,3
55 a 64	2,8	0,3-5,3	6,4	0,8-12,1	0,1	0,0-0,2
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,0	0,3-5,7	6,5	0,7-12,3	0,0	0,0-0,0
9 a 11	2,0	0,8-3,3	4,4	1,6-7,3	0,2	0,0-0,6
12 e mais	4,0	2,3-5,7	7,8	4,3-11,4	0,9	0,0-2,1
Total	2,9	1,3-4,4	6,1	2,7-9,5	0,2	0,0-0,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,2	0,2-8,2	7,2	0,0-15,3	1,6	0,0-3,2
25 a 34	3,5	0,0-8,4	5,6	0,0-16,1	1,6	0,0-3,3
35 a 44	2,9	0,1-5,7	1,8	0,0-5,4	3,8	0,0-7,9
45 a 54	4,4	1,4-7,4	3,1	0,0-7,2	5,4	1,1-9,8
55 a 64	3,2	0,6-5,8	1,1	0,0-3,2	4,8	0,6-9,1
65 e mais	8,9	4,4-13,5	8,0	0,0-16,0	9,5	4,1-14,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,0	2,7-9,2	7,7	1,3-14,1	4,5	2,2-6,8
9 a 11	1,9	0,8-3,0	0,8	0,0-1,8	2,8	1,0-4,6
12 e mais	1,3	0,4-2,1	0,9	0,0-2,0	1,6	0,4-2,8
Total	4,0	2,2-5,9	4,7	1,0-8,3	3,5	2,2-4,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	92,8	88,5-97,1	81,4	75,0-87,8
60 a 69	95,5	91,4-99,6	77,6	68,2-87,0
Anos de escolaridade				
0 a 8	93,5	89,3-97,7	78,0	70,6-85,3
9 a 11	94,5	89,5-99,4	85,1	76,9-93,3
12 e mais	94,6	89,7-99,5	83,1	74,2-92,1
Total	93,8	90,7-96,9	79,9	74,6-85,3

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	72,5	63,2-81,7	68,9	59,2-78,6
35 a 44	88,7	83,0-94,4	80,7	73,5-88,0
45 a 54	92,9	88,6-97,2	86,9	81,2-92,5
55 a 59	90,7	81,6-99,7	79,4	68,3-90,5
Anos de escolaridade				
0 a 8	82,9	75,2-90,5	75,3	66,9-83,7
9 a 11	83,3	78,0-88,7	79,2	73,3-85,0
12 e mais	83,8	78,8-88,8	79,2	73,6-84,7
Total	83,2	78,9-87,5	77,2	72,5-81,9

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	35,1	25,8-44,4	23,3	12,9-33,7	45,5	31,2-59,7
25 a 34	45,0	35,6-54,4	29,1	15,5-42,8	58,5	47,6-69,5
35 a 44	42,6	36,3-49,0	25,9	17,5-34,2	56,6	48,1-65,1
45 a 54	39,8	33,4-46,3	27,3	18,1-36,5	50,3	41,7-58,9
55 a 64	27,6	21,4-33,8	9,9	4,6-15,2	41,2	31,8-50,6
65 e mais	22,3	15,9-28,8	5,7	1,8-9,5	31,9	22,8-40,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	28,7	22,6-34,8	13,6	5,9-21,3	41,7	33,2-50,3
9 a 11	47,3	43,1-51,4	34,0	27,8-40,1	57,5	52,1-62,9
12 e mais	55,9	51,6-60,1	43,3	36,4-50,2	65,8	60,8-70,9
Total	38,4	34,7-42,2	23,9	18,9-28,9	50,3	45,3-55,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,7	0,4-10,9	1,1	0,0-2,4	9,7	0,1-19,3
25 a 34	7,0	4,0-10,0	5,5	2,2-8,8	8,3	3,7-13,0
35 a 44	18,9	14,0-23,8	14,8	7,6-22,1	22,3	15,6-29,0
45 a 54	39,2	32,4-45,9	31,2	20,7-41,7	45,7	37,1-54,4
55 a 64	59,3	51,8-66,8	58,0	45,9-70,2	60,2	50,8-69,6
65 e mais	65,0	57,7-72,3	55,7	42,2-69,3	70,3	62,0-78,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,7	21,0-30,4	17,7	12,1-23,3	32,6	25,6-39,6
9 a 11	17,0	14,2-19,8	14,2	10,2-18,3	19,1	15,2-23,0
12 e mais	17,8	14,6-20,9	18,3	13,5-23,2	17,4	13,2-21,5
Total	21,9	19,2-24,5	16,8	13,4-20,2	26,1	22,3-29,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,1	0,0	0,0-0,0	0,1	0,0-0,3
25 a 34	0,5	0,0-1,2	0,5	0,0-1,6	0,5	0,0-1,3
35 a 44	2,3	0,6-4,0	2,3	0,0-5,1	2,3	0,2-4,3
45 a 54	11,0	6,2-15,8	7,4	2,1-12,7	14,0	6,6-21,4
55 a 64	21,7	14,9-28,4	17,5	8,3-26,7	24,9	15,5-34,3
65 e mais	25,3	18,5-32,2	30,6	17,5-43,7	22,3	14,7-30,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,1	5,9-10,2	6,2	3,4-9,0	9,7	6,5-12,9
9 a 11	2,1	1,1-3,0	2,1	0,5-3,7	2,0	1,0-3,1
12 e mais	4,2	2,9-5,6	4,6	2,5-6,7	3,9	2,2-5,7
Total	5,7	4,5-6,9	4,8	3,1-6,4	6,4	4,7-8,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,3	0,0-0,9	0,0	0,0-0,0	0,6	0,0-1,7
25 a 34	0,3	0,0-0,7	0,0	0,0-0,0	0,5	0,0-1,4
35 a 44	4,4	0,9-7,9	2,3	0,0-5,9	6,1	0,5-11,7
45 a 54	4,8	1,8-7,8	3,1	0,0-6,7	6,2	1,6-10,8
55 a 64	5,9	2,4-9,5	5,7	1,2-10,2	6,1	0,9-11,4
65 e mais	10,8	5,7-15,9	17,2	6,2-28,3	7,1	2,4-11,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,2	2,4-6,0	3,0	0,8-5,1	5,2	2,5-8,0
9 a 11	1,3	0,6-2,1	1,1	0,3-1,9	1,5	0,3-2,7
12 e mais	1,7	0,7-2,7	2,4	0,6-4,2	1,2	0,1-2,3
Total	3,0	2,0-4,0	2,4	1,1-3,6	3,5	1,9-5,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	15,1	6,2-24,0	4,6	1,6-7,6	24,4	9,4-39,5
25 a 34	13,9	7,2-20,5	13,1	2,3-23,8	14,5	6,3-22,8
35 a 44	19,2	14,3-24,2	11,8	6,5-17,2	25,4	17,8-32,9
45 a 54	37,6	31,1-44,1	34,0	23,9-44,2	40,6	32,2-49,0
55 a 64	45,7	37,9-53,4	34,6	23,0-46,2	54,1	44,2-64,1
65 e mais	48,0	40,3-55,8	27,2	15,3-39,0	59,9	50,9-68,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,3	19,7-30,8	11,9	5,8-18,0	36,7	28,5-45,0
9 a 11	18,5	15,4-21,5	17,3	12,7-22,0	19,3	15,3-23,3
12 e mais	27,3	23,6-31,0	29,0	23,0-35,1	25,9	21,3-30,4
Total	23,5	20,3-26,7	16,0	12,1-19,9	29,7	25,0-34,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,0-0,7	0,0	0,0-0,0	0,4	0,0-1,3
25 a 34	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
35 a 44	1,8	0,1-3,4	0,0	0,0-0,0	3,2	0,2-6,2
45 a 54	6,5	2,5-10,5	2,6	0,0-7,1	9,7	3,5-15,8
55 a 64	11,1	6,0-16,1	0,0	0,0-0,0	19,6	11,2-28,0
65 e mais	24,6	18,4-30,8	7,4	1,9-12,8	34,4	25,8-43,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,7	3,9-7,4	1,1	0,0-2,4	9,6	6,5-12,7
9 a 11	1,8	1,0-2,5	0,5	0,0-1,0	2,8	1,5-4,0
12 e mais	2,3	1,2-3,3	0,2	0,0-0,7	3,9	2,0-5,7
Total	4,0	3,0-4,9	0,8	0,1-1,5	6,6	4,9-8,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,9	0,4-7,5	4,1	0,0-11,2	3,8	1,2-6,3
25 a 34	1,9	0,7-3,1	1,4	0,0-2,9	2,3	0,6-4,0
35 a 44	1,7	0,0-3,9	0,0	0,0-0,0	3,2	0,0-7,1
45 a 54	0,9	0,0-2,0	0,2	0,0-0,6	1,4	0,0-3,4
55 a 64	2,1	0,2-4,0	0,9	0,0-2,3	3,0	0,0-6,2
65 e mais	3,2	0,7-5,7	0,6	0,0-1,8	4,8	0,9-8,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,8	0,1-3,5	1,6	0,0-4,8	2,0	0,2-3,7
9 a 11	2,7	1,4-4,0	1,1	0,0-2,5	3,9	1,8-6,0
12 e mais	3,4	1,9-4,8	1,9	0,3-3,5	4,5	2,3-6,8
Total	2,3	1,3-3,4	1,5	0,0-3,4	3,0	1,8-4,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	32,6	24,4-40,8	26,5	16,9-36,2	37,9	25,2-50,7
25 a 34	28,1	20,9-35,2	23,2	14,3-32,2	32,2	22,2-42,2
35 a 44	35,7	30,1-41,3	29,5	21,4-37,7	40,8	33,2-48,4
45 a 54	45,2	38,6-51,8	43,6	33,3-53,8	46,5	38,0-55,0
55 a 64	47,0	39,3-54,7	42,4	30,8-54,1	50,4	40,5-60,4
65 e mais	53,0	45,2-60,8	58,5	44,6-72,3	49,8	40,5-59,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,5	14,9-24,1	11,5	6,9-16,1	26,3	19,1-33,5
9 a 11	45,8	41,7-49,9	47,3	41,0-53,7	44,6	39,2-50,0
12 e mais	78,9	75,2-82,6	77,4	71,1-83,7	80,0	75,7-84,4
Total	36,4	33,0-39,8	31,7	27,0-36,4	40,2	35,6-44,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	62,9	50,6-75,3
26 a 30	62,4	47,2-77,5
31 a 35	69,8	55,1-84,6
36 a 40	65,8	54,7-76,9
41 a 45	69,1	58,3-79,8
46 a 50	61,0	48,3-73,7
Anos de escolaridade		
0 a 8	70,6	59,6-81,6
9 a 11	59,7	53,5-65,9
12 e mais	59,0	53,0-65,0
Total	67,6	62,1-73,1

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,2	11,1-31,3	11,3	1,1-21,5	30,1	14,5-45,7
25 a 34	9,1	5,9-12,2	4,6	1,7-7,6	12,8	7,8-17,9
35 a 44	19,8	14,2-25,3	12,4	5,5-19,3	26,0	17,9-34,1
45 a 54	21,1	15,2-26,9	16,1	7,3-25,0	25,2	17,4-33,0
55 a 64	12,6	7,6-17,7	8,0	1,4-14,5	16,2	8,9-23,6
65 e mais	12,1	6,6-17,6	12,0	1,0-22,9	12,2	6,3-18,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,3	12,9-23,7	11,7	5,8-17,6	24,0	15,7-32,2
9 a 11	13,8	11,0-16,6	7,4	4,3-10,5	18,7	14,4-23,0
12 e mais	14,6	11,4-17,7	9,9	5,5-14,3	18,3	13,9-22,6
Total	16,4	13,3-19,5	10,2	6,7-13,7	21,5	16,8-26,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	35,9	11,9-59,9	40,8	5,2-86,8	34,3	6,5-62,0
25 a 34	66,3	51,5-81,2	72,1	47,8-96,5	64,6	46,7-82,4
35 a 44	82,2	70,5-93,9	64,2	34,9-93,5	89,3	79,9-98,8
45 a 54	76,5	61,6-91,4	69,9	39,2-0,6	80,0	64,6-95,3
55 a 64	92,9	84,1-100,0	100,0	100,0-100,0	90,2	78,3-100,0
65 e mais	96,5	91,5-100,0	100,0	100,0-100,0	94,5	86,7-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	58,3	40,7-76,0	56,5	29,6-83,5	59,1	36,6-81,5
9 a 11	73,8	63,9-83,7	81,3	65,9-96,8	71,5	59,7-83,4
12 e mais	84,8	76,2-93,4	75,8	54,5-97,1	88,7	80,9-96,4
Total	65,8	53,9-77,8	64,5	45,6-83,5	66,3	51,4-81,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,2	6,4-18,0	22,1	11,7-32,5	3,2	0,0-7,4
25 a 34	17,0	9,9-24,2	23,0	12,8-33,3	11,7	1,8-21,6
35 a 44	15,3	10,1-20,5	19,3	11,0-27,5	11,7	5,4-18,1
45 a 54	13,9	8,9-18,8	18,6	9,8-27,5	9,8	4,9-14,8
55 a 64	6,4	2,7-10,1	8,9	3,0-14,9	4,4	0,0-9,0
65 e mais	6,1	2,6-9,5	6,1	0,7-11,4	6,0	1,5-10,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,1	13,3-22,9	26,3	18,8-33,8	10,7	4,9-16,6
9 a 11	7,8	5,6-10,1	10,9	6,9-14,8	5,5	2,8-8,1
12 e mais	8,5	5,8-11,2	10,5	5,7-15,2	6,7	3,8-9,6
Total	13,5	10,7-16,2	19,4	14,9-23,9	8,4	5,1-11,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,5	7,5-21,4	15,3	7,2-23,4	13,7	2,6-24,9
25 a 34	17,7	11,8-23,7	23,1	14,2-31,9	12,9	4,9-20,9
35 a 44	18,5	13,4-23,7	25,5	17,2-33,8	12,3	6,3-18,3
45 a 54	40,4	33,6-47,2	47,9	37,1-58,7	34,0	25,6-42,3
55 a 64	45,1	37,5-52,7	58,7	47,1-70,3	34,1	24,8-43,5
65 e mais	39,0	31,1-46,9	56,8	43,2-70,4	28,2	19,7-36,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	28,8	23,8-33,8	34,6	27,5-41,8	23,5	16,5-30,6
9 a 11	16,9	14,2-19,7	21,4	16,7-26,2	13,4	10,3-16,5
12 e mais	20,2	16,4-24,0	28,0	21,3-34,8	13,1	9,4-16,9
Total	23,7	20,8-26,6	29,5	25,2-33,8	18,7	14,8-22,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,1	0,0-2,7	2,2	0,0-5,7	0,0	0,0-0,0
25 a 34	5,3	0,0-11,1	6,0	0,0-13,6	4,6	0,0-13,2
35 a 44	4,7	1,4-7,9	8,5	2,1-15,0	1,2	0,0-2,9
45 a 54	3,7	1,1-6,4	5,9	0,8-11,0	1,9	0,0-4,1
55 a 64	1,7	0,0-3,7	1,2	0,0-3,1	2,0	0,0-5,4
65 e mais	1,4	0,0-2,8	1,2	0,0-3,1	1,5	0,0-3,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,9	1,7-8,2	7,0	2,2-11,8	3,1	0,0-7,6
9 a 11	1,4	0,6-2,3	2,4	0,8-3,9	0,7	0,0-1,6
12 e mais	1,7	0,3-3,1	2,4	0,0-5,2	1,0	0,0-2,2
Total	3,4	1,5-5,2	4,9	2,2-7,7	2,0	0,0-4,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	46,1	37,5-54,6	45,9	34,6-57,3	46,2	33,5-58,8
25 a 34	43,4	35,8-51,0	46,1	35,5-56,8	41,0	30,2-51,8
35 a 44	33,1	26,5-39,6	32,7	23,3-42,1	33,3	24,1-42,6
45 a 54	32,2	25,6-38,7	36,0	25,5-46,6	28,9	20,7-37,0
55 a 64	31,2	24,0-38,4	43,4	31,6-55,2	21,4	13,1-29,7
65 e mais	18,8	12,5-25,2	7,5	0,3-14,8	25,7	16,9-34,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	39,1	33,3-45,0	42,2	34,1-50,2	36,4	27,9-45,0
9 a 11	38,6	34,7-42,4	38,3	32,5-44,0	38,8	33,6-44,0
12 e mais	28,9	24,6-33,2	30,3	23,3-37,3	27,6	22,4-32,8
Total	37,8	34,3-41,3	39,5	34,5-44,4	36,3	31,4-41,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	29,6	20,6-38,6	29,5	18,4-40,7	29,7	15,7-43,7
25 a 34	45,0	37,3-52,7	58,2	47,6-68,7	30,0	20,0-40,0
35 a 44	49,9	43,0-56,9	58,8	49,2-68,3	39,7	30,0-49,4
45 a 54	60,0	53,1-66,8	61,0	50,4-71,6	59,0	50,1-67,8
55 a 64	58,4	50,2-66,5	64,7	53,3-76,0	51,4	40,1-62,7
65 e mais	52,9	43,9-61,8	51,3	36,5-66,2	54,1	43,3-64,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	51,0	44,4-57,5	54,5	46,2-62,8	46,6	36,3-56,9
9 a 11	39,6	35,8-43,5	46,5	40,6-52,4	33,7	28,8-38,7
12 e mais	44,0	39,2-48,8	57,1	49,5-64,7	31,7	26,3-37,1
Total	45,9	42,3-49,5	52,1	47,1-57,2	39,3	34,2-44,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,3	1,9-12,6	6,6	0,0-13,7	7,9	0,0-15,9
25 a 34	8,5	4,6-12,4	12,7	6,1-19,2	3,8	0,1-7,4
35 a 44	13,0	8,6-17,4	12,7	6,9-18,5	13,3	6,6-20,0
45 a 54	19,0	13,3-24,6	17,7	10,1-25,3	20,2	12,0-28,4
55 a 64	21,6	14,6-28,6	19,5	9,3-29,8	23,8	14,4-33,3
65 e mais	22,8	14,7-30,9	16,4	2,6-30,2	27,9	18,1-37,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,4	11,3-19,5	14,2	8,9-19,6	16,9	10,4-23,4
9 a 11	9,2	7,1-11,3	9,8	6,5-13,1	8,8	6,1-11,4
12 e mais	10,3	7,5-13,2	13,8	8,7-18,8	7,1	4,3-9,9
Total	12,5	10,2-14,7	12,7	9,5-15,9	12,2	9,1-15,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,5	9,0-20,0	13,7	6,4-21,0	15,1	7,0-23,3
25 a 34	15,9	11,2-20,6	10,9	5,3-16,6	20,3	13,0-27,6
35 a 44	21,1	15,9-26,3	15,1	8,7-21,4	26,5	18,5-34,5
45 a 54	26,9	21,1-32,8	25,0	15,7-34,3	28,5	21,2-35,9
55 a 64	25,9	19,6-32,3	21,0	12,0-30,1	29,9	21,1-38,7
65 e mais	25,2	19,0-31,4	25,0	14,4-35,6	25,3	17,7-33,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,2	11,5-19,0	13,2	8,3-18,1	17,1	11,4-22,8
9 a 11	21,5	18,4-24,5	16,5	12,2-20,7	25,4	21,1-29,6
12 e mais	33,7	29,3-38,1	27,3	20,6-34,1	39,5	33,8-45,1
Total	19,5	17,1-21,9	15,9	12,7-19,1	22,6	19,1-26,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	9,1	5,3-13,0	10,0	3,3-16,6	8,3	4,2-12,4
25 a 34	7,7	5,0-10,5	5,7	1,6-9,8	9,5	5,7-13,3
35 a 44	9,4	6,4-12,3	5,9	2,2-9,6	12,5	7,9-17,1
45 a 54	18,4	13,3-23,6	16,8	8,5-25,1	19,8	13,3-26,3
55 a 64	17,2	11,9-22,5	14,1	6,3-21,9	19,7	12,4-27,0
65 e mais	15,2	10,3-20,1	18,2	8,8-27,5	13,4	7,9-18,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,1	4,8-9,4	8,1	4,2-12,1	6,2	3,8-8,6
9 a 11	15,1	12,4-17,8	11,7	7,9-15,5	17,7	13,9-21,5
12 e mais	17,8	14,4-21,1	11,1	6,8-15,4	23,8	18,9-28,7
Total	11,1	9,4-12,7	9,6	7,0-12,2	12,3	10,2-14,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	34,4	26,6-42,2	46,9	35,5-58,2	23,1	13,9-32,4
25 a 34	40,2	32,4-47,9	48,1	37,4-58,7	33,2	22,1-44,2
35 a 44	28,8	22,4-35,2	37,3	27,8-46,8	21,1	13,0-29,3
45 a 54	21,2	15,6-26,9	35,8	25,5-46,1	8,8	4,4-13,3
55 a 64	20,8	14,5-27,1	30,2	19,3-41,1	13,2	6,2-20,2
65 e mais	16,6	10,1-23,2	30,6	16,9-44,2	8,1	2,7-13,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	33,0	27,3-38,7	45,8	37,8-53,8	21,5	13,9-29,0
9 a 11	28,7	25,1-32,2	36,8	31,1-42,5	22,3	17,9-26,7
12 e mais	26,4	22,0-30,8	34,8	27,4-42,2	18,9	14,1-23,6
Total	30,8	27,4-34,1	41,6	36,6-46,5	21,5	17,2-25,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	68,5	60,8-76,2	64,3	53,0-75,6	72,3	62,2-82,4
25 a 34	61,5	54,0-69,1	56,8	46,2-67,5	65,8	55,1-76,4
35 a 44	68,2	61,8-74,6	67,6	58,6-76,6	68,7	59,7-77,7
45 a 54	60,4	53,7-67,1	58,0	47,3-68,7	62,5	54,0-70,9
55 a 64	64,3	57,2-71,3	60,6	49,3-71,9	67,2	58,2-76,2
65 e mais	52,0	44,2-59,9	52,5	38,5-66,6	51,7	42,4-61,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	62,3	56,7-67,9	57,2	49,3-65,2	66,8	59,1-74,6
9 a 11	66,3	62,6-70,0	65,8	60,2-71,4	66,7	61,8-71,5
12 e mais	64,9	60,5-69,3	66,2	59,2-73,3	63,7	58,2-69,2
Total	64,0	60,6-67,3	61,1	56,2-66,0	66,4	61,9-70,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	26,5	18,7-34,3	27,6	17,4-37,8	25,5	13,9-37,1
25 a 34	30,2	23,0-37,4	32,8	23,0-42,6	27,9	17,3-38,5
35 a 44	17,7	12,9-22,5	18,0	11,5-24,4	17,5	10,5-24,5
45 a 54	11,5	7,2-15,9	14,5	7,1-21,8	9,1	4,1-14,0
55 a 64	11,9	7,2-16,7	14,4	6,4-22,4	9,9	4,4-15,5
65 e mais	4,0	1,1-7,0	5,2	0,0-11,7	3,3	0,7-5,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,6	15,4-25,8	21,7	14,9-28,5	19,6	11,8-27,4
9 a 11	23,6	20,2-27,1	26,8	21,5-32,1	21,2	16,7-25,6
12 e mais	15,0	11,5-18,5	18,7	12,7-24,7	11,7	7,9-15,4
Total	21,0	17,9-24,1	23,0	18,8-27,3	19,3	14,8-23,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,6	25,1-42,2	37,1	26,2-47,9	30,5	17,3-43,7
25 a 34	18,6	12,9-24,3	28,9	18,9-39,0	9,4	5,0-13,8
35 a 44	14,0	9,6-18,3	14,0	7,5-20,5	13,9	8,1-19,7
45 a 54	14,3	10,1-18,5	14,5	7,3-21,7	14,1	9,2-19,1
55 a 64	12,5	8,0-17,0	19,5	10,9-28,1	6,8	2,7-10,8
65 e mais	11,0	6,5-15,5	17,9	8,0-27,9	6,8	3,1-10,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,6	13,5-23,7	23,0	15,8-30,3	14,6	7,3-21,8
9 a 11	20,4	17,3-23,6	26,7	21,4-32,1	15,5	12,0-19,1
12 e mais	23,3	19,4-27,3	26,6	20,1-33,1	20,4	15,7-25,1
Total	19,8	16,8-22,8	24,7	20,2-29,1	15,6	11,5-19,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	36,5	28,4-44,6	38,7	27,8-49,6	34,5	22,6-46,3
25 a 34	46,3	38,9-53,8	56,0	45,6-66,4	37,7	27,7-47,8
35 a 44	46,1	39,2-53,1	58,1	48,6-67,5	35,4	26,4-44,5
45 a 54	47,3	40,4-54,1	62,3	52,3-72,2	34,5	26,2-42,8
55 a 64	34,4	27,1-41,7	51,8	39,9-63,6	20,4	12,8-27,9
65 e mais	11,3	6,0-16,6	21,2	9,5-32,9	5,2	1,3-9,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,0	35,3-46,7	54,3	46,3-62,3	29,0	21,3-36,8
9 a 11	41,8	38,0-45,7	48,3	42,4-54,2	36,7	31,8-41,6
12 e mais	34,4	29,8-38,9	38,6	31,1-46,1	30,5	25,2-35,9
Total	40,5	37,1-43,9	50,5	45,6-55,4	32,0	27,5-36,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,3	10,4-24,1	16,1	8,0-24,2	18,3	7,6-29,1
25 a 34	17,1	11,1-23,1	16,6	8,6-24,7	17,5	8,8-26,3
35 a 44	16,1	11,2-21,0	25,1	16,7-33,5	8,0	3,3-12,8
45 a 54	17,7	12,1-23,2	25,0	15,1-34,9	11,4	5,9-16,9
55 a 64	8,6	4,1-13,1	12,6	3,9-21,3	5,3	1,5-9,2
65 e mais	3,7	0,1-7,3	6,8	0,0-15,6	1,7	0,0-3,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,8	12,3-21,4	20,5	14,3-26,7	13,5	6,8-20,2
9 a 11	16,5	13,5-19,5	20,3	15,3-25,3	13,6	10,0-17,2
12 e mais	5,1	3,2-7,1	3,7	0,9-6,4	6,4	3,6-9,2
Total	15,4	12,7-18,1	18,5	14,6-22,3	12,7	9,0-16,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,8	16,8-30,7	10,7	5,1-16,3	35,5	23,9-47,1
25 a 34	35,5	28,4-42,7	8,7	3,8-13,5	59,5	49,1-70,0
35 a 44	41,6	34,6-48,7	15,7	9,5-21,9	64,8	55,7-74,0
45 a 54	31,7	25,6-37,8	14,7	7,2-22,2	46,1	37,5-54,7
55 a 64	32,7	25,6-39,8	12,8	5,0-20,6	48,8	38,9-58,7
65 e mais	26,8	20,0-33,7	13,6	4,7-22,6	34,9	25,8-44,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	33,6	28,2-39,0	9,5	5,7-13,3	55,4	46,8-63,9
9 a 11	36,2	32,5-39,9	17,9	13,4-22,5	50,5	45,3-55,6
12 e mais	16,4	13,2-19,5	7,5	4,2-10,8	24,4	19,5-29,3
Total	32,5	29,3-35,7	12,0	9,4-14,7	50,1	45,3-55,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,5	10,4-22,5	26,1	16,7-35,4	7,8	0,0-15,7
25 a 34	37,3	29,5-45,1	54,8	44,5-65,0	21,7	10,4-32,9
35 a 44	25,8	19,7-31,9	38,7	29,0-48,4	14,3	8,1-20,5
45 a 54	23,2	17,1-29,3	41,6	30,8-52,5	7,5	3,5-11,4
55 a 64	14,3	9,1-19,4	25,7	15,9-35,6	5,0	0,8-9,3
65 e mais	2,6	0,6-4,7	1,4	0,0-3,5	3,4	0,3-6,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	26,6	21,2-32,1	39,4	31,4-47,3	15,1	7,9-22,4
9 a 11	19,0	15,9-22,2	32,8	27,1-38,6	8,2	5,6-10,8
12 e mais	24,1	19,8-28,4	38,8	31,3-46,3	10,8	7,3-14,4
Total	23,7	20,5-26,9	37,2	32,3-42,0	12,2	8,2-16,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,7	0,0-1,3	1,4	0,0-2,7	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,7	0,6-2,8	3,7	1,3-6,0	0,0	0,0-0,0
35 a 44	0,9	0,0-1,9	1,3	0,0-3,2	0,6	0,0-1,3
45 a 54	1,2	0,1-2,3	2,6	0,2-5,0	0,0	0,0-0,0
55 a 64	1,7	0,0-3,8	3,8	0,0-8,5	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,4	0,0-1,1	1,0	0,0-3,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,2	0,0-0,5	0,4	0,0-1,1	0,0	0,0-0,0
9 a 11	1,3	0,5-2,2	3,0	1,1-4,9	0,0	0,0-0,0
12 e mais	4,9	2,4-7,4	9,1	4,1-14,1	1,1	0,0-2,3
Total	1,1	0,7-1,6	2,3	1,3-3,3	0,1	0,0-0,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,5	0,0-5,1	1,1	0,0-2,7	3,8	0,0-8,5
25 a 34	5,7	0,9-10,4	6,9	0,0-15,3	4,6	0,0-9,3
35 a 44	1,2	0,4-2,0	0,6	0,0-1,4	1,8	0,4-3,2
45 a 54	7,2	3,5-10,8	4,5	0,0-9,4	9,5	4,3-14,6
55 a 64	5,8	2,0-9,7	2,3	0,0-5,9	8,7	2,5-14,9
65 e mais	10,0	5,4-14,6	1,1	0,0-3,4	15,4	8,4-22,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,1	3,3-8,9	4,2	0,0-8,7	7,8	4,1-11,4
9 a 11	3,1	1,9-4,3	1,6	0,2-3,1	4,3	2,4-6,1
12 e mais	1,3	0,0-2,8	2,0	0,0-4,9	0,7	0,0-1,5
Total	4,5	2,9-6,1	3,1	0,6-5,7	5,7	3,7-7,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	70,6	61,5-79,6	56,3	47,0-65,6
60 a 69	64,2	53,0-75,3	52,7	41,5-63,9
Anos de escolaridade				
0 a 8	60,8	51,5-70,2	45,5	36,2-54,7
9 a 11	81,7	73,6-89,9	72,3	63,1-81,5
12 e mais	93,9	87,3-100,0	88,6	80,5-96,7
Total	68,1	61,1-75,2	54,9	47,8-62,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	66,5	54,7-78,2	64,9	53,2-76,5
35 a 44	86,0	76,6-95,4	81,9	72,3-91,6
45 a 54	89,6	83,7-95,4	83,0	75,6-90,4
55 a 59	85,7	76,0-95,3	75,8	64,4-87,1
Anos de escolaridade				
0 a 8	69,6	58,3-80,9	65,5	54,3-76,6
9 a 11	86,5	81,3-91,6	82,7	77,2-88,1
12 e mais	89,9	85,7-94,2	86,4	81,7-91,1
Total	78,6	72,2-84,9	74,6	68,3-80,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	34,7	26,2-43,2	20,1	10,7-29,5	47,9	35,2-60,5
25 a 34	32,7	26,1-39,4	21,9	14,0-29,8	42,3	32,2-52,5
35 a 44	28,9	23,1-34,6	15,4	9,3-21,5	41,0	31,5-50,4
45 a 54	28,6	22,9-34,3	20,1	11,8-28,3	35,8	28,1-43,6
55 a 64	18,0	12,7-23,2	12,0	5,6-18,4	22,8	15,0-30,6
65 e mais	13,4	8,9-17,9	7,2	1,9-12,4	17,2	10,9-23,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,2	16,9-27,5	13,0	7,2-18,8	30,4	22,1-38,7
9 a 11	35,3	31,6-39,0	22,4	17,5-27,3	45,4	40,3-50,5
12 e mais	45,3	40,7-50,0	31,5	24,6-38,4	57,8	52,0-63,6
Total	29,3	26,2-32,5	18,3	14,6-21,9	38,9	34,1-43,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,7	0,8-4,7	3,9	0,3-7,5	1,7	0,0-3,4
25 a 34	10,0	5,5-14,4	12,7	5,1-20,3	7,5	2,8-12,1
35 a 44	15,6	10,6-20,6	14,0	8,0-20,1	17,0	9,3-24,8
45 a 54	30,0	23,8-36,2	24,8	15,9-33,7	34,5	26,1-42,8
55 a 64	42,0	34,4-49,6	42,9	31,0-54,8	41,2	31,4-51,0
65 e mais	49,2	41,3-57,1	42,4	28,3-56,5	53,4	44,0-62,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,2	16,4-24,0	18,1	12,7-23,6	22,1	16,8-27,5
9 a 11	13,1	10,8-15,4	11,9	8,5-15,4	14,0	10,9-17,1
12 e mais	15,8	12,4-19,3	20,1	13,9-26,2	12,0	8,6-15,4
Total	17,3	15,1-19,5	16,3	13,0-19,6	18,1	15,1-21,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,8	0,0-4,2	3,6	0,0-8,5	0,2	0,0-0,7
35 a 44	3,2	0,0-6,4	0,9	0,0-2,2	5,2	0,0-11,1
45 a 54	6,0	3,1-8,8	6,5	1,6-11,4	5,5	2,2-8,8
55 a 64	10,0	5,6-14,5	8,0	1,3-14,8	11,7	5,7-17,6
65 e mais	16,7	10,7-22,7	19,8	8,3-31,3	14,8	8,1-21,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,3	3,2-7,3	4,9	1,8-8,0	5,6	2,8-8,4
9 a 11	1,9	1,2-2,6	1,8	0,7-2,9	2,1	1,1-3,0
12 e mais	3,4	1,9-4,9	4,3	1,6-7,0	2,6	1,1-4,1
Total	3,9	2,8-5,1	3,8	2,0-5,6	4,0	2,5-5,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,1	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,1
25 a 34	0,6	0,0-1,5	1,2	0,0-3,0	0,1	0,0-0,3
35 a 44	3,7	1,0-6,4	2,8	0,0-6,1	4,5	0,4-8,6
45 a 54	5,1	2,2-8,0	3,0	0,2-5,7	6,9	2,1-11,6
55 a 64	7,1	3,2-11,1	3,3	0,2-6,5	10,2	3,6-16,7
65 e mais	7,3	2,7-11,9	11,3	0,7-21,8	4,9	1,5-8,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,5	2,0-4,9	2,4	0,4-4,3	4,4	2,2-6,7
9 a 11	1,5	0,7-2,2	1,0	0,0-1,9	1,8	0,7-3,0
12 e mais	2,5	1,0-4,0	4,8	1,7-8,0	0,4	0,0-0,9
Total	2,7	1,8-3,5	2,2	1,0-3,4	3,1	1,8-4,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	9,1	4,6-13,6	4,3	1,2-7,4	13,5	5,5-21,5
25 a 34	9,9	6,0-13,7	8,0	3,2-12,7	11,5	5,6-17,5
35 a 44	21,7	16,5-26,9	19,7	12,7-26,7	23,5	16,0-31,1
45 a 54	35,5	29,0-42,0	35,5	25,3-45,7	35,5	27,2-43,9
55 a 64	34,4	27,3-41,4	28,5	18,2-38,8	39,1	29,5-48,6
65 e mais	39,8	32,1-47,4	31,5	18,7-44,2	44,9	35,5-54,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,7	15,9-23,5	14,2	9,8-18,7	24,6	18,5-30,7
9 a 11	17,6	14,9-20,3	14,2	10,5-17,9	20,3	16,5-24,0
12 e mais	24,3	20,2-28,5	29,2	22,1-36,2	20,0	15,5-24,5
Total	19,5	17,2-21,8	16,0	13,0-18,9	22,5	19,0-26,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,9	0,0-5,0	0,0	0,0-0,0	3,5	0,0-9,4
25 a 34	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
35 a 44	1,4	0,2-2,6	2,0	0,0-4,3	0,8	0,0-1,7
45 a 54	10,3	6,1-14,5	1,9	0,0-4,9	17,4	10,5-24,4
55 a 64	8,4	4,7-12,0	4,6	0,1-9,0	11,4	5,8-17,0
65 e mais	25,8	18,7-33,0	15,0	2,6-27,4	32,4	23,6-41,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,1	4,0-8,2	2,7	0,8-4,6	9,2	5,5-12,8
9 a 11	3,2	2,2-4,2	1,1	0,2-2,0	4,8	3,2-6,4
12 e mais	1,9	0,9-3,0	0,3	0,0-1,0	3,4	1,5-5,2
Total	4,6	3,4-5,8	1,9	0,8-3,0	6,9	4,9-9,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,4	1,6-7,2	2,3	0,0-4,5	6,4	1,4-11,3
25 a 34	7,4	2,6-12,1	4,0	0,1-7,9	10,3	2,2-18,5
35 a 44	2,5	1,1-3,9	1,5	0,0-3,0	3,5	1,1-5,8
45 a 54	3,6	1,6-5,6	2,3	0,0-5,0	4,7	1,7-7,6
55 a 64	4,7	1,2-8,1	2,2	0,0-4,8	6,7	0,9-12,4
65 e mais	6,6	2,0-11,2	7,7	0,0-17,1	5,9	1,3-10,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,7	2,0-7,4	2,4	0,1-4,6	6,7	2,1-11,4
9 a 11	4,7	3,0-6,4	3,3	1,3-5,3	5,8	3,2-8,3
12 e mais	6,6	4,5-8,8	4,4	1,5-7,3	8,6	5,5-11,8
Total	4,9	3,3-6,5	2,9	1,5-4,4	6,6	3,9-9,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	38,5	30,7-46,2	44,3	33,1-55,4	33,3	23,1-43,4
25 a 34	31,1	25,3-36,9	29,9	21,3-38,4	32,2	24,2-40,1
35 a 44	38,8	32,6-45,1	37,0	28,5-45,5	40,5	31,4-49,6
45 a 54	44,8	38,3-51,4	44,3	33,9-54,7	45,3	36,9-53,7
55 a 64	50,0	42,4-57,7	49,1	37,3-61,0	50,8	40,8-60,7
65 e mais	56,3	48,4-64,3	52,0	37,9-66,0	59,0	49,5-68,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,3	20,8-29,8	28,9	21,9-35,8	22,1	16,5-27,6
9 a 11	47,9	44,0-51,7	43,1	37,3-48,9	51,6	46,4-56,8
12 e mais	82,0	78,0-86,0	80,3	73,6-86,9	83,6	79,0-88,1
Total	39,6	36,5-42,7	39,6	35,0-44,2	39,6	35,3-43,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	60,7	49,0-72,3
26 a 30	78,8	68,6-89,0
31 a 35	67,1	52,7-81,5
36 a 40	72,1	60,9-83,2
41 a 45	73,7	62,4-85,1
46 a 50	55,9	43,1-68,6
Anos de escolaridade		
0 a 8	70,4	59,3-81,5
9 a 11	64,6	59,1-70,2
12 e mais	68,0	61,9-74,2
Total	67,1	58,6-75,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	9,1	4,5-13,7	14,3	5,6-22,9	4,5	1,6-7,3
25 a 34	12,0	6,5-17,6	7,6	2,4-12,7	16,0	6,8-25,3
35 a 44	7,9	4,8-10,9	3,6	0,5-6,8	11,7	6,6-16,7
45 a 54	14,2	9,9-18,6	10,2	4,2-16,2	17,7	11,5-23,9
55 a 64	15,0	9,3-20,6	10,2	2,4-17,9	18,8	10,9-26,8
65 e mais	10,6	5,5-15,8	2,9	0,0-6,1	15,3	7,5-23,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,1	7,4-14,7	9,6	4,7-14,6	12,4	7,0-17,7
9 a 11	10,5	8,2-12,8	7,9	5,0-10,9	12,5	9,1-16,0
12 e mais	11,2	8,5-13,8	6,3	3,1-9,5	15,5	11,4-19,6
Total	10,9	8,7-13,0	8,7	5,8-11,6	12,8	9,7-15,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	70,3	44,5-96,2	67,4	33,9-100,0	78,8	56,8-100,0
25 a 34	69,1	38,4-99,9	79,9	54,6-100,0	64,3	23,9-100,0
35 a 44	77,8	63,7-91,8	70,4	32,3-100,0	79,8	65,6-94,0
45 a 54	74,6	61,1-88,1	71,0	44,7-97,2	76,4	60,9-91,9
55 a 64	90,1	78,9-100,0	96,4	89,0-100,0	87,3	72,0-100,0
65 e mais	90,2	78,2-100,0	100,0	100,0-100,0	89,0	75,5-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	73,0	53,0-93,0	76,4	51,2-100,0	70,4	41,8-99,1
9 a 11	76,4	67,0-85,8	68,6	49,8-87,5	80,2	70,3-90,1
12 e mais	83,5	73,5-93,5	79,7	60,7-98,7	84,9	73,1-96,7
Total	75,4	63,8-87,0	74,4	57,8-90,9	76,0	60,2-91,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,0	7,7-36,4	24,1	11,8-36,4	20,1	0,0-45,9
25 a 34	22,0	14,9-29,2	27,9	16,6-39,2	16,7	8,0-25,4
35 a 44	17,5	13,3-21,7	14,5	8,6-20,5	20,0	14,1-25,9
45 a 54	23,1	18,2-28,0	29,5	21,1-38,0	17,8	12,3-23,2
55 a 64	13,4	8,5-18,3	16,4	7,4-25,3	11,1	5,9-16,2
65 e mais	8,5	4,5-12,5	15,2	6,1-24,2	4,5	1,5-7,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,0	18,2-31,8	29,5	21,6-37,4	21,1	10,2-32,0
9 a 11	13,3	10,7-15,9	15,2	11,0-19,4	11,9	8,6-15,1
12 e mais	12,6	9,4-15,7	14,0	8,9-19,2	11,2	7,4-15,0
Total	19,2	15,4-23,0	22,4	17,9-27,0	16,5	10,5-22,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,8	3,0-8,6	6,0	2,2-9,9	5,5	1,4-9,6
25 a 34	14,8	9,5-20,1	21,3	12,1-30,5	8,9	3,5-14,3
35 a 44	20,5	16,2-24,8	25,2	18,3-32,2	16,3	11,2-21,5
45 a 54	31,0	25,8-36,2	34,0	25,4-42,6	28,5	22,3-34,7
55 a 64	35,6	28,6-42,6	47,8	35,7-59,8	25,9	17,9-33,9
65 e mais	34,3	27,5-41,1	55,4	42,7-68,0	21,5	14,4-28,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,0	18,0-26,0	27,7	21,3-34,0	17,1	12,4-21,8
9 a 11	18,8	15,8-21,7	22,9	17,9-27,9	15,5	12,0-18,9
12 e mais	17,6	14,1-21,1	23,6	17,7-29,5	12,2	8,2-16,2
Total	20,2	17,9-22,5	25,5	21,7-29,3	15,7	13,0-18,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,2	0,0-28,1	10,0	0,8-19,2	16,3	0,0-42,9
25 a 34	6,3	1,8-10,8	9,8	2,4-17,2	3,1	0,0-8,3
35 a 44	5,2	2,6-7,9	5,3	1,5-9,2	5,2	1,6-8,7
45 a 54	9,8	6,3-13,2	11,4	5,7-17,1	8,4	4,2-12,6
55 a 64	6,1	2,7-9,6	10,1	2,9-17,3	3,0	0,8-5,2
65 e mais	5,3	1,8-8,7	10,7	2,3-19,0	2,0	0,2-3,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,6	5,0-18,2	12,8	7,2-18,5	10,5	0,0-21,9
9 a 11	3,5	2,1-4,9	4,5	2,1-7,0	2,7	1,2-4,3
12 e mais	4,8	2,6-7,0	6,3	2,3-10,2	3,5	1,3-5,7
Total	7,9	4,4-11,5	9,2	6,1-12,3	6,9	0,8-12,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	49,3	36,7-61,9	50,3	37,8-62,8	48,4	26,9-69,9
25 a 34	50,5	43,1-58,0	58,9	48,2-69,6	42,9	33,1-52,7
35 a 44	38,6	33,0-44,1	43,0	34,4-51,6	34,7	27,7-41,7
45 a 54	38,4	32,8-44,1	42,8	33,6-52,0	34,8	27,9-41,7
55 a 64	32,2	25,3-39,2	42,5	30,4-54,6	24,1	16,7-31,5
65 e mais	19,6	13,9-25,3	17,7	8,3-27,2	20,8	13,7-27,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,7	38,2-51,3	54,0	45,9-62,0	36,8	26,5-47,0
9 a 11	42,9	38,9-46,9	43,7	37,5-49,9	42,3	37,0-47,6
12 e mais	29,6	25,2-34,0	31,3	24,5-38,1	28,0	22,3-33,7
Total	41,4	37,7-45,2	46,7	41,8-51,6	36,9	31,4-42,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,6	8,5-38,6	18,0	10,0-26,0	28,6	2,2-55,0
25 a 34	38,9	30,9-46,9	47,8	35,8-59,8	29,7	19,7-39,6
35 a 44	48,5	42,8-54,2	57,7	49,2-66,1	40,2	32,8-47,7
45 a 54	55,6	49,7-61,5	60,8	51,7-69,8	50,9	43,4-58,4
55 a 64	57,5	49,9-65,2	58,5	46,6-70,4	56,6	46,9-66,3
65 e mais	54,0	46,5-61,4	46,7	34,3-59,1	59,3	50,3-68,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	50,2	43,0-57,3	46,8	38,3-55,3	53,5	42,3-64,7
9 a 11	36,4	32,5-40,4	43,3	37,1-49,5	30,7	25,7-35,8
12 e mais	37,6	32,9-42,4	51,6	44,3-58,9	24,8	19,3-30,2
Total	43,3	39,5-47,2	46,7	41,8-51,6	40,2	34,2-46,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,7	0,6-6,9	5,6	0,0-11,4	2,0	0,0-4,5
25 a 34	14,9	8,1-21,7	14,7	4,7-24,6	15,1	5,8-24,4
35 a 44	11,0	7,5-14,4	11,6	6,5-16,6	10,4	5,7-15,2
45 a 54	15,6	11,5-19,6	12,0	6,4-17,5	18,8	13,0-24,7
55 a 64	18,2	11,6-24,7	17,9	7,2-28,7	18,4	10,7-26,0
65 e mais	14,7	9,6-19,8	7,8	2,4-13,2	19,9	12,2-27,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,0	11,6-20,3	12,6	6,5-18,7	19,3	12,7-25,8
9 a 11	7,7	5,7-9,7	8,9	5,5-12,2	6,8	4,4-9,1
12 e mais	9,5	6,5-12,4	12,7	7,7-17,6	6,5	3,3-9,8
Total	12,1	9,8-14,3	11,5	8,1-14,9	12,6	9,6-15,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	29,7	19,9-39,4	28,0	16,5-39,4	31,3	15,4-47,2
25 a 34	38,8	31,5-46,2	37,0	25,3-48,6	40,5	31,2-49,9
35 a 44	33,3	28,2-38,3	19,6	13,2-25,9	45,1	37,9-52,3
45 a 54	45,9	40,3-51,4	31,9	23,8-40,0	57,2	50,1-64,4
55 a 64	50,2	42,8-57,6	42,0	30,1-54,0	56,6	47,4-65,8
65 e mais	48,1	41,1-55,0	35,1	23,9-46,4	55,9	47,6-64,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	33,4	27,8-38,9	27,4	19,6-35,3	38,5	30,1-46,9
9 a 11	40,2	36,2-44,1	29,3	23,7-34,9	48,8	43,5-54,1
12 e mais	51,0	46,2-55,8	42,2	35,1-49,4	59,0	52,7-65,2
Total	38,6	35,3-42,0	30,8	26,2-35,3	45,3	40,3-50,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,3	10,5-24,2	17,9	7,6-28,2	16,8	7,8-25,7
25 a 34	23,8	17,4-30,2	22,7	12,7-32,6	24,9	16,7-33,1
35 a 44	17,7	13,6-21,7	11,3	6,2-16,5	23,2	17,2-29,2
45 a 54	25,4	20,6-30,1	20,2	13,2-27,2	29,6	23,3-36,0
55 a 64	25,2	18,8-31,6	17,7	7,9-27,6	31,1	22,7-39,4
65 e mais	25,4	19,7-31,0	20,6	11,8-29,4	28,2	21,1-35,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,2	13,1-21,4	15,7	9,1-22,3	18,6	13,1-24,0
9 a 11	23,3	19,9-26,8	18,3	13,3-23,2	27,4	22,6-32,1
12 e mais	31,2	26,8-35,5	24,9	18,7-31,2	36,8	30,8-42,8
Total	21,6	19,0-24,2	18,2	14,3-22,1	24,5	21,0-28,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	39,2	26,3-52,2	41,7	29,7-53,6	37,0	14,2-59,7
25 a 34	50,6	43,2-58,1	60,1	49,4-70,8	42,0	32,3-51,6
35 a 44	45,5	40,0-51,1	50,6	42,1-59,1	41,1	34,0-48,3
45 a 54	38,7	33,1-44,3	49,4	40,2-58,5	30,0	23,4-36,6
55 a 64	27,3	20,6-33,9	39,6	27,7-51,4	17,5	11,0-24,1
65 e mais	27,5	21,0-34,0	40,7	28,0-53,3	19,6	13,1-26,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	45,6	39,1-52,1	56,1	48,0-64,3	36,5	26,4-46,7
9 a 11	41,0	37,0-45,0	46,2	40,1-52,3	36,9	31,7-42,0
12 e mais	28,7	24,4-33,1	34,4	27,5-41,3	23,6	18,2-29,0
Total	41,1	37,4-44,8	49,1	44,3-54,0	34,3	28,7-39,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	55,6	42,2-69,0	68,9	56,2-81,6	43,2	23,9-62,4
25 a 34	56,9	49,6-64,3	60,5	49,1-71,8	53,7	44,2-63,3
35 a 44	53,8	48,3-59,4	55,1	46,6-63,5	52,7	45,5-60,0
45 a 54	50,7	45,0-56,4	54,9	45,8-64,0	47,2	40,2-54,3
55 a 64	54,1	46,7-61,4	54,2	42,1-66,2	54,0	45,0-63,0
65 e mais	52,2	45,2-59,1	54,8	42,3-67,3	50,6	42,4-58,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	55,0	48,3-61,6	57,9	49,8-66,1	52,4	42,5-62,4
9 a 11	57,3	53,4-61,3	67,6	62,0-73,2	49,2	43,9-54,5
12 e mais	47,7	42,9-52,5	50,6	43,3-57,9	45,0	38,8-51,3
Total	54,4	50,6-58,1	59,4	54,6-64,1	50,1	44,8-55,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	42,0	29,1-54,9	48,3	35,8-60,8	36,1	13,3-59,0
25 a 34	35,2	27,6-42,7	41,1	29,4-52,8	29,7	20,3-39,2
35 a 44	24,6	19,6-29,5	29,7	21,9-37,6	20,1	14,0-26,1
45 a 54	13,4	9,6-17,1	12,8	6,8-18,9	13,8	9,2-18,5
55 a 64	15,5	9,7-21,3	21,7	11,5-31,9	10,6	4,3-16,9
65 e mais	10,9	6,6-15,2	12,7	5,1-20,3	9,8	4,6-15,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,5	22,6-36,3	34,5	26,2-42,8	25,2	14,4-35,9
9 a 11	30,0	26,3-33,7	39,4	33,3-45,5	22,5	18,1-27,0
12 e mais	15,4	11,9-18,9	15,2	10,0-20,3	15,5	10,7-20,4
Total	27,1	23,2-30,9	32,3	27,4-37,1	22,6	16,8-28,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,8	10,9-24,7	29,3	18,3-40,3	6,9	1,9-12,0
25 a 34	17,8	11,9-23,8	24,4	13,8-34,9	11,9	6,5-17,2
35 a 44	16,8	12,7-20,9	15,9	9,7-22,1	17,6	12,1-23,1
45 a 54	13,7	10,0-17,4	14,7	8,5-20,9	12,9	8,4-17,3
55 a 64	11,1	7,0-15,1	8,7	2,9-14,6	12,9	7,3-18,5
65 e mais	14,8	10,0-19,6	17,8	8,9-26,7	13,0	7,4-18,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,1	10,2-18,0	18,3	11,3-25,2	10,5	6,8-14,2
9 a 11	18,1	14,9-21,2	22,8	17,4-28,2	14,3	10,7-18,0
12 e mais	18,4	14,7-22,1	22,2	16,1-28,3	15,0	10,7-19,3
Total	16,1	13,7-18,4	20,3	16,2-24,4	12,5	10,1-14,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	30,7	20,8-40,6	37,8	25,8-49,7	24,2	10,0-38,4
25 a 34	52,0	44,6-59,4	59,4	48,1-70,8	45,2	35,5-55,0
35 a 44	50,0	44,5-55,6	60,2	51,7-68,8	41,2	34,0-48,3
45 a 54	43,5	38,0-49,1	48,4	39,3-57,6	39,5	32,7-46,3
55 a 64	30,9	23,9-37,9	41,1	29,0-53,2	22,8	15,4-30,2
65 e mais	13,4	8,2-18,5	21,8	10,6-33,0	8,3	4,0-12,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,0	35,0-47,1	50,4	42,2-58,6	33,0	24,8-41,1
9 a 11	42,5	38,6-46,5	53,6	47,5-59,8	33,7	28,8-38,7
12 e mais	35,4	30,8-40,1	37,2	30,0-44,4	33,8	27,9-39,8
Total	40,5	37,0-43,9	48,9	44,0-53,7	33,4	28,8-37,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,8	5,4-16,2	13,8	4,7-22,9	8,0	2,9-13,1
25 a 34	13,0	7,7-18,3	16,1	6,8-25,5	10,2	4,9-15,4
35 a 44	14,0	10,2-17,9	13,3	7,5-19,1	14,6	9,4-19,8
45 a 54	9,9	6,7-13,0	12,1	6,5-17,7	8,0	4,6-11,5
55 a 64	11,8	6,8-16,8	12,4	3,7-21,0	11,3	5,6-17,0
65 e mais	2,4	0,0-5,1	4,1	0,0-10,6	1,4	0,0-3,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,2	8,7-15,8	16,0	9,7-22,3	9,0	5,5-12,4
9 a 11	10,2	7,9-12,6	11,1	7,3-15,0	9,5	6,5-12,5
12 e mais	10,1	7,1-13,1	8,6	4,5-12,8	11,5	7,2-15,8
Total	11,2	9,2-13,3	13,2	9,6-16,8	9,6	7,4-11,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	32,0	16,8-47,2	6,5	2,0-11,0	55,8	36,7-75,0
25 a 34	37,8	30,3-45,3	11,9	3,1-20,8	61,4	52,7-70,0
35 a 44	39,7	34,3-45,1	10,0	5,1-14,9	65,4	58,7-72,1
45 a 54	37,8	32,3-43,2	12,9	6,7-19,2	58,1	51,1-65,0
55 a 64	37,7	30,7-44,6	16,3	7,9-24,7	54,5	45,4-63,7
65 e mais	30,7	24,5-37,0	13,8	5,0-22,6	41,0	32,9-49,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,4	39,8-53,0	12,1	6,8-17,4	76,0	70,1-81,9
9 a 11	31,6	28,0-35,2	10,3	6,9-13,7	48,5	43,2-53,7
12 e mais	15,8	12,6-19,1	8,9	5,0-12,8	22,1	17,1-27,1
Total	36,3	32,4-40,3	11,0	8,0-14,0	57,9	53,1-62,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,9	11,9-25,8	28,7	18,0-39,5	9,6	3,5-15,8
25 a 34	23,7	17,3-30,0	33,5	22,6-44,5	14,6	8,4-20,9
35 a 44	26,7	21,7-31,7	33,1	25,1-41,1	21,2	15,0-27,4
45 a 54	21,6	16,8-26,4	38,3	29,4-47,1	8,0	4,3-11,7
55 a 64	16,8	10,8-22,7	24,7	13,7-35,7	10,5	4,9-16,1
65 e mais	6,4	2,3-10,5	12,1	2,5-21,7	3,0	0,4-5,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,5	14,1-22,9	28,6	21,1-36,1	9,8	5,8-13,7
9 a 11	23,9	20,4-27,4	34,0	28,1-40,0	15,9	11,9-19,9
12 e mais	22,4	18,5-26,3	31,6	25,0-38,1	14,1	9,6-18,5
Total	20,8	18,2-23,5	30,7	26,3-35,2	12,4	9,9-15,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,0	0,3-3,8	4,2	0,6-7,7	0,0	0,0-0,0
25 a 34	2,2	0,6-3,8	4,0	0,7-7,3	0,6	0,0-1,3
35 a 44	1,8	0,5-3,0	3,5	0,9-6,2	0,3	0,0-0,7
45 a 54	1,2	0,2-2,2	2,6	0,5-4,8	0,0	0,0-0,0
55 a 64	1,7	0,0-3,6	3,5	0,0-7,7	0,3	0,0-0,8
65 e mais	0,9	0,0-2,1	2,5	0,0-5,5	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,5	0,0-1,2	1,1	0,0-2,5	0,0	0,0-0,0
9 a 11	2,6	1,2-4,0	5,8	2,6-9,0	0,1	0,0-0,3
12 e mais	3,9	2,0-5,7	6,9	3,2-10,6	1,1	0,0-2,2
Total	1,8	1,1-2,4	3,6	2,2-5,0	0,2	0,0-0,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,9	0,5-3,3	1,2	0,0-2,5	2,5	0,1-5,0
25 a 34	2,9	0,7-5,2	0,9	0,0-2,1	4,8	0,8-8,9
35 a 44	1,8	0,6-3,1	1,9	0,0-3,8	1,8	0,1-3,5
45 a 54	3,9	1,9-5,9	2,0	0,0-4,1	5,4	2,2-8,7
55 a 64	8,7	4,0-13,5	5,9	0,0-11,9	11,0	4,1-17,9
65 e mais	6,2	2,0-10,5	6,4	0,0-15,5	6,2	2,1-10,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,0	2,4-5,7	2,4	0,5-4,2	5,4	2,8-8,1
9 a 11	3,1	1,9-4,4	2,0	0,5-3,5	4,1	2,1-6,0
12 e mais	2,4	1,0-3,8	1,9	0,1-3,7	2,8	0,7-4,9
Total	3,5	2,5-4,4	2,2	1,1-3,3	4,5	3,0-6,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	96,0	93,2-98,8	85,4	80,2-90,6
60 a 69	94,4	89,9-98,8	82,3	74,7-89,9
Anos de escolaridade				
0 a 8	95,7	92,7-98,8	83,0	77,2-88,9
9 a 11	92,6	86,3-99,0	81,5	72,6-90,4
12 e mais	97,9	95,4-100,0	94,1	90,0-98,2
Total	95,4	93,0-97,8	84,3	80,0-88,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	79,4	71,3-87,6	77,7	69,3-86,1
35 a 44	96,0	93,4-98,6	89,4	84,8-93,9
45 a 54	90,3	86,0-94,7	83,6	78,2-88,9
55 a 59	91,4	83,3-99,5	81,0	70,8-91,2
Anos de escolaridade				
0 a 8	87,3	81,4-93,1	79,3	72,9-85,8
9 a 11	85,3	80,4-90,3	82,8	77,8-87,9
12 e mais	95,4	92,2-98,5	93,0	89,3-96,7
Total	88,4	85,0-91,8	83,2	79,4-86,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,8	21,5-46,0	21,1	10,3-32,0	45,6	24,5-66,7
25 a 34	38,0	31,2-44,9	19,4	12,3-26,6	55,0	45,3-64,7
35 a 44	43,4	38,0-48,9	24,0	17,0-31,1	60,2	53,0-67,5
45 a 54	36,2	30,9-41,4	18,6	12,0-25,2	50,5	43,4-57,6
55 a 64	26,0	20,2-31,8	9,7	4,4-15,0	38,9	30,3-47,6
65 e mais	23,8	18,3-29,2	9,4	3,1-15,6	32,5	25,0-39,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	27,4	21,4-33,4	11,2	5,6-16,9	41,4	31,9-51,0
9 a 11	40,3	36,4-44,3	24,1	18,9-29,2	53,2	47,9-58,5
12 e mais	51,2	46,4-56,0	33,2	26,2-40,1	67,5	61,5-73,6
Total	35,7	32,2-39,1	19,1	15,5-22,7	49,7	44,4-55,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,6	1,5-5,8	3,4	0,4-6,4	3,9	0,7-7,0
25 a 34	11,2	6,6-15,9	8,6	3,4-13,8	13,6	6,3-21,0
35 a 44	20,5	15,7-25,3	18,4	11,3-25,6	22,2	15,7-28,7
45 a 54	40,8	35,1-46,5	39,7	30,5-48,9	41,7	34,7-48,8
55 a 64	54,9	47,6-62,3	46,8	34,6-59,0	61,4	52,6-70,2
65 e mais	60,8	53,9-67,7	45,1	32,7-57,6	70,2	63,1-77,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	33,0	28,1-38,0	22,9	17,2-28,6	41,8	33,3-50,3
9 a 11	15,6	12,9-18,3	15,0	10,8-19,3	16,0	12,5-19,5
12 e mais	15,2	11,9-18,5	20,9	15,1-26,7	10,0	6,7-13,4
Total	24,5	22,0-27,0	20,2	16,9-23,6	28,2	24,3-32,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,8	0,0-1,7	1,2	0,0-3,0	0,4	0,0-1,1
25 a 34	1,1	0,0-2,6	0,0	0,0-0,0	2,1	0,0-4,9
35 a 44	2,7	0,8-4,7	3,1	0,1-6,1	2,4	0,0-5,0
45 a 54	6,9	3,7-10,1	4,2	0,7-7,7	9,1	4,2-14,1
55 a 64	14,5	9,0-20,0	16,2	6,4-26,0	13,2	7,2-19,2
65 e mais	17,7	12,4-23,1	17,6	8,0-27,2	17,8	11,5-24,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,1	5,1-9,1	5,5	2,8-8,1	8,5	5,5-11,5
9 a 11	2,9	1,8-4,1	3,4	1,4-5,3	2,6	1,2-4,0
12 e mais	2,3	1,1-3,5	2,5	0,7-4,4	2,1	0,5-3,7
Total	5,0	3,9-6,1	4,3	2,8-5,8	5,5	4,0-7,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,3	0,0-1,0	0,7	0,0-2,1	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,2	0,0-0,6	0,4	0,0-1,2	0,0	0,0-0,0
35 a 44	1,7	0,1-3,2	2,0	0,0-4,1	1,4	0,0-3,7
45 a 54	2,0	0,2-3,8	2,0	0,0-5,3	2,1	0,1-4,0
55 a 64	8,4	3,5-13,4	16,7	6,3-27,1	1,9	0,1-3,7
65 e mais	7,6	3,7-11,6	5,8	0,0-12,5	8,8	4,0-13,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,1	1,7-4,4	3,5	1,2-5,8	2,6	1,1-4,1
9 a 11	1,2	0,4-2,0	1,6	0,1-3,1	0,9	0,2-1,7
12 e mais	1,7	0,3-3,1	3,2	0,4-6,1	0,3	0,0-0,9
Total	2,2	1,5-3,0	2,9	1,5-4,3	1,7	0,9-2,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,8	0,0-23,6	0,8	0,0-1,7	16,3	0,0-42,9
25 a 34	7,3	3,4-11,1	4,8	1,4-8,1	9,6	3,0-16,1
35 a 44	15,5	11,3-19,8	15,5	8,9-22,0	15,6	10,0-21,2
45 a 54	24,2	19,3-29,1	22,8	15,0-30,6	25,4	19,2-31,5
55 a 64	38,8	31,6-46,1	31,6	20,4-42,9	44,5	35,4-53,7
65 e mais	32,2	25,8-38,7	15,6	7,4-23,9	42,3	34,1-50,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,9	16,7-29,1	12,8	8,6-17,1	31,6	21,4-41,7
9 a 11	9,6	7,5-11,6	9,9	6,5-13,3	9,3	6,8-11,8
12 e mais	12,9	9,9-16,0	13,2	8,6-17,9	12,7	8,7-16,7
Total	17,0	13,6-20,5	12,0	9,5-14,6	21,3	15,6-27,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,6	0,0-1,7	1,2	0,0-3,6	0,0	0,0-0,0
35 a 44	0,4	0,0-1,0	0,6	0,0-1,9	0,1	0,0-0,4
45 a 54	3,7	1,5-5,8	1,4	0,0-4,0	5,5	2,2-8,8
55 a 64	11,4	6,7-16,1	0,9	0,0-2,2	19,7	12,0-27,5
65 e mais	17,9	12,9-22,9	2,2	0,0-5,2	27,4	20,2-34,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,2	3,7-6,7	1,4	0,0-2,9	8,5	5,8-11,2
9 a 11	2,1	1,2-2,9	0,3	0,0-0,7	3,4	1,9-5,0
12 e mais	0,6	0,2-1,1	0,3	0,0-0,9	0,9	0,2-1,6
Total	3,4	2,6-4,2	0,9	0,1-1,7	5,6	4,2-6,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,6	2,1-7,2	3,9	1,2-6,6	5,3	1,1-9,6
25 a 34	3,3	1,5-5,0	2,0	0,1-3,9	4,4	1,6-7,2
35 a 44	5,2	2,8-7,7	2,1	0,0-4,2	8,0	3,9-12,0
45 a 54	5,3	2,9-7,6	2,9	0,3-5,5	7,2	3,5-10,9
55 a 64	1,7	0,5-2,9	1,1	0,0-2,5	2,2	0,3-4,1
65 e mais	5,7	2,7-8,6	2,7	0,0-6,0	7,5	3,2-11,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,3	1,3-3,4	0,6	0,0-1,2	3,9	1,9-5,8
9 a 11	7,1	5,0-9,3	5,4	2,6-8,1	8,6	5,4-11,7
12 e mais	5,4	3,2-7,6	3,6	1,2-6,1	7,0	3,5-10,5
Total	4,3	3,4-5,3	2,5	1,5-3,5	5,9	4,3-7,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	50,2	37,6-62,8	43,7	31,7-55,7	56,2	34,3-78,1
25 a 34	39,6	32,7-46,5	39,4	28,7-50,0	39,8	31,0-48,7
35 a 44	53,1	47,5-58,7	58,2	49,7-66,7	48,7	41,4-55,9
45 a 54	49,0	43,3-54,7	52,8	43,5-62,0	45,9	38,9-52,9
55 a 64	52,7	45,3-60,2	52,4	40,1-64,6	53,0	43,8-62,3
65 e mais	65,6	58,8-72,5	55,1	42,3-67,9	72,0	64,7-79,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,1	28,0-40,2	30,3	23,0-37,6	37,4	28,1-46,7
9 a 11	54,6	50,5-58,6	55,9	49,8-62,1	53,4	48,1-58,8
12 e mais	85,9	82,4-89,3	88,9	84,2-93,6	83,1	78,1-88,1
Total	49,7	46,0-53,3	48,7	43,9-53,5	50,5	45,1-55,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	51,1	30,0-72,2
26 a 30	75,9	65,2-86,5
31 a 35	73,8	59,2-88,5
36 a 40	78,8	71,1-86,4
41 a 45	76,4	68,2-84,6
46 a 50	60,0	49,7-70,2
Anos de escolaridade		
0 a 8	64,3	46,5-82,1
9 a 11	69,0	63,3-74,6
12 e mais	70,2	63,4-76,9
Total	71,6	66,2-77,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,5	4,8-12,1	3,7	0,5-6,8	13,0	5,7-20,3
25 a 34	18,6	13,2-24,0	7,2	3,3-11,2	28,9	20,1-37,8
35 a 44	16,6	12,7-20,5	6,9	3,0-10,9	25,0	18,8-31,2
45 a 54	20,7	16,3-25,2	12,7	6,5-18,8	27,3	21,1-33,5
55 a 64	21,2	15,2-27,2	9,5	2,6-16,5	30,4	21,7-39,1
65 e mais	15,7	10,9-20,5	4,9	0,0-10,0	22,3	15,5-29,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,8	11,4-18,1	4,9	2,4-7,3	23,3	17,2-29,5
9 a 11	16,7	13,8-19,7	9,6	5,7-13,5	22,4	18,1-26,7
12 e mais	20,1	16,3-24,0	10,1	5,8-14,3	29,3	23,4-35,2
Total	16,3	14,2-18,4	7,2	5,3-9,1	24,1	20,5-27,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	76,0	59,6-92,4	100,0	100,0-100,0	69,7	49,9-89,5
25 a 34	83,3	71,8-94,8	94,2	83,0-100,0	80,8	67,0-94,7
35 a 44	82,2	72,6-91,7	64,6	36,5-92,8	86,4	77,2-95,6
45 a 54	93,5	88,4-98,6	97,2	91,8-100,0	92,1	85,4-98,8
55 a 64	87,2	75,2-100,0	94,4	83,2-100,0	85,5	70,9-100,0
65 e mais	92,7	83,3-100,0	85,4	56,7-100,0	93,6	83,7-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	87,2	79,5-94,9	88,9	74,3-100,0	86,9	78,2-95,6
9 a 11	81,3	73,4-89,2	86,8	73,1-100,0	79,4	70,1-88,8
12 e mais	87,6	80,1-95,0	92,3	81,4-100,0	86,1	77,0-95,2
Total	85,5	80,8-90,1	89,0	81,0-96,9	84,6	79,1-90,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,8	6,2-19,3	17,6	7,5-27,6	8,4	0,0-16,9
25 a 34	23,4	13,1-33,7	34,2	16,9-51,5	12,7	5,0-20,5
35 a 44	17,2	11,7-22,8	22,8	13,5-32,1	11,4	6,1-16,8
45 a 54	18,5	13,0-24,0	19,7	11,3-28,1	17,2	10,3-24,1
55 a 64	14,8	8,6-20,9	16,6	8,3-25,0	12,8	3,7-21,9
65 e mais	5,3	1,6-9,0	5,5	0,0-11,9	5,2	1,3-9,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,9	15,6-28,2	29,2	19,2-39,2	13,7	7,5-19,8
9 a 11	11,8	9,1-14,6	14,4	10,0-18,8	9,7	6,4-13,1
12 e mais	6,7	4,4-9,0	9,8	5,4-14,1	4,0	2,0-6,0
Total	17,3	13,4-21,2	23,3	16,6-30,0	11,4	7,7-15,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,3	2,9-9,7	10,2	3,7-16,6	2,7	0,3-5,2
25 a 34	18,8	11,2-26,4	22,6	10,1-35,1	15,1	6,3-24,0
35 a 44	29,0	22,6-35,3	26,2	17,5-34,9	31,8	22,7-40,9
45 a 54	47,0	39,8-54,2	56,5	45,9-67,0	36,3	27,7-44,9
55 a 64	42,3	33,6-51,1	54,1	42,2-66,0	30,1	17,8-42,4
65 e mais	55,3	44,4-66,3	54,4	36,2-72,7	56,1	43,4-68,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,1	23,9-34,4	31,4	23,5-39,3	26,6	19,8-33,4
9 a 11	15,7	12,9-18,4	20,8	16,0-25,6	11,5	8,4-14,5
12 e mais	17,0	13,2-20,8	19,8	13,9-25,6	14,7	9,7-19,7
Total	23,8	20,6-27,0	27,4	22,3-32,5	20,2	16,3-24,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,4	0,0-3,8	2,5	0,0-7,2	0,5	0,0-1,4
25 a 34	1,9	0,0-3,9	2,0	0,0-5,2	1,7	0,0-4,3
35 a 44	5,3	2,0-8,6	8,5	2,4-14,7	1,9	0,0-3,9
45 a 54	7,7	3,8-11,6	8,8	2,8-14,8	6,5	1,8-11,2
55 a 64	2,8	0,0-5,7	2,4	0,0-5,3	3,3	0,0-8,3
65 e mais	1,3	0,0-3,4	2,2	0,0-6,6	0,5	0,0-1,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,1	2,0-6,2	5,7	2,2-9,2	2,3	0,5-4,1
9 a 11	1,6	0,8-2,3	1,7	0,6-2,9	1,4	0,4-2,5
12 e mais	3,0	1,5-4,5	4,4	1,5-7,3	1,7	0,4-3,1
Total	3,2	1,9-4,4	4,5	2,2-6,7	1,9	0,8-3,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	44,5	36,0-53,0	40,2	28,4-51,9	48,5	36,6-60,4
25 a 34	39,5	30,8-48,1	37,9	24,2-51,6	41,0	30,5-51,4
35 a 44	45,1	38,3-51,8	51,3	41,4-61,3	38,6	30,0-47,2
45 a 54	43,3	36,1-50,4	44,0	33,2-54,8	42,4	33,3-51,6
55 a 64	25,7	17,8-33,5	22,7	12,7-32,6	28,8	16,7-40,8
65 e mais	27,1	17,3-37,0	28,8	12,0-45,7	25,6	14,7-36,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	39,6	33,5-45,8	39,7	30,8-48,5	39,6	31,0-48,1
9 a 11	46,5	42,3-50,7	46,1	39,8-52,3	46,8	41,2-52,5
12 e mais	33,2	28,8-37,6	34,0	26,9-41,0	32,6	27,0-38,1
Total	41,2	37,3-45,2	41,0	35,1-46,9	41,4	36,2-46,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,1	17,4-32,8	24,0	13,5-34,4	26,4	15,0-37,8
25 a 34	49,1	39,0-59,1	55,4	40,4-70,5	42,1	30,5-53,7
35 a 44	56,8	49,9-63,7	60,6	50,6-70,6	52,2	42,9-61,6
45 a 54	56,5	49,0-64,1	55,7	44,8-66,6	57,6	47,8-67,4
55 a 64	61,0	52,2-69,7	57,2	45,3-69,1	65,5	52,7-78,2
65 e mais	45,6	33,0-58,1	41,2	22,7-59,6	51,2	35,4-67,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	50,1	42,9-57,3	48,5	38,7-58,4	52,3	41,7-63,0
9 a 11	38,4	34,4-42,5	42,8	36,7-48,9	34,6	29,2-39,9
12 e mais	45,8	41,1-50,5	60,0	52,7-67,3	33,6	28,0-39,1
Total	45,7	41,3-50,0	47,8	41,5-54,2	43,1	37,5-48,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,6	0,9-10,3	7,0	0,0-14,6	4,1	0,0-9,1
25 a 34	18,9	8,1-29,6	25,1	6,6-43,6	12,0	5,4-18,6
35 a 44	18,4	12,7-24,0	21,2	12,5-29,9	14,9	8,4-21,4
45 a 54	17,7	12,5-23,0	13,5	6,9-20,1	23,6	15,2-31,9
55 a 64	20,5	11,9-29,0	14,7	5,1-24,4	27,3	13,0-41,6
65 e mais	12,6	5,7-19,4	1,6	0,0-4,1	26,6	13,0-40,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,8	11,2-24,5	18,0	7,7-28,3	17,5	11,3-23,7
9 a 11	10,3	7,9-12,6	12,5	8,9-16,2	8,3	5,3-11,2
12 e mais	14,1	10,7-17,4	18,5	12,7-24,3	10,3	6,7-13,9
Total	14,8	11,0-18,7	16,4	9,9-22,9	13,0	9,8-16,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,7	14,6-26,8	16,1	8,5-23,7	24,9	15,6-34,2
25 a 34	23,7	16,3-31,2	18,4	7,5-29,3	28,9	19,2-38,7
35 a 44	24,3	18,9-29,6	17,8	10,6-25,0	30,9	23,1-38,6
45 a 54	23,4	17,5-29,4	22,4	13,4-31,4	24,5	16,9-32,1
55 a 64	24,3	17,3-31,4	18,6	10,1-27,1	30,3	19,0-41,6
65 e mais	21,4	13,2-29,6	18,8	6,2-31,4	23,8	13,3-34,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,2	14,4-24,0	16,0	9,6-22,4	22,8	15,7-29,8
9 a 11	26,5	22,9-30,2	20,3	15,4-25,2	31,6	26,4-36,9
12 e mais	34,4	30,1-38,6	27,5	21,0-33,9	40,2	34,6-45,9
Total	22,9	19,8-26,0	18,2	13,9-22,5	27,5	23,1-31,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,5	8,4-18,6	12,2	5,1-19,2	14,7	7,4-22,1
25 a 34	15,2	8,9-21,5	10,8	1,9-19,6	19,6	10,9-28,3
35 a 44	14,3	9,9-18,7	10,0	4,8-15,3	18,6	11,8-25,5
45 a 54	13,7	8,6-18,8	16,8	8,4-25,2	10,1	5,1-15,1
55 a 64	16,5	10,3-22,7	9,5	2,9-16,0	23,8	13,3-34,3
65 e mais	12,3	5,7-18,9	15,2	3,4-27,0	9,7	3,0-16,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,4	8,4-16,5	10,6	5,2-16,0	14,4	8,4-20,5
9 a 11	16,4	13,4-19,5	13,7	9,5-17,9	18,7	14,3-23,1
12 e mais	19,1	15,7-22,6	15,0	9,9-20,2	22,6	18,0-27,3
Total	14,3	11,7-16,9	11,9	8,2-15,5	16,7	13,0-20,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	41,1	32,7-49,5	40,5	28,7-52,2	41,7	29,8-53,5
25 a 34	48,5	39,1-57,9	55,8	40,0-71,7	41,4	30,3-52,5
35 a 44	42,1	35,4-48,8	56,0	46,2-65,9	27,8	19,9-35,7
45 a 54	26,6	20,5-32,7	29,5	20,2-38,7	23,3	15,5-31,2
55 a 64	23,1	16,0-30,2	27,8	17,4-38,1	18,3	8,7-27,8
65 e mais	21,9	12,2-31,6	31,1	13,8-48,4	13,7	5,0-22,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	39,9	33,6-46,3	43,9	34,6-53,2	35,5	26,7-44,3
9 a 11	40,9	36,8-45,1	49,8	43,5-56,1	33,6	28,2-39,0
12 e mais	37,5	32,9-42,1	48,2	40,8-55,6	28,4	23,1-33,7
Total	40,0	36,0-44,0	46,0	39,8-52,1	34,1	28,9-39,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	65,9	57,3-74,5	67,9	56,1-79,6	64,0	51,7-76,4
25 a 34	63,1	53,1-73,2	56,0	39,5-72,4	70,1	60,7-79,6
35 a 44	66,3	59,9-72,7	62,6	52,8-72,3	70,1	62,0-78,2
45 a 54	59,0	51,9-66,1	54,9	44,2-65,7	63,6	54,6-72,6
55 a 64	64,6	56,4-72,8	60,8	49,4-72,2	68,5	57,0-80,1
65 e mais	59,2	48,3-70,0	53,4	35,2-71,7	64,3	52,3-76,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	57,8	51,2-64,4	52,9	43,3-62,5	63,3	54,9-71,7
9 a 11	73,9	70,3-77,4	75,0	69,8-80,2	72,9	68,0-77,8
12 e mais	69,6	65,5-73,8	68,7	61,9-75,5	70,4	65,3-75,5
Total	64,0	59,8-68,2	60,6	54,0-67,2	67,3	62,3-72,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	37,1	29,0-45,2	36,1	24,7-47,4	38,0	26,5-49,5
25 a 34	33,4	23,5-43,3	41,7	25,3-58,2	25,3	16,5-34,0
35 a 44	24,2	18,2-30,1	30,3	20,9-39,6	17,9	10,8-25,1
45 a 54	10,5	6,6-14,5	10,9	4,9-16,9	10,1	5,2-15,0
55 a 64	7,8	3,7-11,9	7,7	2,5-12,8	7,9	1,6-14,3
65 e mais	11,3	3,9-18,7	11,7	0,0-24,8	10,9	3,2-18,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,1	18,6-31,6	28,7	18,5-38,9	21,1	13,6-28,6
9 a 11	33,0	29,0-37,1	36,8	30,7-42,8	30,0	24,4-35,6
12 e mais	22,9	18,9-27,0	25,8	19,2-32,5	20,4	15,5-25,3
Total	27,4	23,4-31,5	30,8	24,2-37,3	24,1	19,5-28,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,5	15,6-29,4	32,6	21,0-44,3	13,1	6,3-19,9
25 a 34	25,8	17,5-34,2	32,2	18,1-46,3	19,6	10,5-28,7
35 a 44	17,6	12,7-22,5	21,7	13,6-29,8	13,4	8,0-18,7
45 a 54	15,4	10,3-20,5	17,8	9,7-26,0	12,6	6,9-18,3
55 a 64	15,0	8,3-21,7	15,9	7,6-24,2	14,1	3,3-24,8
65 e mais	5,9	1,4-10,4	4,8	0,0-11,6	6,9	1,0-12,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,4	14,0-24,8	25,0	16,5-33,6	13,2	7,1-19,2
9 a 11	21,6	18,1-25,0	28,9	23,2-34,5	15,5	11,4-19,6
12 e mais	23,4	19,6-27,2	25,3	19,1-31,5	21,7	17,1-26,3
Total	20,5	17,1-23,9	26,2	20,5-31,8	14,8	11,1-18,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	46,2	37,7-54,8	52,2	39,9-64,5	40,7	28,9-52,6
25 a 34	50,8	41,4-60,1	57,8	43,1-72,5	43,9	32,9-55,0
35 a 44	57,9	51,5-64,4	65,5	56,5-74,4	50,2	41,3-59,1
45 a 54	51,7	44,5-58,8	63,8	53,6-74,0	37,8	29,0-46,7
55 a 64	35,4	27,1-43,8	48,0	36,1-59,9	22,4	12,1-32,7
65 e mais	12,7	5,9-19,6	24,3	10,3-38,2	2,4	0,0-5,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	50,4	43,9-56,8	59,3	50,2-68,4	40,4	31,6-49,2
9 a 11	47,4	43,2-51,6	55,3	49,0-61,5	40,9	35,5-46,4
12 e mais	41,8	37,2-46,4	43,2	35,8-50,5	40,6	35,0-46,3
Total	48,7	44,6-52,7	56,8	50,7-62,8	40,6	35,3-45,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,7	12,9-28,5	35,1	22,1-48,1	7,4	1,7-13,1
25 a 34	16,9	9,4-24,3	17,4	7,3-27,4	16,4	5,4-27,3
35 a 44	16,9	11,2-22,5	17,9	9,0-26,8	15,8	9,1-22,5
45 a 54	13,9	8,7-19,0	18,2	9,7-26,7	8,9	4,0-13,8
55 a 64	17,3	10,4-24,2	22,8	12,5-33,2	11,6	2,7-20,5
65 e mais	6,8	1,4-12,3	12,6	1,7-23,4	1,7	0,0-5,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,0	15,5-26,4	26,5	18,2-34,7	14,8	7,8-21,8
9 a 11	13,2	10,3-16,1	17,9	12,8-23,0	9,4	6,2-12,5
12 e mais	5,7	3,6-7,8	6,6	2,9-10,3	4,9	2,7-7,2
Total	17,1	13,7-20,5	22,3	16,9-27,8	12,0	7,9-16,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	39,4	30,7-48,1	12,1	5,3-18,9	64,6	54,8-74,5
25 a 34	38,4	29,8-47,0	14,9	5,7-24,1	61,3	50,7-71,9
35 a 44	40,0	33,6-46,5	21,8	13,5-30,0	58,9	50,0-67,8
45 a 54	38,3	31,5-45,1	20,1	11,6-28,5	59,1	50,0-68,2
55 a 64	30,9	23,2-38,6	16,6	8,5-24,8	45,8	33,0-58,6
65 e mais	25,9	17,0-34,8	12,8	2,6-23,0	37,6	25,0-50,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	39,1	32,9-45,3	15,6	9,7-21,5	65,5	57,7-73,3
9 a 11	38,7	34,7-42,6	19,2	14,7-23,8	54,7	49,0-60,4
12 e mais	28,8	24,6-32,9	11,9	7,3-16,5	43,1	37,1-49,0
Total	38,0	34,2-41,9	16,3	12,3-20,3	59,6	54,6-64,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,9	11,1-26,7	24,1	13,0-35,2	14,1	3,1-25,1
25 a 34	22,6	15,2-29,9	34,5	21,0-48,0	10,9	4,0-17,7
35 a 44	19,8	14,1-25,4	31,9	22,4-41,4	7,4	2,7-12,1
45 a 54	11,7	7,5-15,9	16,1	9,4-22,7	6,7	1,7-11,7
55 a 64	5,1	1,2-9,0	9,2	1,9-16,6	0,8	0,0-1,7
65 e mais	1,4	0,0-2,8	1,0	0,0-3,0	1,7	0,0-3,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,0	12,6-23,3	25,0	16,9-33,1	10,2	3,4-17,0
9 a 11	17,5	14,3-20,8	28,0	22,3-33,6	9,0	5,7-12,2
12 e mais	17,7	14,0-21,4	27,8	21,2-34,4	9,1	5,5-12,7
Total	17,8	14,5-21,2	26,1	20,7-31,5	9,7	5,7-13,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,0	0,0-7,2	1,2	0,0-2,5	4,6	0,0-12,6
25 a 34	5,2	0,6-9,8	10,0	0,9-19,1	0,4	0,0-0,9
35 a 44	3,2	0,8-5,5	4,5	1,2-7,8	1,8	0,0-5,1
45 a 54	1,5	0,1-2,9	2,9	0,2-5,5	0,0	0,0-0,0
55 a 64	0,4	0,0-1,3	0,9	0,0-2,5	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,7	0,6-6,8	4,5	0,1-8,9	2,8	0,0-7,2
9 a 11	2,2	1,1-3,3	4,4	2,0-6,8	0,4	0,0-1,0
12 e mais	3,6	1,8-5,3	6,7	3,2-10,3	0,9	0,0-2,0
Total	3,2	1,3-5,1	4,7	1,8-7,5	1,8	0,0-4,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,7	0,0-3,6	0,4	0,0-1,0	2,9	0,0-6,4
25 a 34	5,2	1,4-8,9	2,8	0,0-6,2	7,5	1,0-14,0
35 a 44	5,5	2,5-8,6	0,7	0,0-1,7	10,5	4,6-16,4
45 a 54	6,4	2,8-10,0	4,9	0,0-9,9	8,0	2,8-13,3
55 a 64	6,3	2,0-10,6	5,3	0,0-11,1	7,3	0,8-13,8
65 e mais	13,2	5,1-21,2	11,1	0,0-24,8	15,0	5,7-24,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,3	3,8-8,8	2,8	0,7-5,0	10,1	5,5-14,8
9 a 11	2,9	1,8-4,1	1,8	0,3-3,4	3,9	2,2-5,5
12 e mais	2,2	0,9-3,5	1,7	0,0-3,7	2,6	0,9-4,3
Total	4,9	3,3-6,4	2,5	1,0-3,9	7,2	4,6-9,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	75,5	64,3-86,7	57,5	46,1-68,9
60 a 69	62,0	48,6-75,3	51,0	37,9-64,1
Anos de escolaridade				
0 a 8	67,5	57,4-77,6	50,5	40,3-60,7
9 a 11	86,9	75,9-97,9	81,5	69,8-93,2
12 e mais	69,5	37,8-100,0	57,3	29,3-85,2
Total	70,1	61,5-78,7	54,9	46,2-63,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	81,4	73,1-89,8	80,5	72,1-88,8
35 a 44	91,0	86,0-96,1	84,0	77,2-90,8
45 a 54	85,9	78,5-93,4	82,2	74,4-89,9
55 a 59	95,4	90,0-100,0	85,5	74,1-96,9
Anos de escolaridade				
0 a 8	83,9	76,7-91,1	79,6	72,0-87,2
9 a 11	86,7	82,3-91,2	83,1	78,3-87,8
12 e mais	93,7	90,3-97,1	92,0	88,3-95,6
Total	85,9	81,5-90,3	82,1	77,5-86,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	36,9	29,0-44,9	19,4	10,7-28,1	53,1	41,1-65,1
25 a 34	40,7	31,0-50,3	29,3	12,3-46,2	51,8	41,0-62,6
35 a 44	32,6	26,8-38,4	15,7	9,5-21,8	50,0	41,1-58,9
45 a 54	22,7	17,6-27,8	9,7	5,2-14,1	37,6	29,0-46,2
55 a 64	19,7	12,4-27,0	7,1	1,6-12,6	32,8	20,2-45,5
65 e mais	13,1	5,7-20,4	4,7	0,0-13,2	20,6	9,4-31,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	26,3	19,9-32,8	14,5	4,8-24,1	39,6	31,0-48,2
9 a 11	41,6	37,4-45,7	25,0	19,7-30,4	55,2	49,6-60,8
12 e mais	51,8	47,2-56,5	32,2	25,3-39,1	68,5	63,1-73,9
Total	33,5	29,5-37,5	19,0	12,9-25,1	47,8	42,6-53,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,9	2,4-11,5	9,5	1,0-18,0	4,6	1,1-8,0
25 a 34	20,1	9,8-30,4	19,6	1,4-37,7	20,6	10,6-30,7
35 a 44	14,4	10,0-18,8	14,5	8,1-20,8	14,3	8,2-20,5
45 a 54	26,7	20,4-33,1	24,8	15,4-34,3	28,9	20,6-37,2
55 a 64	42,2	33,5-50,9	30,0	19,5-40,5	55,0	41,9-68,0
65 e mais	57,3	46,5-68,2	58,0	40,3-75,7	56,7	43,6-69,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,8	17,9-29,7	22,9	13,4-32,4	24,8	18,1-31,5
9 a 11	11,4	8,9-13,8	10,0	6,7-13,4	12,5	9,0-15,9
12 e mais	13,2	10,1-16,4	16,8	11,0-22,5	10,3	7,1-13,4
Total	18,9	15,2-22,5	18,7	12,4-24,9	19,1	15,2-23,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,5	0,0-1,4	1,0	0,0-2,8	0,1	0,0-0,3
25 a 34	1,7	0,0-4,9	0,0	0,0-0,0	3,3	0,0-9,6
35 a 44	2,5	0,3-4,6	0,9	0,0-2,6	4,1	0,2-8,0
45 a 54	8,8	4,9-12,8	8,5	2,7-14,2	9,3	4,0-14,5
55 a 64	13,2	7,2-19,2	10,4	2,3-18,5	16,1	7,1-25,1
65 e mais	12,3	5,8-18,8	11,8	1,5-22,2	12,7	4,7-20,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,6	2,5-6,7	3,0	1,3-4,7	6,4	2,5-10,4
9 a 11	1,8	0,8-2,8	1,8	0,0-3,7	1,8	0,8-2,8
12 e mais	1,4	0,4-2,5	2,0	0,0-4,0	0,9	0,1-1,8
Total	3,4	2,2-4,7	2,6	1,4-3,8	4,3	2,1-6,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,6	0,0-1,3	0,6	0,0-1,7	0,6	0,0-1,6
25 a 34	2,7	0,0-6,3	1,8	0,0-4,9	3,6	0,0-9,9
35 a 44	0,9	0,0-1,9	0,0	0,0-0,0	1,9	0,0-3,9
45 a 54	3,4	0,9-6,0	4,6	0,1-9,1	2,1	0,4-3,9
55 a 64	4,5	1,5-7,5	4,8	0,5-9,2	4,1	0,0-8,2
65 e mais	10,1	3,6-16,5	8,0	0,0-17,5	12,0	3,3-20,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,9	1,0-4,9	2,3	0,4-4,1	3,7	0,1-7,2
9 a 11	1,2	0,4-1,9	0,8	0,0-1,8	1,4	0,3-2,6
12 e mais	1,7	0,4-3,1	2,3	0,0-4,9	1,2	0,1-2,4
Total	2,3	1,1-3,4	1,8	0,6-3,1	2,7	0,6-4,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,0	1,8-10,2	6,1	0,0-13,4	5,9	1,4-10,4
25 a 34	8,5	3,7-13,3	4,9	1,0-8,8	11,9	3,5-20,3
35 a 44	21,0	15,5-26,5	16,7	9,5-23,9	25,5	17,3-33,6
45 a 54	27,3	21,4-33,2	18,3	10,8-25,7	37,6	29,0-46,3
55 a 64	31,3	23,3-39,4	17,6	8,3-26,9	45,6	32,7-58,5
65 e mais	31,8	21,8-41,9	23,7	7,5-39,8	39,2	26,8-51,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,6	12,7-20,6	11,4	6,6-16,1	22,5	16,2-28,8
9 a 11	11,2	8,9-13,5	8,6	5,6-11,7	13,2	9,9-16,6
12 e mais	17,4	14,0-20,7	16,4	11,1-21,8	18,2	14,0-22,4
Total	15,0	12,5-17,4	11,0	7,9-14,1	18,9	15,2-22,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,3	0,0-0,8	0,5	0,0-1,6	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,2	0,0-0,5	0,2	0,0-0,7	0,2	0,0-0,5
35 a 44	0,5	0,0-1,0	0,0	0,0-0,0	1,1	0,0-2,1
45 a 54	6,6	3,2-10,1	0,4	0,0-1,2	13,7	6,8-20,6
55 a 64	17,0	10,0-24,0	3,6	0,0-8,0	31,0	18,5-43,4
65 e mais	23,4	14,6-32,1	6,7	5,8-19,1	38,3	26,3-50,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,9	2,7-5,2	0,7	0,0-1,7	7,5	5,0-10,0
9 a 11	1,6	0,9-2,3	1,0	0,0-2,1	2,1	1,1-3,0
12 e mais	1,5	0,6-2,3	0,3	0,0-0,8	2,5	1,0-4,0
Total	3,0	2,2-3,7	0,7	0,0-1,4	5,1	3,8-6,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,5	0,7-8,3	5,3	0,0-11,9	3,9	0,0-7,8
25 a 34	3,8	1,9-5,7	1,7	0,1-3,3	5,9	2,5-9,2
35 a 44	4,1	1,5-6,7	3,0	0,0-6,7	5,2	1,5-9,0
45 a 54	1,9	0,0-3,7	2,4	0,0-5,6	1,3	0,1-2,5
55 a 64	1,8	0,0-3,9	0,7	0,0-1,6	3,0	0,0-7,2
65 e mais	1,8	0,0-4,2	2,6	0,0-7,0	1,1	0,0-3,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,0	0,9-5,0	3,1	0,0-6,3	2,8	0,2-5,3
9 a 11	4,5	2,9-6,1	2,4	0,7-4,1	6,2	3,6-8,8
12 e mais	5,3	3,1-7,5	4,1	0,4-7,8	6,3	3,7-9,0
Total	3,7	2,3-5,0	3,0	0,9-5,1	4,3	2,6-6,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,4	12,1-22,7	20,7	12,2-29,2	14,4	8,0-20,8
25 a 34	19,8	13,7-25,9	15,9	8,4-23,5	23,7	14,6-32,7
35 a 44	17,4	13,2-21,5	16,7	10,2-23,2	18,1	13,0-23,2
45 a 54	23,9	18,4-29,4	24,0	15,5-32,4	23,8	17,1-30,5
55 a 64	22,4	15,9-29,0	19,9	11,5-28,2	25,0	14,9-35,2
65 e mais	21,4	11,9-30,9	26,1	9,4-42,8	17,0	7,7-26,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,8	9,0-16,6	12,3	7,3-17,3	13,3	7,5-19,1
9 a 11	22,7	19,4-26,1	26,3	20,8-31,8	19,7	15,7-23,8
12 e mais	50,4	45,8-55,1	44,1	36,8-51,3	55,8	49,9-61,8
Total	19,3	16,7-22,0	19,0	15,2-22,8	19,6	16,0-23,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	70,9	60,8-81,0
26 a 30	72,5	58,8-86,2
31 a 35	72,4	55,4-89,3
36 a 40	65,9	53,5-78,3
41 a 45	79,2	70,0-88,5
46 a 50	66,9	55,1-78,7
Anos de escolaridade		
0 a 8	71,3	61,4-81,1
9 a 11	71,6	66,2-77,1
12 e mais	73,3	68,2-78,5
Total	70,4	65,8-75,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,1	5,2-15,1	11,6	3,6-19,5	8,8	2,8-14,9
25 a 34	14,2	4,6-23,8	17,4	0,0-35,6	11,2	5,7-16,7
35 a 44	16,6	11,3-21,8	9,5	3,3-15,7	23,8	15,6-32,1
45 a 54	13,8	9,1-18,6	10,1	3,8-16,5	18,0	11,1-24,9
55 a 64	6,9	2,9-10,8	3,6	0,0-7,3	10,2	3,2-17,3
65 e mais	16,8	8,9-24,7	12,8	0,0-25,7	20,4	10,9-29,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,1	8,5-19,7	13,3	3,7-22,8	15,0	9,7-20,3
9 a 11	12,2	9,4-15,0	11,1	6,8-15,5	13,1	9,4-16,7
12 e mais	12,1	9,4-14,7	8,5	4,6-12,3	15,1	11,4-18,7
Total	13,3	9,9-16,7	12,3	6,1-18,4	14,3	11,1-17,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	81,6	66,2-97,0	86,1	67,4-100,0	76,2	51,3-100,0
25 a 34	79,5	58,7-100,0	87,8	65,4-100,0	67,3	41,5-93,0
35 a 44	71,4	54,5-88,3	70,7	38,5-100,0	71,7	51,9-91,6
45 a 54	81,6	65,3-97,9	97,4	92,2-100,0	71,2	47,6-94,8
55 a 64	87,2	68,9-100,0	66,0	14,3-100,0	95,1	85,1-100,0
65 e mais	100,0	100,0-100,0	100,0	100,0-100,0	100,0	100,0-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	79,4	66,0-92,8	88,8	72,9-100,0	70,2	53,0-87,4
9 a 11	76,3	65,5-87,2	78,3	61,0-95,6	75,0	61,1-88,8
12 e mais	90,3	83,3-97,3	82,2	65,5-99,0	94,2	87,7-100,0
Total	79,4	70,4-88,4	85,6	73,1-98,1	74,2	63,2-85,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Campo Grande

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,8	13,8-33,8	23,1	8,5-37,7	24,5	10,8-38,2
25 a 34	16,6	10,3-22,9	26,0	15,0-37,1	7,9	2,3-13,5
35 a 44	18,8	13,5-24,0	22,7	14,0-31,4	15,3	9,1-21,4
45 a 54	22,4	17,2-27,7	26,4	17,7-35,1	18,9	12,7-25,1
55 a 64	14,5	9,0-19,9	18,9	9,1-28,7	10,5	5,3-15,7
65 e mais	9,5	5,2-13,8	13,2	4,9-21,6	6,4	3,0-9,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	24,1	19,0-29,1	28,4	20,5-36,4	20,0	13,6-26,3
9 a 11	11,5	8,6-14,3	15,4	10,3-20,6	8,1	5,3-10,9
12 e mais	11,4	8,1-14,7	16,1	9,9-22,4	7,2	4,4-10,0
Total	18,8	15,6-21,9	23,2	18,2-28,2	14,8	10,9-18,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,5	7,3-21,8	13,5	3,2-23,9	15,5	5,3-25,6
25 a 34	16,7	10,7-22,7	24,2	13,7-34,8	9,7	4,2-15,2
35 a 44	19,0	14,3-23,8	19,6	11,9-27,2	18,6	12,7-24,4
45 a 54	28,4	22,5-34,3	33,8	24,1-43,6	23,6	17,0-30,1
55 a 64	34,5	27,6-41,4	41,9	30,6-53,2	28,0	19,6-36,3
65 e mais	38,7	31,9-45,6	54,1	42,1-66,2	26,0	19,2-32,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,4	21,1-29,8	30,1	22,9-37,4	21,1	15,9-26,3
9 a 11	16,0	12,9-19,0	19,2	14,5-24,0	13,1	9,3-17,0
12 e mais	16,6	13,1-20,0	20,0	13,9-26,1	13,5	9,8-17,2
Total	21,6	18,8-24,3	25,8	21,3-30,3	17,7	14,6-20,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,7	0,0-8,0	6,8	0,0-15,4	0,7	0,0-2,1
25 a 34	5,7	1,5-9,9	11,4	2,9-19,8	0,4	0,0-1,1
35 a 44	6,2	2,6-9,9	8,6	2,4-14,8	4,2	0,0-8,3
45 a 54	7,3	4,3-10,4	11,6	5,7-17,5	3,5	1,4-5,6
55 a 64	8,1	3,4-12,7	14,4	5,1-23,6	2,4	0,1-4,8
65 e mais	2,3	0,0-4,9	3,8	0,0-9,1	1,1	0,0-2,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,7	3,9-9,6	12,0	6,5-17,5	1,8	0,1-3,5
9 a 11	4,2	2,2-6,3	5,8	2,0-9,7	2,8	1,1-4,5
12 e mais	3,5	1,5-5,5	6,0	2,0-10,0	1,3	0,0-2,6
Total	5,6	3,8-7,3	9,5	6,1-12,9	2,0	0,9-3,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	44,4	35,0-53,8	41,7	27,5-55,9	47,0	34,6-59,3
25 a 34	37,6	30,0-45,1	49,5	37,7-61,3	26,5	17,9-35,1
35 a 44	36,7	30,7-42,7	43,5	33,7-53,3	30,7	23,6-37,7
45 a 54	36,8	30,7-42,8	39,4	29,7-49,2	34,4	27,0-41,8
55 a 64	22,4	16,0-28,8	22,9	12,4-33,4	22,0	14,3-29,6
65 e mais	23,3	17,3-29,3	24,2	13,9-34,6	22,5	15,6-29,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	36,0	30,8-41,1	41,8	33,6-50,1	30,5	24,2-36,8
9 a 11	42,1	37,8-46,5	47,4	40,9-54,0	37,5	31,7-43,3
12 e mais	28,7	24,3-33,2	27,6	20,4-34,9	29,6	24,2-35,1
Total	36,4	33,1-39,7	41,0	35,7-46,3	32,2	28,1-36,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	27,7	17,8-37,5	37,8	22,3-53,3	17,6	7,1-28,1
25 a 34	49,5	41,6-57,4	56,8	44,9-68,7	42,3	31,6-52,9
35 a 44	49,7	43,5-55,8	56,7	46,6-66,8	43,1	35,7-50,4
45 a 54	57,4	50,9-63,9	62,3	52,4-72,2	52,2	43,9-60,5
55 a 64	60,7	53,2-68,3	59,6	48,0-71,1	62,0	52,3-71,6
65 e mais	59,8	52,2-67,4	62,1	49,7-74,4	57,5	48,5-66,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	52,7	46,9-58,4	54,8	46,3-63,3	50,4	42,7-58,0
9 a 11	40,5	36,3-44,7	49,1	42,6-55,7	32,7	27,4-38,0
12 e mais	41,7	36,8-46,6	59,0	51,2-66,8	26,4	21,5-31,4
Total	47,5	44,0-51,1	54,0	48,6-59,4	41,0	36,6-45,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,3	1,4-5,2	5,0	1,5-8,5	1,6	0,0-3,3
25 a 34	12,9	8,2-17,6	11,0	4,5-17,4	14,9	8,1-21,7
35 a 44	16,7	12,3-21,1	20,8	13,3-28,3	12,9	8,2-17,6
45 a 54	15,8	10,9-20,7	13,3	6,5-20,1	18,4	11,4-25,4
55 a 64	30,2	22,9-37,5	31,0	19,6-42,4	29,4	20,4-38,4
65 e mais	16,0	10,9-21,1	9,9	3,2-16,6	21,9	14,6-29,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,7	11,5-17,9	13,0	8,4-17,5	16,5	12,0-21,1
9 a 11	12,4	9,7-15,1	14,0	9,8-18,2	10,9	7,5-14,3
12 e mais	12,7	9,4-16,1	16,4	10,3-22,5	9,4	6,3-12,6
Total	13,7	11,7-15,7	13,8	10,7-16,8	13,7	11,0-16,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	27,5	19,3-35,6	21,4	9,4-33,3	33,3	22,2-44,4
25 a 34	27,5	20,6-34,4	17,4	9,1-25,7	36,8	26,7-46,9
35 a 44	34,5	28,9-40,1	25,6	17,3-33,9	42,4	35,1-49,6
45 a 54	31,1	25,6-36,6	19,0	11,5-26,5	41,9	34,3-49,4
55 a 64	37,1	30,2-44,1	25,6	15,6-35,5	47,4	38,2-56,6
65 e mais	48,3	41,4-55,3	42,5	30,8-54,2	53,2	45,2-61,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	30,0	25,3-34,8	20,4	13,9-26,8	39,0	32,4-45,6
9 a 11	27,0	23,3-30,6	19,8	14,8-24,9	33,2	28,0-38,4
12 e mais	46,8	41,9-51,6	36,3	28,6-44,0	56,0	50,2-61,7
Total	31,9	28,9-35,0	22,7	18,5-27,0	40,2	36,1-44,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,0	10,4-23,6	11,2	2,4-20,0	22,6	12,9-32,3
25 a 34	12,8	7,9-17,6	8,7	3,8-13,5	16,5	8,6-24,5
35 a 44	20,5	16,0-25,0	15,9	9,1-22,7	24,5	18,5-30,6
45 a 54	15,0	10,9-19,0	7,2	2,5-11,9	21,9	15,7-28,1
55 a 64	22,9	17,2-28,7	11,8	5,2-18,4	32,8	24,2-41,4
65 e mais	29,1	22,9-35,3	24,6	14,7-34,4	32,9	25,2-40,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,4	11,8-19,0	8,9	4,5-13,2	21,5	16,0-27,0
9 a 11	15,8	12,8-18,7	12,3	8,1-16,5	18,8	14,7-22,9
12 e mais	29,7	25,4-34,0	23,2	16,5-30,0	35,5	30,0-40,9
Total	17,8	15,4-20,1	12,0	9,0-15,0	23,1	19,6-26,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	51,6	42,0-61,2	60,8	46,5-75,1	42,8	30,5-55,1
25 a 34	56,4	48,9-63,8	66,2	55,7-76,6	47,3	37,1-57,6
35 a 44	50,4	44,4-56,4	64,3	55,3-73,3	38,0	30,8-45,2
45 a 54	42,6	36,4-48,9	48,8	38,8-58,7	37,2	29,6-44,8
55 a 64	40,0	32,6-47,3	51,8	40,2-63,4	29,4	20,8-38,0
65 e mais	31,3	24,7-37,9	43,1	31,2-55,1	21,5	15,3-27,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	52,7	47,4-58,0	62,6	54,8-70,4	43,6	36,7-50,4
9 a 11	43,1	38,7-47,5	52,5	46,0-59,1	34,9	29,2-40,5
12 e mais	43,6	38,7-48,5	57,6	49,8-65,4	31,3	25,9-36,7
Total	48,8	45,4-52,2	59,3	54,2-64,4	39,3	34,9-43,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	59,5	50,0-69,0	64,0	49,9-78,0	55,2	42,7-67,8
25 a 34	42,7	35,2-50,2	44,9	33,3-56,6	40,7	31,1-50,3
35 a 44	51,4	45,4-57,4	50,0	40,2-59,7	52,7	45,4-60,0
45 a 54	54,6	48,5-60,8	53,8	44,0-63,7	55,3	47,7-63,0
55 a 64	53,3	45,9-60,6	53,1	41,4-64,8	53,4	44,1-62,6
65 e mais	54,3	47,4-61,3	48,0	36,0-60,0	59,6	51,9-67,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	49,6	44,3-55,0	49,1	40,7-57,4	50,1	43,3-57,0
9 a 11	55,9	51,5-60,3	57,8	51,3-64,2	54,3	48,4-60,1
12 e mais	52,8	48,0-57,6	56,5	48,6-64,5	49,6	43,8-55,3
Total	51,8	48,3-55,2	52,4	47,1-57,8	51,1	46,8-55,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	30,7	21,9-39,5	29,0	15,9-42,1	32,3	20,6-44,1
25 a 34	32,9	25,7-40,0	32,8	22,3-43,2	32,9	23,1-42,8
35 a 44	23,9	18,6-29,3	25,1	16,0-34,2	22,9	16,7-29,1
45 a 54	17,6	13,0-22,2	20,4	12,7-28,1	15,1	9,8-20,3
55 a 64	11,5	7,2-15,9	14,6	7,1-22,1	8,8	4,0-13,6
65 e mais	6,9	3,3-10,6	7,5	0,9-14,1	6,5	2,7-10,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,5	17,7-27,4	21,8	14,6-29,0	23,2	16,9-29,6
9 a 11	30,6	26,5-34,7	31,9	26,0-37,9	29,5	23,9-35,1
12 e mais	21,6	17,4-25,7	26,9	19,8-34,1	16,8	12,4-21,3
Total	24,5	21,4-27,5	25,2	20,5-29,8	23,8	19,8-27,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,2	13,1-27,4	27,7	15,2-40,2	13,0	6,3-19,7
25 a 34	20,3	13,6-27,1	16,2	7,7-24,6	24,2	14,2-34,2
35 a 44	15,5	11,6-19,5	13,8	8,1-19,5	17,0	11,6-22,4
45 a 54	16,7	12,1-21,2	17,1	9,9-24,4	16,3	10,6-21,9
55 a 64	10,8	6,4-15,2	7,8	2,0-13,6	13,5	7,0-19,9
65 e mais	22,8	16,5-29,1	26,6	15,5-37,7	19,7	12,8-26,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,6	12,4-20,7	14,7	8,5-20,8	18,3	12,7-23,9
9 a 11	18,7	15,3-22,0	22,8	17,3-28,3	15,1	11,0-19,1
12 e mais	22,7	18,6-26,7	25,1	18,3-31,9	20,5	15,8-25,3
Total	18,1	15,4-20,7	18,4	14,3-22,4	17,8	14,3-21,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	44,8	35,1-54,5	56,5	42,3-70,8	33,5	21,9-45,1
25 a 34	47,4	39,7-55,2	57,4	45,7-69,1	38,2	28,6-47,8
35 a 44	48,8	42,8-54,8	57,5	47,9-67,0	41,1	33,9-48,3
45 a 54	46,7	40,4-53,0	59,4	49,9-69,0	35,3	27,9-42,8
55 a 64	26,5	20,1-33,0	40,7	29,4-52,1	13,9	8,2-19,6
65 e mais	15,2	9,5-20,8	26,2	15,1-37,2	6,1	2,4-9,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	43,4	38,0-48,8	57,5	49,4-65,6	30,3	24,0-36,5
9 a 11	47,3	42,9-51,6	55,5	49,0-62,1	40,0	34,2-45,9
12 e mais	34,1	29,4-38,7	38,0	30,2-45,8	30,6	25,3-35,9
Total	42,9	39,5-46,3	53,9	48,7-59,2	32,9	28,9-36,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,6	7,0-22,1	17,5	5,0-30,0	11,7	3,3-20,2
25 a 34	15,3	9,0-21,6	18,5	8,1-28,9	12,4	5,2-19,6
35 a 44	15,2	10,2-20,1	19,8	11,1-28,5	11,1	6,1-16,2
45 a 54	11,9	7,6-16,2	16,8	8,8-24,9	7,5	4,0-11,0
55 a 64	10,0	5,1-14,8	17,9	8,5-27,2	2,9	0,1-5,8
65 e mais	1,4	0,0-3,2	2,4	0,0-6,1	0,5	0,0-1,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,8	11,5-20,2	21,7	14,3-29,0	10,3	5,7-15,0
9 a 11	11,1	8,5-13,7	13,1	9,0-17,1	9,4	6,0-12,8
12 e mais	6,8	4,2-9,5	6,8	2,4-11,2	6,9	3,8-10,0
Total	13,2	10,5-15,8	17,1	12,6-21,7	9,5	6,6-12,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	30,9	22,0-39,8	13,8	4,3-23,3	47,3	34,7-59,8
25 a 34	42,7	35,1-50,3	15,7	7,9-23,5	67,7	58,5-76,8
35 a 44	47,2	41,2-53,2	20,4	11,6-29,2	71,0	64,5-77,4
45 a 54	39,2	33,3-45,1	11,8	6,4-17,2	63,6	56,2-70,9
55 a 64	37,6	30,7-44,5	15,4	7,7-23,0	57,4	48,2-66,5
65 e mais	27,0	21,5-32,6	11,8	5,1-18,4	39,6	32,0-47,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,3	36,0-46,5	14,9	9,1-20,7	65,9	59,5-72,2
9 a 11	41,5	37,3-45,7	16,9	12,5-21,3	63,0	57,0-68,9
12 e mais	27,2	23,0-31,4	15,3	9,5-21,1	37,6	32,0-43,2
Total	39,1	35,8-42,3	15,5	11,7-19,2	60,5	56,3-64,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,0	14,3-31,7	26,9	12,8-41,1	19,2	9,2-29,2
25 a 34	22,3	15,6-28,9	34,2	22,9-45,5	11,2	4,8-17,6
35 a 44	16,8	12,3-21,3	29,9	21,2-38,5	5,2	2,2-8,3
45 a 54	11,7	7,6-15,8	19,8	12,0-27,7	4,4	1,6-7,3
55 a 64	8,1	4,0-12,3	9,6	2,8-16,3	6,9	2,0-11,8
65 e mais	4,6	1,5-7,7	10,0	3,3-16,8	0,1	0,0-0,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,2	11,6-20,8	24,1	16,3-31,9	8,8	4,2-13,5
9 a 11	18,5	15,1-21,9	27,8	22,0-33,7	10,3	6,7-13,9
12 e mais	18,6	14,5-22,7	29,0	21,6-36,4	9,5	5,9-13,1
Total	17,2	14,3-20,0	25,8	20,9-30,8	9,3	6,4-12,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,0-0,7	0,5	0,0-1,4	0,0	0,0-0,0
25 a 34	4,6	0,9-8,4	8,8	1,3-16,4	0,7	0,0-1,6
35 a 44	2,3	0,5-4,2	5,0	1,1-8,9	0,0	0,0-0,0
45 a 54	1,5	0,3-2,7	3,2	0,6-5,7	0,0	0,0-0,0
55 a 64	1,0	0,0-2,9	0,0	0,0-0,0	1,9	0,0-5,5
65 e mais	0,2	0,0-0,5	0,3	0,0-1,0	0,1	0,1-0,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,8	0,1-3,5	3,4	0,0-6,8	0,3	0,0-0,8
9 a 11	1,9	0,8-3,1	4,1	1,7-6,6	0,0	0,0-0,0
12 e mais	3,4	1,3-5,6	6,0	1,8-10,2	1,2	0,0-2,6
Total	2,1	1,0-3,2	4,0	1,7-6,2	0,4	0,0-0,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,2	0,0-6,8	1,1	0,0-2,6	5,2	0,0-12,0
25 a 34	0,9	0,0-1,7	1,3	0,0-3,0	0,4	0,0-1,0
35 a 44	2,5	0,7-4,4	2,1	0,0-5,0	3,0	0,7-5,2
45 a 54	4,0	1,4-6,7	4,0	0,0-8,6	4,0	1,1-6,9
55 a 64	7,1	3,4-10,8	2,1	0,0-5,0	11,6	5,3-17,8
65 e mais	8,7	4,3-13,0	9,6	2,0-17,2	7,9	3,1-12,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,3	2,6-6,1	2,8	0,9-4,6	5,8	2,9-8,8
9 a 11	2,2	1,2-3,3	2,3	0,5-4,1	2,2	1,0-3,3
12 e mais	1,3	0,1-2,4	1,7	0,0-4,0	0,9	0,0-1,8
Total	3,3	2,2-4,4	2,5	1,2-3,7	4,0	2,3-5,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	91,5	86,8-96,1	76,2	68,4-83,9
60 a 69	87,9	81,6-94,3	63,9	54,6-73,3
Anos de escolaridade				
0 a 8	88,8	84,1-93,5	67,5	60,1-74,9
9 a 11	94,1	87,8-100,0	84,0	75,2-92,7
12 e mais	95,1	89,8-100,0	86,4	78,1-94,6
Total	90,1	86,3-93,8	71,3	65,3-77,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	84,3	75,8-92,7	80,5	71,5-89,4
35 a 44	91,5	86,6-96,4	87,5	81,8-93,2
45 a 54	92,4	88,3-96,5	87,8	82,5-93,2
55 a 59	98,5	95,6-100,0	88,6	79,9-97,3
Anos de escolaridade				
0 a 8	88,0	81,7-94,2	82,4	75,5-89,2
9 a 11	90,2	85,8-94,5	87,2	82,5-91,9
12 e mais	92,7	88,7-96,7	89,8	85,5-94,2
Total	89,4	85,6-93,2	85,0	80,8-89,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,8	18,3-33,3	13,0	3,1-22,9	38,1	26,9-49,3
25 a 34	31,1	24,6-37,7	20,4	12,1-28,7	41,1	31,4-50,7
35 a 44	39,3	33,5-45,0	24,1	15,3-32,8	52,7	45,4-60,0
45 a 54	31,2	25,7-36,7	20,7	13,3-28,1	40,6	33,1-48,2
55 a 64	26,8	20,4-33,1	18,4	9,0-27,9	34,2	25,7-42,7
65 e mais	19,0	14,0-24,0	7,1	1,7-12,4	28,8	21,5-36,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,1	18,8-27,4	15,6	9,6-21,6	30,1	24,1-36,2
9 a 11	35,3	31,1-39,4	16,1	11,8-20,5	52,0	46,1-57,8
12 e mais	49,9	45,0-54,7	33,3	25,8-40,9	64,4	58,8-70,0
Total	30,5	27,7-33,4	18,5	14,6-22,4	41,5	37,4-45,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,7	1,9-13,6	8,4	0,0-18,4	7,1	0,8-13,4
25 a 34	14,0	8,7-19,2	14,0	6,6-21,5	13,9	6,6-21,2
35 a 44	18,1	13,6-22,7	21,1	13,6-28,7	15,5	10,2-20,8
45 a 54	39,5	33,3-45,8	42,5	32,5-52,6	36,8	29,3-44,4
55 a 64	58,1	50,8-65,3	52,5	40,9-64,1	63,0	54,2-71,8
65 e mais	57,3	50,2-64,3	42,7	31,0-54,4	69,3	61,8-76,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,6	25,3-33,9	27,2	20,6-33,8	31,8	26,3-37,4
9 a 11	15,7	13,0-18,5	15,5	11,4-19,6	16,0	12,2-19,8
12 e mais	18,1	14,3-21,8	23,5	16,7-30,3	13,3	9,7-16,9
Total	24,2	21,5-26,8	23,7	19,5-27,8	24,6	21,3-27,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,3	0,0-0,8	0,5	0,0-1,6	0,0	0,0-0,0
25 a 34	2,2	0,3-4,0	0,7	0,0-2,1	3,5	0,2-6,8
35 a 44	4,5	2,1-6,9	4,4	0,4-8,5	4,5	1,7-7,4
45 a 54	10,2	6,1-14,2	8,7	2,9-14,6	11,5	5,8-17,1
55 a 64	18,6	12,9-24,4	16,6	8,3-24,8	20,4	12,5-28,4
65 e mais	18,8	13,4-24,3	15,2	6,8-23,6	21,9	14,9-28,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,8	5,9-9,7	5,6	3,0-8,2	9,9	7,0-12,7
9 a 11	3,6	2,3-5,0	4,0	1,8-6,3	3,3	1,6-5,0
12 e mais	3,6	2,0-5,2	4,3	1,7-6,9	3,0	1,2-4,8
Total	6,1	4,9-7,2	5,0	3,3-6,7	7,0	5,3-8,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,4	0,0-1,1	0,9	0,0-2,2	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,3	0,0-0,8	0,3	0,0-0,8	0,4	0,0-1,2
35 a 44	1,5	0,3-2,8	1,2	0,0-3,0	1,9	0,2-3,5
45 a 54	3,6	0,5-6,7	5,3	0,0-10,9	2,2	0,0-5,2
55 a 64	6,9	3,5-10,3	6,5	1,6-11,3	7,3	2,5-12,1
65 e mais	5,6	2,7-8,6	5,7	0,7-10,8	5,6	2,1-9,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,3	1,3-3,3	1,8	0,2-3,4	2,7	1,4-4,0
9 a 11	1,5	0,7-2,4	2,5	0,9-4,1	0,7	0,1-1,4
12 e mais	2,0	0,5-3,5	3,4	0,5-6,2	0,9	0,0-2,1
Total	2,1	1,4-2,7	2,2	1,1-3,3	1,9	1,1-2,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,7	0,0-7,8	5,1	0,0-13,3	2,3	0,3-4,3
25 a 34	5,4	2,7-8,1	4,7	0,6-8,8	6,1	2,5-9,7
35 a 44	16,4	12,3-20,4	16,8	10,3-23,4	15,9	10,9-21,0
45 a 54	23,8	18,7-29,0	24,7	16,5-33,0	23,0	16,7-29,3
55 a 64	34,6	27,6-41,7	32,7	21,7-43,8	36,3	27,4-45,3
65 e mais	34,0	27,5-40,6	26,1	15,2-36,9	40,6	32,8-48,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,7	12,7-18,7	15,1	10,1-20,1	16,3	12,7-19,9
9 a 11	10,8	8,5-13,1	9,3	6,1-12,5	12,2	8,9-15,4
12 e mais	17,4	13,9-21,0	18,5	12,5-24,5	16,4	12,3-20,6
Total	14,7	12,8-16,7	14,2	11,0-17,3	15,2	12,9-17,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,0-0,5	0,0	0,0-0,0	0,4	0,0-1,1
25 a 34	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
35 a 44	0,6	0,0-1,3	0,0	0,0-0,0	1,2	0,0-2,4
45 a 54	4,6	2,2-7,0	3,2	0,0-6,7	5,9	2,6-9,2
55 a 64	10,6	6,5-14,8	0,0	0,0-0,0	20,1	12,7-27,5
65 e mais	17,9	12,8-22,9	4,7	0,0-10,6	28,8	21,5-36,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,2	3,1-5,3	1,0	0,0-2,1	7,2	5,2-9,2
9 a 11	1,3	0,7-2,0	0,0	0,0-0,0	2,5	1,3-3,8
12 e mais	1,7	0,7-2,6	1,1	0,0-2,6	2,1	0,8-3,5
Total	3,1	2,4-3,7	0,8	0,1-1,4	5,1	4,0-6,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,8	2,3-9,2	4,5	1,0-8,1	7,0	1,2-12,8
25 a 34	1,5	0,3-2,6	1,0	0,0-2,4	2,0	0,2-3,8
35 a 44	2,9	1,2-4,6	0,3	0,0-0,9	5,1	2,1-8,2
45 a 54	3,0	0,4-5,7	2,8	0,0-7,1	3,2	0,0-6,4
55 a 64	4,4	1,8-7,1	1,2	0,0-2,7	7,3	2,7-12,0
65 e mais	6,0	2,9-9,0	4,0	0,0-8,3	7,6	3,3-11,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,0	1,6-4,4	1,1	0,0-2,3	4,8	2,3-7,3
9 a 11	4,6	2,7-6,6	4,6	1,6-7,6	4,6	2,0-7,3
12 e mais	3,6	1,8-5,3	1,7	0,0-4,0	5,2	2,5-7,8
Total	3,5	2,5-4,5	2,1	1,0-3,2	4,8	3,2-6,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	42,6	33,3-52,0	36,9	22,7-51,1	48,3	35,9-60,6
25 a 34	41,3	33,9-48,6	37,7	26,6-48,8	44,6	34,9-54,3
35 a 44	45,6	39,7-51,5	45,6	35,9-55,2	45,6	38,4-52,8
45 a 54	40,0	34,1-45,9	40,0	30,6-49,5	40,1	32,7-47,4
55 a 64	53,1	45,7-60,5	50,8	39,0-62,5	55,1	45,8-64,4
65 e mais	54,3	47,3-61,4	53,6	41,4-65,9	54,9	46,9-62,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,2	29,2-39,1	34,1	26,2-42,0	34,3	28,2-40,4
9 a 11	47,9	43,6-52,3	39,6	33,3-45,8	55,2	49,4-61,1
12 e mais	74,9	70,7-79,2	74,1	67,2-81,0	75,6	70,4-80,8
Total	44,3	41,0-47,6	41,8	36,6-47,0	46,6	42,4-50,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	71,7	61,5-81,8
26 a 30	69,5	56,8-82,3
31 a 35	85,7	77,2-94,2
36 a 40	68,6	58,7-78,5
41 a 45	60,7	49,7-71,7
46 a 50	57,5	46,2-68,9
Anos de escolaridade		
0 a 8	71,5	63,1-79,9
9 a 11	70,0	63,8-76,1
12 e mais	68,4	62,4-74,4
Total	62,5	56,3-68,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,7	5,9-17,4	5,6	0,0-12,4	17,5	8,5-26,6
25 a 34	18,4	12,3-24,5	12,6	4,9-20,3	23,8	14,8-32,8
35 a 44	18,2	13,4-23,1	13,7	5,5-21,8	22,3	16,7-27,9
45 a 54	18,0	13,3-22,7	12,7	5,8-19,7	22,8	16,4-29,1
55 a 64	17,3	11,9-22,7	8,5	2,6-14,5	25,1	16,9-33,4
65 e mais	19,4	14,4-24,5	11,8	4,8-18,8	25,8	18,9-32,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,4	13,5-21,3	11,8	6,5-17,1	22,6	17,0-28,2
9 a 11	13,2	10,3-16,1	7,4	4,0-10,7	18,3	13,7-22,8
12 e mais	20,8	17,0-24,6	13,2	7,6-18,7	27,4	22,3-32,6
Total	16,9	14,4-19,3	10,9	7,6-14,3	22,3	18,7-25,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	87,7	75,0-100,0	67,8	18,7-100,0	93,9	86,5-100,0
25 a 34	79,9	66,1-93,7	83,9	59,1-100,0	77,9	61,3-94,6
35 a 44	77,3	60,3-94,2	49,7	16,6-82,9	92,4	85,9-98,8
45 a 54	90,3	82,3-98,2	94,4	83,6-100,0	88,2	77,7-98,6
55 a 64	94,5	88,4-100,0	84,6	61,1-100,0	97,5	94,6-100,0
65 e mais	89,8	80,3-99,3	79,6	51,5-100,0	93,7	87,3-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	82,0	72,1-91,9	66,9	44,0-89,9	89,3	81,0-97,7
9 a 11	84,1	74,7-93,5	78,4	51,9-100,0	86,1	78,2-94,0
12 e mais	90,8	85,6-96,0	94,3	85,8-100,0	89,4	83,0-95,8
Total	84,2	77,8-90,5	74,1	58,3-89,9	88,7	83,3-94,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,8	0,8-10,7	8,0	0,0-17,2	3,7	0,1-7,5
25 a 34	15,5	8,8-22,1	21,6	9,6-33,7	9,9	4,4-15,4
35 a 44	18,5	13,3-23,7	22,2	13,5-30,9	15,1	9,4-20,8
45 a 54	18,1	12,9-23,3	18,7	10,5-26,8	17,6	11,1-24,1
55 a 64	16,7	11,1-22,4	20,9	11,4-30,4	12,8	6,6-18,9
65 e mais	5,3	1,5-9,2	6,7	0,0-13,5	4,2	0,0-8,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,8	12,1-21,6	21,4	13,2-29,6	12,2	7,8-16,6
9 a 11	10,6	8,1-13,2	13,0	9,0-17,0	8,7	5,4-12,0
12 e mais	9,9	7,3-12,6	10,7	6,3-15,1	9,3	6,1-12,5
Total	13,7	11,1-16,3	17,2	12,5-21,8	10,5	8,1-13,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,1	12,4-33,8	30,9	15,6-46,1	15,8	0,9-30,7
25 a 34	20,3	14,0-26,6	25,5	14,7-36,4	15,6	9,0-22,2
35 a 44	20,0	14,9-25,1	24,8	16,7-33,0	15,6	9,5-21,7
45 a 54	30,1	24,0-36,2	38,5	28,5-48,6	22,2	15,7-28,7
55 a 64	36,8	29,5-44,0	49,3	37,6-60,9	25,0	17,0-33,0
65 e mais	40,6	31,9-49,2	57,6	44,5-70,7	26,4	16,4-36,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	33,9	27,7-40,0	43,7	34,5-52,9	24,0	15,9-32,1
9 a 11	15,8	12,8-18,8	19,0	14,2-23,8	13,3	9,5-17,1
12 e mais	13,2	10,5-15,8	17,2	12,6-21,9	9,7	6,9-12,6
Total	24,6	21,2-28,1	32,0	26,6-37,4	17,9	13,6-22,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,5	0,0-7,0	5,2	0,0-14,2	0,1	0,0-0,2
25 a 34	4,4	0,0-9,4	8,2	0,0-18,4	1,0	0,0-2,1
35 a 44	6,3	2,8-9,9	8,3	2,1-14,6	4,5	0,8-8,1
45 a 54	9,1	4,8-13,4	12,9	5,2-20,7	5,6	1,7-9,4
55 a 64	5,3	1,8-8,8	9,6	2,7-16,5	1,3	0,0-2,9
65 e mais	1,7	0,0-3,4	1,8	1,2-4,8	1,5	0,0-3,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,6	3,8-11,4	12,1	5,0-19,1	3,1	1,1-5,1
9 a 11	1,9	1,0-2,9	2,7	1,1-4,3	1,3	0,3-2,3
12 e mais	2,6	1,2-3,9	3,7	1,2-6,2	1,6	0,3-2,9
Total	4,9	2,9-6,9	7,9	3,9-11,8	2,2	1,2-3,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	38,0	29,3-46,8	38,8	25,7-51,9	37,3	25,6-49,1
25 a 34	47,8	40,4-55,3	52,7	40,6-64,9	43,4	34,6-52,2
35 a 44	35,0	29,2-40,7	38,8	29,6-48,0	31,5	24,4-38,5
45 a 54	29,9	23,9-35,9	25,9	16,7-35,0	33,6	25,7-41,5
55 a 64	28,1	21,1-35,1	32,2	20,9-43,5	24,2	15,9-32,5
65 e mais	22,4	15,3-29,5	19,4	9,0-29,8	24,8	15,2-34,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	35,7	29,9-41,6	39,7	30,7-48,8	31,6	24,5-38,7
9 a 11	43,5	39,0-47,9	43,3	36,7-49,8	43,6	37,6-49,6
12 e mais	29,7	25,8-33,5	29,4	23,4-35,4	29,9	24,9-34,9
Total	37,2	33,8-40,6	39,2	33,8-44,6	35,5	31,2-39,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	30,7	21,8-39,7	31,0	16,9-45,1	30,4	20,0-40,7
25 a 34	46,2	38,6-53,8	48,1	35,7-60,4	44,4	35,2-53,7
35 a 44	55,3	49,2-61,5	65,9	56,7-75,0	45,0	37,1-52,9
45 a 54	59,8	53,4-66,3	66,2	56,6-75,7	53,2	44,6-61,8
55 a 64	61,6	53,6-69,5	57,7	45,9-69,5	66,0	56,0-76,1
65 e mais	56,8	47,6-66,1	51,5	37,5-65,4	63,2	51,8-74,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	54,2	47,8-60,6	50,6	41,2-60,1	58,8	50,8-66,7
9 a 11	41,9	37,4-46,3	49,0	42,4-55,6	35,7	29,9-41,6
12 e mais	45,5	41,3-49,7	59,3	52,9-65,8	33,8	28,8-38,9
Total	48,4	44,9-51,9	51,5	46,0-57,1	45,2	41,0-49,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,0	1,0-5,0	2,9	0,2-5,5	3,1	0,0-6,2
25 a 34	14,9	9,4-20,3	14,9	7,0-22,9	14,8	7,3-22,3
35 a 44	16,9	12,5-21,3	18,6	11,8-25,3	15,3	9,5-21,0
45 a 54	21,1	15,3-26,8	22,8	14,1-31,4	19,3	11,8-26,7
55 a 64	21,6	15,5-27,8	20,4	11,2-29,5	23,1	15,1-31,2
65 e mais	16,3	8,9-23,8	18,6	7,0-30,2	13,6	5,1-22,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,4	12,3-20,6	12,7	7,5-18,0	21,2	14,8-27,6
9 a 11	12,6	10,0-15,3	17,5	12,9-22,1	8,4	5,5-11,3
12 e mais	11,0	8,5-13,5	15,5	10,9-20,1	7,1	4,7-9,6
Total	14,1	11,9-16,4	14,7	11,4-17,9	13,6	10,6-16,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,0	15,4-30,6	20,7	9,5-32,0	25,2	14,8-35,5
25 a 34	25,3	19,3-31,3	16,8	8,2-25,5	33,1	25,0-41,1
35 a 44	28,7	23,4-33,9	18,0	11,3-24,7	38,3	30,7-45,9
45 a 54	31,9	26,3-37,5	24,6	16,8-32,4	38,7	31,0-46,5
55 a 64	34,0	27,1-40,8	29,7	19,4-40,0	38,0	28,9-47,1
65 e mais	32,4	24,7-40,0	17,5	9,0-26,1	44,7	33,8-55,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,2	17,4-27,1	15,8	8,9-22,8	28,7	21,8-35,6
9 a 11	28,4	24,5-32,4	19,8	15,0-24,7	35,4	29,7-41,2
12 e mais	41,8	37,8-45,9	35,3	29,1-41,4	47,4	42,1-52,7
Total	27,5	24,5-30,4	20,1	16,0-24,3	34,2	30,1-38,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,7	7,6-19,9	9,8	0,5-19,1	17,4	9,1-25,7
25 a 34	14,9	10,2-19,5	9,9	4,0-15,7	19,4	12,6-26,1
35 a 44	19,2	14,6-23,8	13,2	7,1-19,4	24,6	18,0-31,2
45 a 54	21,4	16,6-26,1	16,6	9,9-23,3	25,7	19,0-32,5
55 a 64	23,4	17,3-29,5	16,2	8,1-24,3	30,1	21,4-38,9
65 e mais	15,0	9,5-20,4	8,4	2,0-14,7	20,4	12,2-28,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,3	9,5-17,2	8,7	3,3-14,2	18,0	12,5-23,4
9 a 11	18,3	14,9-21,7	12,5	8,6-16,4	23,1	17,9-28,2
12 e mais	26,3	22,7-29,9	21,7	16,3-27,1	30,1	25,3-34,9
Total	17,1	14,7-19,4	11,9	8,6-15,2	21,8	18,4-25,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	45,3	35,6-55,0	59,0	45,4-72,6	32,4	21,0-43,9
25 a 34	50,8	43,4-58,3	58,5	46,1-70,8	43,9	35,0-52,9
35 a 44	46,0	39,9-52,0	56,0	46,8-65,1	36,9	29,3-44,5
45 a 54	43,8	37,4-50,2	46,7	36,7-56,6	41,0	32,9-49,2
55 a 64	35,9	28,5-43,3	47,4	35,7-59,1	25,0	16,6-33,5
65 e mais	26,6	18,7-34,4	37,2	23,9-50,5	17,7	9,3-26,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	48,5	42,2-54,7	57,1	48,0-66,3	39,7	31,8-47,6
9 a 11	43,5	39,1-47,9	54,6	48,1-61,1	34,5	28,8-40,2
12 e mais	37,0	32,9-41,0	44,9	38,4-51,4	30,3	25,3-35,2
Total	45,0	41,4-48,5	54,4	49,0-59,9	36,3	31,9-40,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	53,9	43,8-64,0	63,4	49,0-77,8	44,9	32,0-57,8
25 a 34	60,8	53,4-68,3	61,4	49,1-73,8	60,3	51,5-69,1
35 a 44	60,4	54,7-66,2	65,9	57,4-74,5	55,5	47,8-63,2
45 a 54	57,6	51,2-64,0	54,3	44,3-64,3	60,6	52,6-68,7
55 a 64	59,1	51,8-66,3	60,9	49,7-72,1	57,4	48,0-66,7
65 e mais	60,7	52,4-68,9	64,5	51,8-77,1	57,5	46,8-68,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	57,7	51,3-64,1	62,1	52,8-71,5	53,2	44,7-61,7
9 a 11	63,2	58,9-67,5	65,5	59,3-71,7	61,3	55,5-67,2
12 e mais	51,7	47,5-55,8	55,1	48,6-61,5	48,8	43,4-54,1
Total	58,5	54,8-62,1	62,0	56,6-67,5	55,2	50,5-60,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	41,1	31,1-51,1	47,7	33,4-61,9	34,9	20,9-48,8
25 a 34	35,8	28,7-43,0	38,2	26,4-50,0	33,7	25,1-42,3
35 a 44	25,5	20,3-30,7	30,0	21,6-38,5	21,4	15,3-27,5
45 a 54	20,3	14,7-26,0	25,9	16,7-35,2	15,1	8,7-21,6
55 a 64	13,6	8,1-19,2	23,5	13,3-33,7	4,3	0,7-7,9
65 e mais	13,9	7,5-20,4	17,0	6,5-27,5	11,4	3,4-19,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	27,8	21,4-34,1	34,7	25,4-44,0	20,7	12,3-29,2
9 a 11	34,6	30,3-38,9	35,4	29,1-41,7	34,0	28,1-39,8
12 e mais	26,5	22,8-30,2	33,6	27,4-39,8	20,5	16,1-24,9
Total	29,8	26,2-33,3	34,7	29,3-40,2	25,2	20,7-29,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,1	14,1-30,0	38,1	24,1-52,0	7,0	3,3-10,7
25 a 34	11,1	7,2-15,1	13,3	6,4-20,3	9,2	5,1-13,2
35 a 44	17,5	13,1-21,8	19,9	12,7-27,1	15,3	10,2-20,4
45 a 54	12,5	8,3-16,7	15,2	8,1-22,3	10,0	5,4-14,7
55 a 64	14,2	9,0-19,5	18,6	9,4-27,8	10,1	5,0-15,2
65 e mais	12,4	6,9-17,8	14,9	5,9-23,9	10,3	3,7-16,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,1	7,7-16,4	15,9	8,1-23,7	8,2	5,1-11,4
9 a 11	18,0	14,6-21,4	29,1	23,1-35,2	9,0	5,8-12,1
12 e mais	22,2	18,7-25,7	26,4	20,5-32,2	18,8	14,6-22,9
Total	15,7	13,1-18,2	21,6	16,9-26,2	10,3	8,2-12,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	41,3	31,6-51,0	51,4	37,4-65,4	31,8	20,8-42,9
25 a 34	46,3	39,0-53,7	49,4	37,2-61,5	43,6	34,8-52,4
35 a 44	53,3	47,4-59,3	64,1	55,4-72,7	43,6	35,8-51,5
45 a 54	37,6	31,4-43,8	39,1	29,5-48,8	36,2	28,3-44,0
55 a 64	34,6	27,4-41,9	50,7	39,0-62,3	19,5	11,8-27,1
65 e mais	15,9	9,5-22,3	30,6	18,3-42,9	3,7	0,0-7,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,0	37,9-50,2	54,8	45,6-64,0	33,2	25,8-40,6
9 a 11	45,1	40,7-49,5	49,8	43,2-56,3	41,3	35,4-47,2
12 e mais	35,0	31,0-38,9	39,1	32,8-45,5	31,4	26,5-36,4
Total	42,9	39,4-46,4	50,8	45,3-56,2	35,7	31,4-39,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,8	3,2-12,4	8,7	2,0-15,3	7,0	0,7-13,3
25 a 34	9,2	4,9-13,5	6,7	0,5-12,9	11,5	5,6-17,4
35 a 44	18,2	13,0-23,5	22,0	13,3-30,7	14,9	8,7-21,0
45 a 54	9,4	5,0-13,8	14,2	6,2-22,3	4,9	1,5-8,3
55 a 64	9,9	5,2-14,6	14,8	6,4-23,2	5,2	0,8-9,6
65 e mais	4,2	0,4-8,0	9,1	0,9-17,3	0,1	0,0-0,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,4	9,6-17,3	15,4	9,5-21,3	11,4	6,4-16,4
9 a 11	9,2	6,7-11,7	10,3	6,3-14,4	8,3	5,1-11,5
12 e mais	5,0	3,1-6,9	5,7	2,3-9,0	4,4	2,3-6,4
Total	10,7	8,5-12,8	12,3	8,9-15,8	9,2	6,5-11,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	34,0	24,0-44,0	21,4	8,4-34,5	45,9	31,9-59,9
25 a 34	37,0	30,1-43,8	12,6	4,3-21,0	59,0	50,1-67,8
35 a 44	39,6	33,8-45,4	15,5	8,5-22,5	61,5	54,0-69,0
45 a 54	38,5	32,4-44,6	13,2	6,8-19,7	62,0	54,0-70,0
55 a 64	34,5	27,7-41,2	12,8	5,5-20,2	54,8	45,3-64,4
65 e mais	24,9	17,8-32,0	18,2	7,7-28,6	30,5	20,9-40,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,1	34,0-46,2	18,2	10,5-25,9	62,3	54,2-70,4
9 a 11	36,8	32,7-41,0	13,9	9,5-18,4	55,5	49,4-61,5
12 e mais	22,6	19,3-25,9	11,3	7,4-15,2	32,2	27,3-37,1
Total	36,2	32,7-39,6	15,8	11,4-20,2	54,8	50,2-59,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,0	7,7-20,3	22,4	10,7-34,1	6,0	2,3-9,7
25 a 34	34,6	26,7-42,5	52,6	40,6-64,6	18,3	10,1-26,4
35 a 44	23,5	18,4-28,6	37,0	28,2-45,8	11,3	6,4-16,2
45 a 54	12,6	8,7-16,4	19,5	12,4-26,5	6,1	2,8-9,5
55 a 64	7,5	3,7-11,3	10,9	4,3-17,6	4,3	0,6-7,9
65 e mais	4,6	1,0-8,1	6,5	0,0-13,2	2,9	0,0-6,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,6	15,0-26,3	30,7	21,4-40,0	10,4	5,4-15,5
9 a 11	20,4	16,9-24,0	34,3	28,2-40,5	9,1	5,6-12,6
12 e mais	19,8	16,4-23,3	29,2	23,2-35,2	11,8	8,2-15,5
Total	20,4	17,3-23,6	31,6	26,2-37,0	10,2	7,4-13,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,1	0,0-2,1	2,2	0,1-4,3	0,0	0,0-0,0
25 a 34	3,0	0,9-5,0	5,8	1,6-10,1	0,3	0,0-1,0
35 a 44	2,5	0,9-4,1	5,0	1,7-8,3	0,3	0,0-0,6
45 a 54	1,9	0,5-3,3	2,9	0,6-5,1	1,0	0,0-2,7
55 a 64	1,7	0,0-3,5	3,5	0,0-7,1	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,3	0,0-0,9	0,2	0,0-0,5	0,5	0,0-1,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,9	0,0-1,9	1,5	0,0-3,5	0,2	0,0-0,7
9 a 11	3,1	1,7-4,5	6,2	3,2-9,2	0,5	0,0-1,2
12 e mais	3,4	1,8-5,0	7,2	3,8-10,7	0,1	0,0-0,4
Total	2,0	1,3-2,8	3,9	2,4-5,4	0,3	0,0-0,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,5	0,8-4,2	3,2	0,3-6,1	1,8	0,0-3,6
25 a 34	4,2	1,0-7,4	3,4	0,0-8,6	4,9	0,9-8,9
35 a 44	5,8	2,5-9,2	3,1	0,0-7,3	8,3	3,2-13,3
45 a 54	6,5	3,1-9,9	6,9	1,6-12,2	6,2	1,9-10,5
55 a 64	7,3	3,6-11,0	6,6	0,7-12,4	8,0	3,5-12,6
65 e mais	9,0	4,0-14,0	4,6	0,0-9,9	12,6	4,8-20,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,0	4,5-9,5	5,4	1,9-8,9	8,6	5,1-12,1
9 a 11	3,1	1,5-4,7	3,0	0,6-5,4	3,1	1,0-5,2
12 e mais	2,5	1,2-3,7	1,6	0,1-3,0	3,2	1,3-5,2
Total	5,0	3,6-6,3	4,1	2,0-6,1	5,8	3,9-7,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	84,0	77,0-91,1	72,3	64,0-80,6
60 a 69	88,1	80,1-96,0	70,6	60,3-80,9
Anos de escolaridade				
0 a 8	82,8	75,7-89,9	67,2	58,8-75,7
9 a 11	89,2	81,3-97,1	79,5	69,2-89,8
12 e mais	97,0	92,9-100,0	90,1	82,9-97,3
Total	85,4	80,0-90,8	71,7	65,2-78,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	84,6	77,6-91,7	76,8	68,9-84,7
35 a 44	91,2	86,2-96,1	81,6	75,3-87,9
45 a 54	96,1	92,9-99,3	86,4	80,7-92,2
55 a 59	95,8	90,1-100,0	82,7	71,2-94,2
Anos de escolaridade				
0 a 8	89,0	83,0-95,0	76,8	68,9-84,7
9 a 11	89,1	84,1-94,0	81,6	75,3-87,9
12 e mais	93,0	89,6-96,4	86,4	80,7-92,2
Total	89,8	86,4-93,2	82,7	71,2-94,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,4	24,4-42,5	20,9	9,0-32,8	45,2	31,8-58,7
25 a 34	36,4	29,8-43,1	21,5	13,1-29,8	50,0	41,1-58,8
35 a 44	32,4	27,2-37,7	14,8	9,3-20,4	48,4	40,6-56,1
45 a 54	31,3	25,7-36,8	14,6	8,0-21,2	46,8	38,7-54,9
55 a 64	23,3	17,4-29,3	10,8	3,8-17,9	35,1	26,2-44,0
65 e mais	12,8	8,0-17,7	4,8	0,0-9,6	19,5	11,9-27,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,5	16,2-26,8	10,8	4,2-17,4	32,3	24,4-40,2
9 a 11	39,1	34,7-43,4	21,4	16,2-26,6	53,4	47,5-59,4
12 e mais	49,6	45,4-53,7	31,1	25,0-37,2	65,3	60,1-70,4
Total	31,8	28,6-35,0	17,2	13,2-21,2	45,2	40,6-49,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,3	2,1-10,4	4,9	1,3-8,5	7,6	0,4-14,7
25 a 34	11,1	6,6-15,6	8,9	2,4-15,4	13,1	6,9-19,4
35 a 44	23,3	18,4-28,3	21,6	14,3-28,9	24,9	18,3-31,5
45 a 54	35,6	29,5-41,7	31,2	22,1-40,3	39,7	31,6-47,8
55 a 64	56,9	49,4-64,4	55,0	43,3-66,6	58,7	49,2-68,2
65 e mais	61,0	52,5-69,4	46,3	32,9-59,8	73,2	63,6-82,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	27,1	22,6-31,6	20,7	14,9-26,4	33,6	26,8-40,4
9 a 11	16,5	13,5-19,5	17,3	12,7-21,9	15,8	11,8-19,9
12 e mais	18,5	15,4-21,7	18,5	13,6-23,4	18,6	14,6-22,6
Total	22,3	19,8-24,7	19,3	15,9-22,7	25,0	21,5-28,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,4	0,0-1,1	0,0	0,0-0,0	0,7	0,0-2,2
25 a 34	1,3	0,0-2,6	0,6	0,0-1,8	1,9	0,0-4,1
35 a 44	1,7	0,6-2,9	2,3	0,1-4,5	1,2	0,2-2,2
45 a 54	10,7	6,4-15,1	11,7	4,7-18,7	9,8	4,5-15,0
55 a 64	16,0	10,7-21,4	19,1	10,3-27,9	13,1	6,8-19,4
65 e mais	11,8	6,9-16,8	9,9	2,7-17,0	13,5	6,7-20,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,0	3,3-6,6	4,7	2,3-7,1	5,3	3,0-7,5
9 a 11	3,2	1,9-4,6	4,3	2,1-6,5	2,4	0,8-4,0
12 e mais	3,4	1,9-4,8	2,8	0,7-4,9	3,9	1,9-5,8
Total	4,2	3,2-5,1	4,3	2,8-5,7	4,0	2,8-5,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,4	0,0-1,0	0,9	0,0-2,1	0,0	0,0-0,0
35 a 44	0,8	0,0-1,7	0,7	0,0-1,6	0,9	0,0-2,4
45 a 54	5,2	2,1-8,4	8,0	2,4-13,7	2,7	0,0-5,7
55 a 64	9,7	5,4-13,9	7,7	2,1-13,2	11,6	5,2-17,9
65 e mais	6,2	2,2-10,2	8,6	1,2-15,9	4,3	0,3-8,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,9	1,8-4,1	3,0	1,2-4,8	2,9	1,3-4,5
9 a 11	1,1	0,4-1,7	1,6	0,3-2,9	0,7	0,1-1,2
12 e mais	1,4	0,4-2,3	2,9	0,9-4,9	0,1	0,0-0,3
Total	2,1	1,4-2,7	2,5	1,5-3,6	1,7	0,9-2,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,0	0,5-3,5	2,2	0,0-4,5	1,8	0,0-3,7
25 a 34	5,9	2,6-9,2	5,5	0,1-11,1	6,3	2,5-10,1
35 a 44	12,5	8,9-16,1	10,8	5,9-15,8	14,1	8,9-19,2
45 a 54	26,0	20,2-31,8	21,6	13,4-29,9	30,1	22,2-37,9
55 a 64	29,5	22,9-36,1	26,9	16,8-37,1	31,9	23,3-40,5
65 e mais	27,9	20,3-35,5	18,6	8,0-29,3	35,5	25,1-46,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,7	10,6-16,7	10,3	6,2-14,5	17,0	12,6-21,5
9 a 11	9,8	7,5-12,2	9,2	5,5-12,8	10,4	7,3-13,4
12 e mais	12,2	9,6-14,9	13,2	8,9-17,5	11,5	8,2-14,7
Total	12,2	10,4-13,9	10,4	7,8-13,0	13,8	11,4-16,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,7	0,0-4,9	3,5	0,0-10,2	0,0	0,0-0,0
35 a 44	0,9	0,0-2,2	0,0	0,0-0,0	1,7	0,0-4,1
45 a 54	4,7	2,4-7,1	2,1	0,0-4,5	7,2	3,3-11,1
55 a 64	17,5	11,9-23,1	6,1	1,1-11,1	28,3	19,3-37,3
65 e mais	27,5	19,8-35,2	11,3	1,5-21,2	40,9	30,2-51,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,5	4,2-8,7	3,8	0,2-7,4	9,2	6,3-12,0
9 a 11	1,6	0,9-2,3	0,4	0,0-0,9	2,6	1,4-3,8
12 e mais	2,0	0,9-3,0	0,9	0,0-2,1	2,9	1,3-4,5
Total	4,2	3,0-5,3	2,3	0,3-4,3	5,9	4,4-7,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,8	1,0-4,6	2,5	0,2-4,9	3,1	0,2-5,9
25 a 34	2,0	0,4-3,6	0,4	0,0-1,0	3,5	0,5-6,5
35 a 44	5,0	2,2-7,9	1,7	0,0-3,8	8,0	3,0-13,0
45 a 54	4,0	1,5-6,5	2,9	0,0-6,0	5,1	1,3-8,9
55 a 64	0,9	0,0-2,5	1,6	0,0-4,8	0,3	0,0-0,9
65 e mais	3,2	0,1-6,2	4,5	0,0-10,7	2,1	0,0-4,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,3	1,7-4,9	1,2	0,1-2,3	5,3	2,3-8,3
9 a 11	3,2	1,7-4,8	3,0	0,8-5,3	3,4	1,3-5,5
12 e mais	2,6	1,3-3,8	1,9	0,0-3,7	3,1	1,4-4,9
Total	3,1	2,2-4,1	1,9	0,9-2,8	4,3	2,6-5,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	41,8	32,6-50,9	41,7	28,2-55,2	41,9	29,5-54,2
25 a 34	36,7	30,1-43,2	42,0	30,7-53,3	31,8	24,3-39,4
35 a 44	41,3	35,5-47,0	38,1	29,7-46,6	44,1	36,5-51,8
45 a 54	53,9	47,5-60,4	55,7	45,8-65,7	52,3	44,0-60,5
55 a 64	51,0	43,5-58,5	43,5	32,1-55,0	58,1	48,3-67,8
65 e mais	55,4	46,7-64,1	43,9	30,3-57,4	64,8	53,9-75,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	30,5	25,3-35,8	29,2	21,0-37,3	31,9	25,2-38,6
9 a 11	47,6	43,2-52,0	51,2	44,6-57,7	44,7	38,8-50,7
12 e mais	75,4	71,8-79,1	75,8	70,0-81,5	75,1	70,4-79,9
Total	43,4	40,0-46,8	43,2	38,0-48,4	43,6	39,2-48,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	50,9	37,7-64,0
26 a 30	80,2	68,1-92,3
31 a 35	65,4	52,2-78,6
36 a 40	70,5	59,9-81,0
41 a 45	67,5	55,0-79,9
46 a 50	48,3	36,3-60,2
Anos de escolaridade		
0 a 8	53,8	41,6-66,1
9 a 11	68,7	62,4-75,1
12 e mais	69,1	63,7-74,5
Total	72,5	67,9-77,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,8	1,9-11,6	6,8	0,0-16,1	6,7	3,2-10,2
25 a 34	16,6	11,1-22,2	13,8	4,9-22,7	19,2	12,4-26,0
35 a 44	12,9	9,1-16,7	8,9	3,3-14,4	16,5	11,3-21,8
45 a 54	13,8	9,6-18,0	9,4	3,6-15,3	17,8	11,8-23,8
55 a 64	16,3	11,0-21,5	12,3	4,8-19,9	19,9	12,8-27,0
65 e mais	21,3	13,9-28,7	12,3	3,1-21,4	28,8	18,2-39,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,4	10,4-18,4	13,1	6,6-19,6	15,7	11,0-20,4
9 a 11	10,6	8,0-13,2	6,4	3,1-9,6	14,1	10,2-18,0
12 e mais	15,0	12,2-17,9	7,7	4,4-11,0	21,2	16,9-25,6
Total	13,3	11,0-15,5	10,2	6,5-13,9	16,1	13,3-18,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	76,4	54,7-98,2	98,9	96,2-100,0	54,9	31,0-78,8
25 a 34	80,9	67,8-94,1	95,2	88,8-100,0	71,7	52,8-90,5
35 a 44	80,3	67,0-93,6	68,5	38,0-99,0	86,0	73,5-98,5
45 a 54	88,2	79,0-97,4	94,4	85,4-100,0	85,1	72,5-97,8
55 a 64	77,4	60,8-93,9	50,4	17,4-83,3	92,9	83,4-100,0
65 e mais	89,2	78,7-99,7	82,6	57,2-100,0	91,5	80,5-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	79,9	69,8-90,0	87,9	76,1-99,7	73,2	59,0-87,4
9 a 11	84,1	74,7-93,4	87,4	72,3-100,0	82,8	71,4-94,3
12 e mais	83,8	76,0-91,6	70,7	49,8-91,7	87,8	80,2-95,4
Total	81,7	75,5-88,0	85,8	76,4-95,1	79,4	71,5-87,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,8	7,0-22,5	15,4	5,0-25,8	14,1	2,6-25,7
25 a 34	19,4	13,9-24,9	23,0	14,4-31,6	16,1	9,2-23,1
35 a 44	21,1	16,7-25,5	21,4	14,3-28,4	20,8	15,4-26,3
45 a 54	20,4	15,6-25,3	25,7	17,3-34,1	15,9	10,6-21,2
55 a 64	21,5	15,3-27,7	27,4	16,7-38,1	16,8	10,0-23,6
65 e mais	7,1	3,5-10,7	14,7	6,3-23,1	2,3	0,1-4,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,7	18,1-27,4	27,4	19,9-34,8	18,9	13,0-24,9
9 a 11	15,4	12,1-18,6	17,6	12,3-22,8	13,4	9,5-17,2
12 e mais	12,3	9,4-15,2	14,0	9,5-18,5	10,7	7,1-14,4
Total	18,2	15,7-20,7	21,2	17,3-25,1	15,5	12,3-18,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,2	9,0-27,4	15,0	5,4-24,6	21,3	6,3-36,3
25 a 34	19,7	14,5-24,9	24,2	15,7-32,7	15,5	9,5-21,5
35 a 44	20,3	16,2-24,3	19,7	13,9-25,5	20,7	15,0-26,4
45 a 54	26,9	21,6-32,3	31,9	22,8-40,9	22,7	16,6-28,8
55 a 64	26,1	20,1-32,1	32,6	22,5-42,7	20,8	13,6-27,9
65 e mais	34,9	28,3-41,5	50,3	38,4-62,3	25,0	17,6-32,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	26,0	21,1-31,0	28,8	21,7-36,0	23,7	16,7-30,7
9 a 11	20,9	17,5-24,2	22,7	17,3-28,1	19,2	15,0-23,4
12 e mais	16,8	13,6-20,0	20,0	15,1-24,9	13,8	9,7-17,9
Total	22,4	19,7-25,1	24,9	21,1-28,7	20,3	16,5-24,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,3	0,0-5,6	1,2	0,0-3,4	3,3	0,0-9,4
25 a 34	5,5	2,7-8,4	7,1	2,1-12,0	4,1	1,1-7,1
35 a 44	8,2	5,0-11,3	10,6	5,0-16,1	6,1	2,9-9,3
45 a 54	8,3	4,9-11,7	13,0	6,5-19,5	4,3	1,7-6,9
55 a 64	11,0	6,0-15,9	17,9	8,4-27,4	5,3	1,5-9,2
65 e mais	2,3	0,1-4,4	5,5	0,1-10,9	0,2	0,0-0,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,5	4,9-10,1	11,0	6,5-15,4	4,6	1,6-7,7
9 a 11	5,4	3,5-7,3	6,9	3,6-10,1	4,0	2,0-6,1
12 e mais	4,0	2,3-5,7	4,8	2,1-7,6	3,2	1,1-5,3
Total	6,1	4,7-7,5	8,3	5,9-10,6	4,2	2,5-5,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	55,4	45,8-65,1	58,1	45,2-71,0	52,9	39,0-66,7
25 a 34	42,0	35,6-48,5	47,0	37,0-57,0	37,3	29,2-45,5
35 a 44	39,3	34,2-44,4	40,3	32,4-48,2	38,4	31,7-45,1
45 a 54	30,8	25,0-36,6	36,0	26,4-45,7	26,3	19,7-32,9
55 a 64	26,8	20,7-32,9	23,5	14,3-32,7	29,5	21,5-37,6
65 e mais	23,8	17,7-29,9	22,3	11,7-32,9	24,7	17,3-32,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	42,0	36,5-47,5	47,7	39,0-56,4	37,2	30,5-44,0
9 a 11	41,8	37,3-46,2	43,2	36,5-50,0	40,4	34,6-46,3
12 e mais	31,3	27,1-35,5	31,2	25,0-37,4	31,3	25,6-37,0
Total	39,6	36,5-42,7	42,6	37,7-47,4	37,0	33,1-40,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	26,4	17,1-35,7	21,4	10,0-32,9	31,3	17,1-45,5
25 a 34	40,8	34,3-47,3	41,5	31,8-51,3	40,1	31,3-48,8
35 a 44	50,5	45,3-55,7	57,1	49,2-65,0	44,7	37,8-51,5
45 a 54	60,9	55,0-66,7	69,8	60,9-78,7	53,0	45,5-60,6
55 a 64	62,9	56,2-69,7	67,8	57,5-78,1	58,7	49,9-67,6
65 e mais	61,1	54,0-68,1	66,0	54,4-77,6	57,5	48,7-66,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	56,1	50,4-61,8	50,2	41,5-59,0	61,2	53,9-68,4
9 a 11	38,5	34,3-42,6	44,2	37,6-50,7	33,2	28,1-38,4
12 e mais	38,1	33,8-42,4	52,9	46,3-59,5	23,7	18,9-28,6
Total	46,6	43,5-49,7	48,9	44,2-53,6	44,6	40,5-48,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,9	0,6-13,2	2,8	0,1-5,6	11,0	0,0-22,7
25 a 34	10,9	6,6-15,1	12,1	5,7-18,6	9,7	4,1-15,3
35 a 44	14,0	10,4-17,6	15,4	9,7-21,1	12,8	8,2-17,3
45 a 54	20,9	15,9-26,0	24,5	16,0-33,1	17,8	12,1-23,5
55 a 64	20,5	14,8-26,1	16,4	8,5-24,2	24,1	16,1-32,0
65 e mais	21,2	15,2-27,1	15,9	6,4-25,5	24,9	17,2-32,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,2	14,1-22,3	13,9	8,8-19,1	21,8	15,8-27,9
9 a 11	10,4	8,0-12,7	11,9	8,1-15,7	8,9	6,2-11,7
12 e mais	10,1	7,5-12,8	14,4	9,8-19,0	6,0	3,4-8,6
Total	14,0	11,8-16,1	13,4	10,6-16,2	14,5	11,3-17,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	24,9	15,4-34,4	18,9	6,9-30,8	30,7	16,6-44,9
25 a 34	30,9	25,3-36,4	19,5	12,8-26,3	41,5	33,4-49,6
35 a 44	38,3	33,3-43,2	25,8	19,2-32,3	49,1	42,4-55,9
45 a 54	47,0	41,0-53,0	42,5	32,9-52,1	50,9	43,4-58,4
55 a 64	51,1	44,2-58,0	35,4	25,0-45,8	64,0	55,6-72,3
65 e mais	55,0	48,0-62,0	44,5	32,8-56,1	61,8	53,6-69,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,5	29,4-39,7	18,6	11,9-25,3	47,7	40,7-54,7
9 a 11	33,6	29,6-37,7	28,8	22,7-34,8	38,0	32,6-43,4
12 e mais	49,7	45,3-54,1	42,8	36,3-49,3	56,3	50,3-62,3
Total	37,5	34,6-40,4	27,3	23,3-31,3	46,5	42,5-50,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,3	5,6-15,0	7,6	2,6-12,6	13,0	5,2-20,8
25 a 34	19,0	14,5-23,5	10,3	5,7-15,0	27,1	20,0-34,2
35 a 44	21,3	17,2-25,3	13,0	8,2-17,8	28,5	22,3-34,6
45 a 54	28,6	23,1-34,1	26,4	17,5-35,4	30,5	23,7-37,3
55 a 64	30,4	24,1-36,6	19,8	10,9-28,6	39,1	30,5-47,6
65 e mais	25,1	19,1-31,1	20,0	11,1-28,8	28,3	20,4-36,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,8	14,3-21,3	9,5	5,7-13,3	24,7	19,3-30,1
9 a 11	18,6	15,4-21,9	14,3	9,8-18,8	22,6	18,0-27,1
12 e mais	30,0	26,0-34,0	23,7	18,0-29,4	36,1	30,5-41,7
Total	20,7	18,6-22,9	14,2	11,5-16,9	26,4	23,2-29,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	40,1	30,4-49,8	42,8	29,6-56,0	37,5	23,0-52,0
25 a 34	38,9	32,7-45,0	48,1	38,1-58,0	30,2	22,8-37,7
35 a 44	33,3	28,4-38,3	44,3	36,4-52,2	23,8	17,9-29,7
45 a 54	34,4	28,5-40,3	41,4	31,7-51,0	28,4	21,4-35,5
55 a 64	22,8	16,9-28,7	28,9	18,7-39,0	17,8	11,1-24,5
65 e mais	20,9	15,0-26,8	35,3	23,6-46,9	11,7	6,4-17,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	37,0	31,7-42,4	44,9	36,5-53,4	30,5	23,3-37,7
9 a 11	36,8	32,5-41,1	45,9	39,1-52,6	28,6	23,3-34,0
12 e mais	24,9	21,1-28,7	33,3	27,1-39,5	16,9	12,4-21,3
Total	34,3	31,3-37,3	42,6	38,0-47,2	27,1	23,1-31,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	75,8	68,4-83,2	76,4	65,8-86,9	75,3	64,8-85,7
25 a 34	68,3	62,5-74,1	66,6	57,5-75,7	69,9	62,7-77,1
35 a 44	60,5	55,5-65,5	59,7	52,0-67,5	61,2	54,7-67,8
45 a 54	52,0	46,0-58,0	50,5	40,8-60,2	53,3	45,9-60,7
55 a 64	51,1	44,2-58,1	51,3	40,2-62,3	51,0	42,2-59,8
65 e mais	48,2	41,3-55,1	49,8	37,8-61,7	47,2	38,8-55,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	64,1	59,2-69,0	61,2	53,3-69,2	66,4	60,4-72,5
9 a 11	69,2	65,2-73,1	70,8	64,8-76,7	67,8	62,5-73,0
12 e mais	49,2	44,7-53,6	52,5	46,0-59,0	46,0	40,0-52,0
Total	62,5	59,6-65,3	62,3	57,9-66,7	62,6	59,0-66,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	34,5	25,7-43,2	35,1	23,3-46,9	33,9	20,9-46,8
25 a 34	40,3	33,9-46,8	48,9	38,9-59,0	32,3	24,2-40,4
35 a 44	26,0	21,4-30,5	29,3	22,1-36,4	23,1	17,2-28,9
45 a 54	22,4	17,3-27,4	25,7	17,4-34,1	19,5	13,4-25,6
55 a 64	14,2	9,3-19,1	16,9	9,3-24,6	12,0	5,7-18,2
65 e mais	8,2	4,3-12,2	7,9	0,7-15,1	8,4	3,9-12,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	26,7	21,7-31,8	28,5	20,7-36,2	25,3	18,7-31,9
9 a 11	32,8	28,6-36,9	39,3	32,7-45,9	26,9	21,6-32,1
12 e mais	25,2	21,4-29,1	31,6	25,5-37,7	19,1	14,5-23,8
Total	28,3	25,5-31,1	32,6	28,3-37,0	24,5	20,8-28,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,9	12,1-27,8	28,8	15,6-41,9	11,4	3,9-18,9
25 a 34	13,7	9,7-17,7	9,4	4,9-13,8	17,8	11,3-24,2
35 a 44	13,6	10,2-17,0	12,0	7,4-16,5	15,0	10,1-19,9
45 a 54	10,0	6,7-13,4	9,1	3,8-14,3	10,9	6,5-15,2
55 a 64	15,7	10,6-20,9	21,1	12,1-30,2	11,3	5,6-17,0
65 e mais	12,2	7,5-16,8	14,2	5,5-22,9	10,9	5,7-16,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,9	8,0-15,7	11,7	5,2-18,3	12,0	7,6-16,3
9 a 11	15,6	12,3-18,9	16,3	11,0-21,6	15,0	11,0-19,0
12 e mais	18,4	14,8-21,9	21,4	15,9-27,0	15,4	11,1-19,8
Total	14,4	12,2-16,6	15,4	11,7-19,0	13,6	11,0-16,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	46,7	37,0-56,4	65,1	53,9-76,4	29,0	18,4-39,6
25 a 34	49,1	42,6-55,6	64,9	55,9-74,0	34,2	25,9-42,6
35 a 44	50,5	45,4-55,6	59,4	51,8-67,0	42,8	36,1-49,5
45 a 54	44,3	38,3-50,3	57,4	47,9-66,9	33,1	26,3-40,0
55 a 64	28,9	22,7-35,1	42,0	31,2-52,9	18,2	11,8-24,5
65 e mais	11,5	7,3-15,7	20,1	11,4-28,9	5,9	2,0-9,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,5	41,0-52,0	67,9	60,8-74,9	28,9	22,8-34,9
9 a 11	44,6	40,2-49,0	55,3	48,6-62,0	35,0	29,5-40,5
12 e mais	34,5	30,3-38,8	40,2	33,7-46,6	29,1	23,6-34,6
Total	43,3	40,2-46,4	57,6	53,2-62,1	30,8	27,2-34,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,2	5,0-19,4	16,4	4,1-28,8	8,2	1,2-15,2
25 a 34	8,0	4,3-11,6	8,5	2,5-14,5	7,4	3,2-11,7
35 a 44	14,4	10,7-18,1	13,2	7,9-18,5	15,4	10,3-20,6
45 a 54	10,4	6,6-14,1	12,9	6,2-19,6	8,2	4,2-12,1
55 a 64	8,8	5,0-12,5	12,1	5,1-19,1	6,0	2,5-9,6
65 e mais	2,0	0,0-4,0	1,2	0,0-3,7	2,5	0,0-5,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,7	7,9-15,6	14,8	7,8-21,8	9,2	5,5-13,0
9 a 11	9,5	7,0-12,1	9,2	5,4-12,9	9,8	6,4-13,3
12 e mais	7,8	5,4-10,2	9,1	5,2-12,9	6,6	3,7-9,5
Total	10,2	8,2-12,2	11,7	8,2-15,3	8,9	6,7-11,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,9	17,3-34,5	9,7	1,8-17,6	41,4	27,8-55,0
25 a 34	40,3	34,0-46,6	12,3	6,8-17,9	66,5	59,4-73,7
35 a 44	39,6	34,6-44,6	9,9	5,3-14,4	65,4	59,1-71,8
45 a 54	40,2	34,5-45,9	8,1	3,3-12,9	67,8	60,8-74,7
55 a 64	43,9	37,1-50,7	16,3	8,4-24,3	66,5	58,3-74,7
65 e mais	39,0	32,2-45,7	18,4	9,4-27,4	52,1	43,7-60,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	45,5	40,1-50,8	11,8	6,8-16,7	73,3	66,6-80,0
9 a 11	36,6	32,6-40,7	13,4	9,3-17,6	57,5	51,7-63,4
12 e mais	20,9	17,5-24,3	7,6	4,4-10,7	33,6	28,1-39,2
Total	37,4	34,5-40,3	11,4	8,6-14,1	60,2	56,3-64,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,2	10,3-24,2	25,9	13,9-37,9	8,9	2,8-15,1
25 a 34	11,3	7,5-15,2	18,0	10,8-25,1	5,1	2,2-8,1
35 a 44	10,5	7,0-13,9	19,3	12,7-25,9	2,8	0,6-4,9
45 a 54	9,7	6,0-13,4	15,2	8,2-22,2	4,9	1,8-8,1
55 a 64	4,6	1,8-7,3	7,3	2,2-12,5	2,3	0,0-4,9
65 e mais	2,4	0,4-4,4	5,6	0,7-10,6	0,3	0,0-1,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,3	4,9-11,7	15,6	8,7-22,5	2,3	0,8-3,9
9 a 11	12,7	9,5-15,8	18,6	13,5-23,8	7,3	3,4-11,2
12 e mais	13,4	10,3-16,4	21,0	15,7-26,4	6,0	3,2-8,8
Total	10,8	8,8-12,8	17,8	14,1-21,5	4,6	3,0-6,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,6	0,1-3,1	2,7	0,0-5,5	0,6	0,0-1,7
25 a 34	1,6	0,0-3,3	3,1	0,0-6,6	0,3	0,0-0,8
35 a 44	2,5	0,7-4,3	4,9	1,1-8,8	0,4	0,0-1,0
45 a 54	1,7	0,2-3,2	3,2	0,0-6,3	0,4	0,0-1,2
55 a 64	0,2	0,0-0,6	0,4	0,0-1,3	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,2	0,0-0,7	0,6	0,0-1,9	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,6	0,3-2,9	3,5	0,8-6,3	0,0	0,0-0,0
9 a 11	1,1	0,3-2,0	2,1	0,3-3,9	0,3	0,0-0,7
12 e mais	2,2	0,9-3,5	3,3	1,1-5,5	1,1	0,0-2,5
Total	1,6	0,9-2,3	3,0	1,5-4,5	0,3	0,0-0,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,2	0,0-10,1	6,2	0,0-17,6	2,4	0,0-4,8
25 a 34	2,3	0,5-4,1	3,3	0,0-6,7	1,4	0,0-2,9
35 a 44	4,0	1,9-6,1	0,3	0,0-1,0	7,1	3,4-10,9
45 a 54	6,0	3,3-8,7	4,7	0,8-8,7	7,1	3,4-10,8
55 a 64	8,3	4,4-12,3	6,8	1,3-12,3	9,6	4,0-15,2
65 e mais	10,5	6,2-14,7	8,0	2,2-13,8	12,0	6,1-17,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,0	4,1-10,0	6,7	1,0-12,5	7,3	4,7-9,8
9 a 11	3,2	1,7-4,7	2,6	0,4-4,8	3,8	1,8-5,8
12 e mais	2,4	1,1-3,6	0,9	0,0-2,0	3,8	1,5-6,0
Total	4,8	3,3-6,3	4,1	1,3-6,9	5,5	4,0-6,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	90,9	86,7-95,1	77,0	70,3-83,6
60 a 69	84,4	77,0-91,9	67,9	58,8-77,0
Anos de escolaridade				
0 a 8	86,3	81,0-91,6	71,6	64,5-78,7
9 a 11	90,4	84,5-96,3	72,8	62,9-82,8
12 e mais	98,4	96,0-100,0	85,9	76,0-95,7
Total	88,5	84,6-92,4	73,6	68,2-79,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	90,8	85,6-96,0	85,6	79,1-92,0
35 a 44	93,9	90,1-97,6	90,1	85,5-94,7
45 a 54	94,8	91,5-98,1	85,7	80,4-91,1
55 a 59	94,6	87,6-100,0	76,4	65,3-87,4
Anos de escolaridade				
0 a 8	91,4	86,9-95,9	85,6	79,1-92,0
9 a 11	93,2	89,9-96,6	90,1	85,5-94,7
12 e mais	96,1	93,2-99,0	85,7	80,4-91,1
Total	93,0	90,6-95,5	76,4	65,3-87,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	40,7	31,0-50,3	28,0	16,0-39,9	52,9	39,3-66,4
25 a 34	40,0	33,9-46,2	21,0	13,3-28,7	57,9	49,4-66,3
35 a 44	46,5	41,4-51,6	23,9	17,9-29,9	66,1	59,6-72,6
45 a 54	43,0	37,2-48,9	28,1	19,9-36,3	55,9	48,4-63,3
55 a 64	39,9	33,2-46,6	24,1	14,4-33,8	52,9	44,1-61,8
65 e mais	33,3	26,6-39,9	18,8	8,7-28,9	42,5	34,0-50,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,6	29,3-39,8	16,6	9,9-23,2	49,4	42,4-56,4
9 a 11	40,4	36,1-44,7	24,4	18,6-30,2	54,8	49,1-60,5
12 e mais	58,1	53,7-62,5	39,8	33,4-46,2	75,6	70,3-81,0
Total	41,5	38,5-44,5	24,3	20,4-28,2	56,5	52,5-60,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,7	0,7-4,7	3,6	0,4-6,7	1,8	0,0-4,4
25 a 34	10,9	6,8-14,9	8,6	3,4-13,8	13,0	6,9-19,1
35 a 44	18,9	14,9-23,0	17,5	11,8-23,2	20,2	14,5-25,9
45 a 54	30,1	24,6-35,7	26,5	17,7-35,3	33,3	26,2-40,4
55 a 64	43,6	36,7-50,5	33,7	23,6-43,8	51,7	42,9-60,5
65 e mais	64,9	58,3-71,5	54,4	42,6-66,3	71,5	64,0-79,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	27,9	23,9-32,0	18,0	12,8-23,3	36,1	30,2-42,0
9 a 11	15,6	12,9-18,3	15,7	11,5-19,9	15,6	12,1-19,1
12 e mais	14,8	11,8-17,8	18,8	13,8-23,8	10,9	7,7-14,2
Total	21,2	19,1-23,4	17,5	14,5-20,4	24,5	21,5-27,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,2	0,0-2,5	1,5	0,0-4,0	1,0	0,0-1,9
35 a 44	3,1	1,5-4,6	3,1	0,7-5,6	3,0	1,0-5,0
45 a 54	4,6	1,9-7,2	5,6	0,7-10,5	3,7	1,1-6,2
55 a 64	16,0	10,9-21,0	19,4	10,9-28,0	13,1	7,2-19,0
65 e mais	16,8	11,7-21,9	15,1	7,0-23,2	17,9	11,4-24,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,8	4,1-7,5	6,1	3,2-9,0	5,6	3,6-7,6
9 a 11	2,8	1,7-4,0	3,2	1,3-5,0	2,5	1,3-3,8
12 e mais	3,9	2,4-5,4	3,8	1,5-6,0	4,0	2,0-6,0
Total	4,5	3,6-5,4	4,6	3,1-6,2	4,3	3,2-5,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,2	0,0-2,6	1,9	0,0-4,7	0,6	0,0-1,4
35 a 44	1,9	0,4-3,4	3,5	0,4-6,6	0,4	0,0-1,3
45 a 54	3,8	1,5-6,1	3,7	0,0-7,5	3,9	1,1-6,7
55 a 64	5,2	2,5-7,9	3,5	0,2-6,9	6,6	2,5-10,6
65 e mais	13,2	8,4-18,0	17,5	8,7-26,2	10,5	5,0-16,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,4	2,9-5,9	4,4	1,9-7,0	4,3	2,6-6,1
9 a 11	1,5	0,6-2,4	2,8	1,0-4,6	0,4	0,0-0,9
12 e mais	1,4	0,4-2,4	1,9	0,1-3,7	1,0	0,0-2,0
Total	2,9	2,1-3,6	3,3	2,0-4,7	2,4	1,6-3,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,0	0,0-4,5	2,9	0,0-7,7	1,2	0,0-2,7
25 a 34	6,7	3,6-9,7	6,2	2,1-10,4	7,0	2,6-11,4
35 a 44	14,3	10,8-17,8	17,0	11,3-22,7	12,0	7,8-16,2
45 a 54	25,0	19,9-30,1	24,7	16,7-32,7	25,2	18,7-31,7
55 a 64	38,2	31,4-45,0	33,2	22,8-43,5	42,3	33,4-51,1
65 e mais	39,9	33,1-46,6	29,4	18,8-40,0	46,5	38,0-55,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,4	16,0-22,7	13,6	8,9-18,3	24,1	19,3-28,8
9 a 11	10,2	8,0-12,5	11,5	7,7-15,3	9,1	6,6-11,6
12 e mais	15,7	12,6-18,7	20,7	15,6-25,7	10,9	7,6-14,1
Total	15,7	13,9-17,5	14,6	11,8-17,3	16,7	14,3-19,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,7	0,0-2,0	1,2	0,0-3,7	0,3	0,0-0,8
35 a 44	1,6	0,3-2,9	1,1	0,0-2,3	2,1	0,0-4,3
45 a 54	4,6	2,4-6,8	2,0	0,0-4,7	6,8	3,5-10,2
55 a 64	9,6	5,8-13,4	5,2	0,7-9,7	13,2	7,4-19,0
65 e mais	18,5	13,1-23,9	6,1	0,6-11,7	26,3	18,6-34,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,5	3,9-7,1	2,5	0,6-4,4	7,9	5,5-10,4
9 a 11	1,9	1,1-2,7	1,2	0,1-2,3	2,5	1,4-3,6
12 e mais	2,1	0,9-3,2	0,9	0,0-2,3	3,2	1,4-5,0
Total	3,6	2,8-4,4	1,7	0,7-2,7	5,3	4,0-6,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,8	3,4-14,1	11,8	1,9-21,7	5,9	2,0-9,9
25 a 34	5,0	1,8-8,1	4,7	0,7-8,7	5,2	0,5-9,9
35 a 44	3,7	1,8-5,5	2,0	0,0-4,0	5,1	2,2-8,0
45 a 54	3,7	1,4-5,9	2,5	0,0-5,7	4,7	1,6-7,7
55 a 64	4,9	1,7-8,2	2,0	0,0-5,1	7,4	2,2-12,6
65 e mais	3,8	1,5-6,1	4,4	0,0-9,0	3,4	0,9-5,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,1	3,3-8,9	7,3	2,2-12,3	5,1	2,3-7,9
9 a 11	3,9	2,1-5,8	3,4	0,6-6,3	4,4	2,0-6,8
12 e mais	4,9	3,0-6,9	2,7	0,5-5,0	7,0	3,9-10,1
Total	5,2	3,7-6,6	5,0	2,5-7,6	5,3	3,6-7,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	38,1	29,4-46,7	40,1	27,3-52,9	36,1	24,6-47,6
25 a 34	49,9	43,5-56,4	46,7	37,0-56,5	53,0	44,6-61,3
35 a 44	48,7	43,6-53,8	46,4	38,7-54,2	50,7	44,0-57,5
45 a 54	55,8	49,8-61,9	55,2	45,5-65,0	56,4	48,9-63,8
55 a 64	45,2	38,4-52,1	40,7	30,0-51,3	49,0	40,2-57,8
65 e mais	54,3	47,3-61,3	46,0	34,2-57,7	59,6	51,3-67,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	30,1	25,6-34,7	23,7	16,8-30,6	35,5	29,3-41,6
9 a 11	53,1	48,7-57,5	53,1	46,4-59,8	53,2	47,4-58,9
12 e mais	80,0	76,4-83,6	80,9	75,8-86,0	79,1	74,0-84,1
Total	48,1	45,1-51,1	46,0	41,4-50,6	50,0	45,9-54,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	69,6	58,1-81,2
26 a 30	74,4	64,7-84,1
31 a 35	83,6	73,6-93,6
36 a 40	73,7	65,7-81,7
41 a 45	66,2	56,5-75,9
46 a 50	66,7	56,3-77,2
Anos de escolaridade		
0 a 8	73,4	64,0-82,7
9 a 11	70,3	64,4-76,2
12 e mais	74,2	68,5-80,0
Total	77,4	73,3-81,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,3	7,0-17,6	7,1	1,1-13,2	17,2	8,6-25,9
25 a 34	19,4	14,5-24,3	6,0	2,0-10,0	31,9	24,0-39,7
35 a 44	20,2	16,2-24,3	9,7	5,0-14,3	29,4	23,3-35,6
45 a 54	20,7	16,2-25,2	10,9	5,6-16,1	29,1	22,4-35,8
55 a 64	20,3	14,6-25,9	11,7	4,0-19,5	27,2	19,3-35,2
65 e mais	12,2	7,9-16,4	1,7	0,0-4,9	18,9	12,5-25,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,8	15,1-22,6	7,4	3,6-11,2	28,3	22,6-34,1
9 a 11	15,9	12,8-18,9	8,4	4,9-11,9	22,6	17,8-27,3
12 e mais	18,4	15,0-21,7	8,7	5,0-12,3	27,7	22,4-33,0
Total	17,8	15,7-19,9	8,0	5,8-10,2	26,4	23,1-29,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	77,6	61,8-93,4	68,6	32,6-100,0	81,2	64,6-97,9
25 a 34	77,7	66,0-89,5	74,4	40,6-100,0	78,3	66,0-90,7
35 a 44	89,3	82,9-95,6	82,9	66,5-99,3	91,1	84,4-97,8
45 a 54	95,2	90,6-99,8	96,7	90,3-100,0	94,8	89,1-100,0
55 a 64	85,1	72,8-97,4	86,8	62,6-100,0	84,5	70,2-98,8
65 e mais	93,7	84,2-100,0	100,0	100,0-100,0	93,3	83,3-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	86,0	78,7-93,3	86,4	67,4-100,0	86,0	78,1-93,8
9 a 11	81,9	73,6-90,1	75,2	55,5-94,8	84,1	75,4-92,9
12 e mais	88,1	81,5-94,8	84,1	67,0-100,0	89,4	82,4-96,3
Total	85,3	80,8-89,9	82,1	70,8-93,3	86,2	81,3-91,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,1	8,8-23,5	20,6	8,9-32,3	11,7	2,9-20,6
25 a 34	19,8	13,7-25,9	20,0	12,4-27,5	19,6	10,0-29,1
35 a 44	16,9	12,4-21,5	18,5	11,5-25,5	15,5	9,7-21,4
45 a 54	23,2	18,0-28,5	25,7	17,7-33,8	21,0	14,2-27,8
55 a 64	14,1	8,5-19,7	17,5	7,8-27,2	11,1	5,0-17,3
65 e mais	8,8	4,7-13,0	13,5	5,1-22,0	5,7	1,7-9,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	24,5	19,1-30,0	29,7	21,2-38,2	20,2	13,1-27,2
9 a 11	13,2	10,3-16,1	13,2	8,9-17,5	13,2	9,2-17,2
12 e mais	11,8	9,4-14,3	13,7	9,9-17,6	9,9	6,9-12,8
Total	17,5	15,0-20,1	20,0	16,1-23,9	15,3	11,9-18,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,8	10,0-25,5	22,7	10,1-35,2	12,9	4,2-21,7
25 a 34	16,4	11,4-21,5	19,2	11,4-26,9	13,8	7,4-20,2
35 a 44	23,7	18,4-29,0	26,0	17,8-34,2	21,7	14,8-28,6
45 a 54	33,6	27,9-39,3	41,8	32,9-50,7	26,4	19,4-33,4
55 a 64	29,0	22,4-35,6	35,6	24,3-47,0	23,4	16,0-30,7
65 e mais	33,6	26,8-40,4	55,0	42,3-67,7	19,2	12,2-26,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,2	19,8-30,6	31,9	23,0-40,9	19,4	13,2-25,6
9 a 11	22,1	18,5-25,7	29,1	23,2-35,1	16,0	11,9-20,1
12 e mais	22,6	19,5-25,8	24,3	19,6-29,1	20,9	16,7-25,1
Total	23,5	20,9-26,2	28,8	24,5-33,1	18,8	15,6-21,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,9	0,0-9,7	3,5	0,0-8,2	6,3	0,0-14,6
25 a 34	4,2	1,5-6,8	4,7	1,0-8,5	3,6	0,0-7,4
35 a 44	7,4	4,1-10,6	9,6	4,3-14,9	5,4	1,5-9,2
45 a 54	8,5	5,0-12,0	12,0	5,9-18,1	5,4	1,7-9,1
55 a 64	3,5	1,2-5,8	6,2	1,4-10,9	1,2	0,0-2,6
65 e mais	2,9	0,8-4,9	4,7	0,3-9,2	1,6	0,0-3,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,2	4,8-11,5	9,6	4,9-14,3	7,0	2,2-11,8
9 a 11	3,6	2,1-5,1	4,7	2,1-7,3	2,7	1,0-4,3
12 e mais	3,7	2,3-5,2	5,1	2,6-7,6	2,4	0,9-3,8
Total	5,6	4,0-7,1	6,8	4,6-9,0	4,4	2,2-6,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	49,8	41,1-58,5	43,1	30,5-55,8	56,4	45,3-67,6
25 a 34	41,3	34,2-48,4	39,1	29,8-48,4	43,4	32,8-53,9
35 a 44	36,4	30,3-42,5	35,1	25,6-44,5	37,7	29,7-45,6
45 a 54	27,0	21,6-32,5	31,3	22,7-39,9	23,3	16,5-30,0
55 a 64	23,8	17,2-30,5	27,3	16,1-38,4	20,9	13,1-28,7
65 e mais	14,2	9,4-19,0	15,8	7,4-24,2	13,2	7,5-18,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	38,6	32,4-44,8	37,0	27,7-46,2	40,0	31,7-48,4
9 a 11	39,3	34,8-43,8	38,7	32,1-45,4	39,8	33,7-45,9
12 e mais	28,8	25,2-32,4	29,7	24,5-35,0	27,8	22,9-32,7
Total	36,0	32,9-39,1	35,3	30,7-39,8	36,7	32,4-41,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,0	16,5-33,4	30,0	16,9-43,1	20,1	9,9-30,4
25 a 34	35,9	29,0-42,8	45,7	36,3-55,2	26,0	15,8-36,2
35 a 44	46,2	40,0-52,4	57,3	48,1-66,6	35,8	28,1-43,5
45 a 54	49,4	43,3-55,5	53,4	44,3-62,5	45,6	37,3-53,8
55 a 64	64,1	56,9-71,3	66,5	54,6-78,4	62,0	53,3-70,7
65 e mais	54,0	46,4-61,6	49,7	37,0-62,3	57,2	47,7-66,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	49,8	43,3-56,3	51,1	41,4-60,8	48,6	40,0-57,2
9 a 11	39,0	34,6-43,4	49,5	42,7-56,2	29,8	24,5-35,2
12 e mais	35,0	31,4-38,6	43,9	38,4-49,5	25,6	21,2-30,1
Total	42,0	38,9-45,1	48,3	43,7-52,9	36,1	32,1-40,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	9,0	1,6-16,3	16,7	3,0-30,4	1,5	0,0-3,7
25 a 34	7,8	4,2-11,5	9,7	4,0-15,4	6,0	1,4-10,5
35 a 44	11,0	7,0-15,0	13,6	7,2-20,0	8,5	3,6-13,4
45 a 54	15,7	11,0-20,4	13,3	7,5-19,0	18,1	10,7-25,4
55 a 64	22,6	16,1-29,1	20,7	10,8-30,7	24,1	15,6-32,7
65 e mais	15,7	10,6-20,7	11,2	3,5-18,9	18,9	12,2-25,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,9	12,8-22,9	20,5	11,6-29,3	15,6	10,4-20,7
9 a 11	8,1	6,0-10,3	8,3	4,9-11,6	8,0	5,2-10,8
12 e mais	8,1	6,0-10,2	10,4	7,1-13,8	5,6	3,3-8,0
Total	11,9	9,7-14,1	13,6	9,8-17,4	10,3	8,0-12,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,8	25,7-41,8	27,7	15,8-39,5	39,8	28,8-50,8
25 a 34	33,1	26,6-39,7	29,8	20,6-38,9	36,4	26,8-45,9
35 a 44	43,3	37,4-49,2	35,3	26,8-43,9	50,4	42,5-58,4
45 a 54	51,5	45,6-57,5	39,1	30,7-47,5	62,5	54,8-70,3
55 a 64	52,8	45,3-60,2	43,0	31,4-54,5	61,1	52,2-70,1
65 e mais	51,0	43,7-58,3	40,3	28,7-51,9	58,1	49,3-66,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,3	28,6-40,1	27,4	18,7-36,2	40,2	32,6-47,9
9 a 11	40,6	36,2-44,9	29,2	23,3-35,2	50,4	44,3-56,4
12 e mais	53,4	49,5-57,2	46,9	41,3-52,5	60,1	54,8-65,3
Total	41,6	38,6-44,6	33,9	29,5-38,2	48,6	44,5-52,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,6	14,1-29,1	17,9	6,7-29,0	25,2	15,1-35,3
25 a 34	19,4	13,6-25,1	14,6	7,2-22,0	23,9	15,1-32,6
35 a 44	24,7	19,7-29,7	17,6	11,2-24,1	31,1	23,8-38,4
45 a 54	29,4	24,3-34,4	25,2	17,9-32,5	33,0	26,2-39,9
55 a 64	30,7	24,2-37,2	22,9	13,3-32,5	37,4	28,8-45,9
65 e mais	26,1	20,2-32,0	16,7	8,9-24,6	32,4	24,4-40,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,3	15,1-25,4	15,7	8,1-23,3	24,2	17,2-31,1
9 a 11	22,7	19,0-26,3	15,7	10,9-20,5	28,7	23,4-34,0
12 e mais	31,3	27,9-34,8	24,9	20,1-29,7	37,9	33,0-42,9
Total	24,1	21,5-26,7	18,5	14,8-22,2	29,2	25,6-32,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	28,7	20,5-36,8	33,7	21,8-45,7	23,6	12,3-34,9
25 a 34	35,5	28,4-42,5	45,8	36,3-55,4	25,6	15,4-35,8
35 a 44	28,3	22,6-34,0	36,5	27,2-45,8	21,0	14,5-27,5
45 a 54	20,3	15,3-25,2	25,2	17,1-33,3	15,9	10,2-21,6
55 a 64	20,7	14,0-27,4	34,9	22,7-47,1	8,6	3,9-13,3
65 e mais	17,7	11,8-23,6	33,6	21,5-45,6	7,1	2,7-11,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	31,7	25,7-37,7	39,4	30,0-48,8	25,1	17,3-33,0
9 a 11	28,8	24,7-32,9	41,1	34,5-47,7	18,2	13,5-23,0
12 e mais	19,3	16,2-22,4	27,0	21,9-32,1	11,4	8,2-14,6
Total	27,3	24,4-30,3	36,1	31,6-40,7	19,4	15,5-23,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	58,9	50,5-67,4	66,5	54,0-79,0	51,4	40,0-62,9
25 a 34	56,4	49,6-63,3	59,5	50,4-68,7	53,5	43,3-63,6
35 a 44	59,4	53,6-65,1	62,4	53,9-70,9	56,6	48,9-64,3
45 a 54	48,0	42,0-54,0	51,1	42,1-60,1	45,2	37,3-53,2
55 a 64	38,6	31,2-45,9	40,5	28,6-52,4	37,0	27,9-46,1
65 e mais	44,8	37,5-52,1	50,5	37,9-63,0	41,0	32,3-49,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	62,8	56,9-68,7	67,1	58,0-76,1	59,2	51,4-66,9
9 a 11	57,0	52,6-61,5	65,0	58,7-71,2	50,2	44,1-56,3
12 e mais	37,1	33,3-40,8	39,7	34,1-45,3	34,3	29,3-39,4
Total	53,8	50,7-56,8	58,1	53,6-62,7	49,8	45,7-54,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	35,4	27,2-43,5	35,6	24,2-47,0	35,2	23,5-46,8
25 a 34	22,9	17,1-28,7	27,8	18,7-36,9	18,2	11,4-25,1
35 a 44	20,8	15,9-25,8	21,7	14,2-29,3	20,0	13,6-26,5
45 a 54	17,0	12,2-21,8	17,5	10,6-24,4	16,6	9,9-23,4
55 a 64	13,3	7,9-18,6	18,3	9,0-27,7	8,9	3,2-14,7
65 e mais	8,8	4,7-13,0	14,6	5,6-23,6	5,0	1,7-8,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,8	17,5-28,1	25,4	17,3-33,5	20,6	13,6-27,6
9 a 11	26,2	22,0-30,3	31,1	24,7-37,4	21,9	16,6-27,3
12 e mais	16,9	14,0-19,8	18,1	13,8-22,3	15,7	11,9-19,5
Total	22,1	19,5-24,8	24,8	20,8-28,8	19,7	16,1-23,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,6	14,8-28,4	29,7	18,5-40,9	13,5	6,2-20,9
25 a 34	19,8	14,0-25,7	22,1	14,5-29,8	17,6	8,7-26,5
35 a 44	16,6	12,2-21,0	15,4	8,6-22,2	17,7	12,0-23,4
45 a 54	15,9	11,5-20,3	11,6	6,0-17,3	19,6	13,1-26,2
55 a 64	22,1	16,1-28,1	23,1	12,8-33,4	21,2	14,3-28,1
65 e mais	16,6	10,8-22,5	28,9	16,9-40,9	8,4	4,0-12,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,4	11,6-21,2	16,3	8,9-23,7	16,6	10,3-22,8
9 a 11	20,3	16,7-23,9	23,2	17,4-28,9	17,9	13,4-22,4
12 e mais	20,6	17,5-23,7	25,8	20,8-30,9	15,2	11,7-18,7
Total	18,8	16,4-21,2	21,2	17,4-25,0	16,6	13,5-19,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	41,3	32,7-49,9	47,7	34,8-60,7	34,8	23,5-46,2
25 a 34	53,5	46,7-60,4	55,0	45,8-64,3	52,1	41,9-62,3
35 a 44	57,2	51,2-63,1	60,7	51,6-69,8	54,0	46,1-61,8
45 a 54	43,4	37,5-49,3	44,6	35,7-53,6	42,3	34,6-50,1
55 a 64	30,0	22,8-37,1	42,1	30,0-54,3	19,6	12,5-26,8
65 e mais	10,2	5,4-15,0	21,6	10,9-32,2	2,6	0,1-5,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	49,6	43,4-55,8	58,5	48,9-68,0	42,1	33,9-50,2
9 a 11	48,6	44,1-53,1	55,1	48,6-61,7	43,0	37,0-49,1
12 e mais	33,2	29,5-36,8	32,8	27,5-38,1	33,5	28,6-38,5
Total	44,6	41,5-47,8	49,7	45,0-54,4	40,1	35,9-44,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,3	7,1-17,5	13,2	5,0-21,5	11,4	5,1-17,8
25 a 34	15,4	10,3-20,5	14,1	7,3-20,9	16,6	9,1-24,1
35 a 44	15,2	10,7-19,6	17,1	9,9-24,3	13,4	8,1-18,7
45 a 54	11,3	7,6-15,0	11,0	5,2-16,8	11,6	6,9-16,2
55 a 64	8,1	3,8-12,4	10,2	2,4-18,1	6,3	2,0-10,6
65 e mais	4,4	1,0-7,8	7,4	0,0-14,9	2,3	0,0-4,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,3	9,3-17,4	15,2	8,6-21,7	11,8	6,7-16,8
9 a 11	12,7	9,6-15,8	13,2	8,5-18,0	12,3	8,2-16,3
12 e mais	11,1	8,7-13,6	10,9	7,2-14,5	11,4	8,1-14,8
Total	12,5	10,5-14,6	13,3	10,1-16,5	11,8	9,2-14,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,7	15,6-31,9	12,7	2,7-22,7	34,7	22,8-46,6
25 a 34	37,5	30,6-44,5	17,1	10,7-23,5	57,0	47,1-67,0
35 a 44	40,6	34,7-46,6	13,8	7,7-19,9	64,6	57,3-72,0
45 a 54	41,4	35,5-47,4	15,8	9,1-22,4	64,2	57,0-71,4
55 a 64	36,8	29,9-43,7	12,5	5,4-19,6	57,5	48,7-66,4
65 e mais	20,5	15,2-25,8	5,2	1,1-9,2	30,7	22,9-38,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,3	38,2-50,4	15,3	8,4-22,1	69,0	61,6-76,4
9 a 11	35,2	31,0-39,3	16,7	11,8-21,6	51,0	44,9-57,2
12 e mais	19,6	16,8-22,4	9,7	6,6-12,8	29,8	25,2-34,4
Total	34,5	31,6-37,5	14,0	10,7-17,3	53,1	49,0-57,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,5	13,9-27,1	26,9	16,2-37,6	14,1	6,5-21,8
25 a 34	21,1	15,5-26,6	27,4	19,7-35,0	15,1	6,9-23,2
35 a 44	17,9	13,5-22,4	26,1	18,3-33,8	10,7	5,9-15,4
45 a 54	15,5	11,4-19,7	23,7	16,4-31,0	8,3	4,1-12,6
55 a 64	9,2	4,7-13,7	16,8	7,6-25,9	2,7	0,4-5,1
65 e mais	4,6	1,1-8,2	9,3	1,0-17,5	1,5	0,0-3,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,6	7,4-15,9	15,7	8,8-22,5	8,2	2,8-13,6
9 a 11	19,1	15,4-22,7	27,6	21,6-33,7	11,7	7,4-15,9
12 e mais	22,7	19,4-26,1	32,5	27,1-37,9	12,7	9,3-16,1
Total	17,0	14,7-19,3	24,3	20,5-28,0	10,5	7,7-13,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,5	0,2-2,8	3,0	0,3-5,7	0,0	0,0-0,0
25 a 34	2,6	0,8-4,4	4,2	0,9-7,6	1,1	0,0-2,3
35 a 44	3,5	1,6-5,4	6,6	2,7-10,6	0,7	0,0-1,5
45 a 54	1,3	0,4-2,3	2,4	0,4-4,4	0,4	0,0-1,0
55 a 64	0,1	0,0-0,2	0,0	0,0-0,0	0,1	0,0-0,3
65 e mais	0,0	0,0-0,1	0,1	0,0-0,3	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,7	0,0-1,5	1,5	0,0-3,3	0,0	0,0-0,0
9 a 11	2,9	1,4-4,5	6,0	2,8-9,2	0,3	0,0-0,7
12 e mais	2,8	1,5-4,0	4,0	1,8-6,2	1,5	0,3-2,7
Total	1,9	1,3-2,6	3,6	2,2-5,0	0,5	0,1-0,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,0	0,0-2,1	1,4	0,0-3,4	0,6	0,0-1,6
25 a 34	2,5	0,3-4,8	2,0	0,0-4,5	3,0	0,0-6,7
35 a 44	2,4	0,2-4,6	0,0	0,0-0,0	4,5	0,5-8,6
45 a 54	6,4	2,9-9,8	4,6	0,7-8,5	7,9	2,5-13,3
55 a 64	8,4	3,5-13,2	7,3	0,0-15,6	9,3	3,8-14,8
65 e mais	8,9	4,2-13,7	7,8	0,0-17,3	9,7	4,8-14,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,8	3,4-8,2	3,2	0,4-6,0	8,1	4,4-11,8
9 a 11	2,9	1,6-4,3	3,0	0,8-5,2	2,9	1,2-4,6
12 e mais	1,7	0,7-2,8	1,8	0,2-3,3	1,7	0,4-3,1
Total	3,8	2,7-4,9	2,7	1,3-4,1	4,8	3,1-6,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	93,9	89,0-98,8	80,9	73,5-88,3
60 a 69	96,7	92,0-100,0	80,3	70,7-89,8
Anos de escolaridade				
0 a 8	91,6	84,9-98,2	72,8	62,9-82,7
9 a 11	99,1	97,5-100,0	86,8	78,6-95,0
12 e mais	97,8	95,1-100,0	92,9	87,7-98,0
Total	94,8	91,1-98,5	80,7	74,8-86,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	93,9	88,4-99,4	91,6	85,7-97,4
35 a 44	95,9	91,8-100,0	89,6	83,6-95,6
45 a 54	96,6	93,6-99,7	89,8	84,7-94,9
55 a 59	97,1	93,1-100,0	92,5	86,9-98,0
Anos de escolaridade				
0 a 8	92,2	86,7-97,7	85,1	78,2-92,1
9 a 11	96,6	93,2-99,9	92,0	87,7-96,2
12 e mais	98,7	97,2-100,0	96,5	94,4-98,6
Total	95,4	92,9-98,0	90,6	87,4-93,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	40,4	32,2-48,6	26,0	15,0-37,0	54,6	42,9-66,4
25 a 34	47,9	41,0-54,8	33,9	25,4-42,3	61,3	50,7-71,9
35 a 44	50,6	44,5-56,7	33,7	25,7-41,8	65,8	57,7-73,9
45 a 54	50,4	44,4-56,3	32,5	24,6-40,5	66,2	58,4-73,9
55 a 64	48,8	41,4-56,1	35,8	24,9-46,6	59,9	51,0-68,8
65 e mais	28,7	22,8-34,5	12,0	6,2-17,8	39,8	31,5-48,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	30,8	25,3-36,3	14,7	7,6-21,8	44,5	36,7-52,4
9 a 11	49,8	45,3-54,3	34,3	28,0-40,5	63,1	57,2-69,1
12 e mais	63,9	60,2-67,7	48,3	42,7-53,9	80,0	75,9-84,2
Total	45,9	42,8-48,9	30,6	26,6-34,6	59,7	55,4-63,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,6	1,8-15,4	8,7	0,0-18,6	8,5	0,0-17,8
25 a 34	8,8	4,9-12,7	8,1	2,9-13,2	9,4	3,6-15,3
35 a 44	18,3	13,5-23,1	18,5	11,1-26,0	18,1	11,9-24,2
45 a 54	30,2	24,7-35,6	25,8	18,0-33,5	34,1	26,5-41,7
55 a 64	44,4	37,0-51,7	42,2	30,3-54,2	46,2	37,2-55,2
65 e mais	63,3	56,5-70,2	57,1	44,8-69,4	67,5	59,7-75,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	31,7	26,4-37,0	25,9	18,0-33,8	36,6	29,5-43,8
9 a 11	14,7	11,9-17,4	13,7	9,6-17,8	15,5	11,7-19,3
12 e mais	14,6	12,0-17,1	16,7	12,7-20,6	12,4	9,1-15,7
Total	21,7	19,3-24,2	19,5	15,9-23,2	23,7	20,4-27,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,6	0,0-1,5	0,3	0,0-0,8	1,0	0,0-2,6
25 a 34	1,1	0,0-3,0	0,4	0,0-1,1	1,8	0,0-5,3
35 a 44	1,7	0,3-3,0	2,2	0,0-4,7	1,2	0,0-2,5
45 a 54	7,8	4,5-11,1	6,7	2,2-11,1	8,9	4,0-13,7
55 a 64	11,4	6,9-15,8	11,1	4,5-17,8	11,6	5,7-17,5
65 e mais	20,0	14,1-26,0	15,6	7,1-24,0	23,0	15,0-31,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,5	4,4-8,6	3,3	1,2-5,4	9,2	5,7-12,7
9 a 11	3,1	1,8-4,4	3,0	0,9-5,1	3,2	1,5-4,8
12 e mais	3,5	2,2-4,8	5,0	2,8-7,2	1,9	0,7-3,1
Total	4,6	3,6-5,6	3,7	2,5-5,0	5,4	3,8-7,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,0-0,7	0,5	0,0-1,4	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,1	0,0-2,5	1,7	0,0-4,1	0,6	0,0-1,7
35 a 44	1,1	0,0-2,7	2,1	0,0-5,3	0,3	0,0-0,9
45 a 54	3,3	1,1-5,4	2,8	0,0-5,6	3,7	0,4-7,0
55 a 64	7,8	3,9-11,6	5,0	0,5-9,6	10,1	4,2-15,9
65 e mais	8,9	4,7-13,1	8,8	1,2-16,4	9,1	4,2-13,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,0	2,3-5,6	3,5	0,8-6,2	4,3	2,3-6,4
9 a 11	1,3	0,5-2,1	1,1	0,0-2,4	1,5	0,6-2,5
12 e mais	1,6	0,6-2,5	2,3	0,8-3,8	0,8	0,0-1,9
Total	2,5	1,7-3,3	2,4	1,2-3,7	2,5	1,6-3,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,4	4,7-16,2	9,9	0,0-19,8	11,0	5,1-16,8
25 a 34	12,6	8,2-17,0	12,5	5,8-19,1	12,7	6,9-18,5
35 a 44	19,7	15,0-24,4	23,4	15,7-31,2	16,3	10,7-21,9
45 a 54	27,8	22,5-33,2	28,0	19,8-36,2	27,7	20,6-34,8
55 a 64	38,0	31,0-45,1	30,2	19,5-40,9	44,7	35,8-53,7
65 e mais	45,7	38,5-52,9	36,5	24,3-48,7	51,8	43,1-60,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,7	18,1-27,2	21,4	13,7-29,2	23,7	18,3-29,1
9 a 11	18,3	14,9-21,7	14,3	9,7-18,9	21,7	16,8-26,6
12 e mais	21,5	18,3-24,7	23,3	18,6-28,0	19,7	15,5-24,0
Total	21,0	18,7-23,4	19,9	16,2-23,6	22,0	19,1-25,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,1	0,0-0,2	0,0	0,0-0,0	0,1	0,0-0,3
35 a 44	1,3	0,1-2,5	0,5	0,0-1,4	2,1	0,0-4,2
45 a 54	5,1	2,4-7,8	0,0	0,0-0,0	9,7	4,8-14,6
55 a 64	9,7	5,5-14,0	3,7	0,0-8,7	14,9	8,5-21,4
65 e mais	25,3	19,1-31,5	12,1	3,1-21,1	34,1	26,0-42,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,5	4,5-8,4	2,1	0,2-4,0	10,1	7,0-13,3
9 a 11	2,4	1,5-3,4	0,2	0,0-0,4	4,4	2,6-6,1
12 e mais	2,1	1,3-2,9	1,1	0,2-2,0	3,1	1,8-4,5
Total	4,0	3,1-4,9	1,2	0,4-2,1	6,5	5,0-8,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,2	4,9-15,6	6,5	0,0-13,8	13,9	6,2-21,7
25 a 34	6,8	3,2-10,4	6,1	0,5-11,6	7,5	2,9-12,1
35 a 44	8,8	4,9-12,8	5,2	1,0-9,4	12,1	5,7-18,4
45 a 54	4,4	2,2-6,6	3,5	0,7-6,2	5,3	1,9-8,6
55 a 64	3,8	1,1-6,4	2,0	0,0-5,1	5,3	1,1-9,4
65 e mais	6,7	3,0-10,4	8,1	1,0-15,3	5,7	1,8-9,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,3	3,8-10,9	5,4	0,2-10,6	9,0	4,2-13,8
9 a 11	8,4	5,8-10,9	5,6	2,5-8,7	10,8	6,9-14,7
12 e mais	6,2	4,2-8,2	5,1	2,5-7,7	7,2	4,2-10,3
Total	7,3	5,6-9,1	5,4	2,9-7,8	9,1	6,6-11,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	53,5	44,8-62,2	55,9	43,0-68,8	51,1	39,5-62,6
25 a 34	41,2	34,7-47,8	35,3	27,1-43,5	46,9	36,8-57,0
35 a 44	53,2	47,1-59,3	54,1	44,8-63,5	52,3	44,3-60,3
45 a 54	65,7	59,9-71,6	61,4	52,4-70,4	69,6	62,0-77,1
55 a 64	64,2	56,6-71,9	64,8	52,3-77,3	63,8	54,4-73,1
65 e mais	70,3	63,1-77,6	64,3	51,2-77,3	74,3	66,3-82,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	38,7	32,7-44,7	35,8	26,4-45,3	41,1	33,5-48,8
9 a 11	51,8	47,3-56,3	49,4	42,7-56,1	53,9	47,7-60,0
12 e mais	81,3	78,1-84,4	78,0	73,2-82,9	84,6	80,7-88,5
Total	54,7	51,5-57,8	52,6	47,9-57,3	56,6	52,3-60,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	79,6	71,0-88,2
26 a 30	88,7	82,1-95,3
31 a 35	82,9	72,7-93,1
36 a 40	82,6	75,3-90,0
41 a 45	60,7	48,9-72,5
46 a 50	61,4	49,8-73,0
Anos de escolaridade		
0 a 8	75,6	66,1-85,0
9 a 11	79,7	73,8-85,5
12 e mais	77,0	72,0-82,0
Total	66,8	61,0-72,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,3	5,9-16,6	7,0	0,0-14,1	15,5	7,6-23,3
25 a 34	17,6	12,1-23,1	10,7	4,5-16,9	24,2	15,3-33,0
35 a 44	24,6	19,1-30,0	18,1	9,6-26,5	30,4	23,2-37,5
45 a 54	24,1	19,1-29,2	13,8	8,3-19,3	33,3	25,6-40,9
55 a 64	16,0	10,9-21,2	7,5	1,6-13,4	23,4	15,7-31,1
65 e mais	18,6	12,7-24,6	10,9	1,1-20,7	23,8	16,3-31,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,3	14,5-24,1	11,4	4,8-18,1	26,1	19,3-32,8
9 a 11	15,3	12,2-18,4	8,1	4,5-11,1	21,5	16,7-26,3
12 e mais	21,8	18,6-24,9	15,7	11,6-19,8	28,0	23,2-32,7
Total	18,8	16,4-21,2	11,7	8,6-14,9	25,2	21,7-28,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	78,4	55,0-100,0	97,5	91,9-100,0	69,9	39,7-100,0
25 a 34	83,6	71,7-95,5	91,7	79,9-100,0	80,1	64,1-96,1
35 a 44	84,8	76,6-93,0	89,4	76,6-100,0	82,4	72,1-92,7
45 a 54	92,3	85,8-98,8	92,2	83,1-100,0	92,3	84,2-100,0
55 a 64	88,8	78,7-98,8	84,2	55,6-100,0	90,0	80,0-100,0
65 e mais	86,9	68,5-100,0	55,6	3,1-100,0	96,4	91,3-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	84,0	73,6-94,4	92,9	79,2-100,0	80,7	67,8-93,6
9 a 11	86,9	80,0-93,8	93,8	84,5-100,0	84,7	76,1-93,2
12 e mais	87,1	81,0-93,2	83,1	71,3-94,8	89,4	82,6-96,1
Total	85,7	80,5-90,9	89,1	81,4-96,7	84,3	77,8-90,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,3	0,6-10,0	9,6	0,0-19,3	1,5	0,0-3,1
25 a 34	13,2	7,1-19,2	23,9	12,3-35,5	4,0	0,5-7,4
35 a 44	14,3	9,3-19,3	20,6	11,6-29,6	9,0	4,4-13,7
45 a 54	12,8	8,3-17,2	12,2	5,4-18,9	13,3	7,3-19,2
55 a 64	14,4	9,2-19,6	13,5	4,8-22,1	15,1	8,7-21,5
65 e mais	13,3	8,2-18,4	18,8	8,6-28,9	9,9	4,8-15,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,2	10,4-18,0	21,3	13,9-28,6	8,3	5,4-11,2
9 a 11	7,6	5,5-9,8	11,7	7,6-15,8	4,5	2,6-6,4
12 e mais	8,5	6,1-10,9	8,2	4,8-11,6	8,7	5,3-12,1
Total	11,7	9,3-14,0	17,1	12,5-21,7	7,2	5,4-9,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,6	9,1-30,1	14,5	3,3-25,8	24,0	7,7-40,4
25 a 34	18,9	10,8-27,0	17,8	7,7-27,8	19,9	7,7-32,1
35 a 44	20,9	15,9-25,9	25,4	17,1-33,7	17,2	11,3-23,1
45 a 54	43,4	36,2-50,6	45,9	35,1-56,8	41,3	31,8-50,9
55 a 64	42,6	34,8-50,4	54,4	41,3-67,5	33,9	25,0-42,8
65 e mais	35,0	28,5-41,6	42,7	30,9-54,6	30,3	22,7-37,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	31,0	25,3-36,7	29,8	22,1-37,4	32,1	23,9-40,3
9 a 11	18,3	15,2-21,3	21,6	16,5-26,7	15,7	12,1-19,4
12 e mais	19,4	15,9-22,8	24,8	19,0-30,6	14,8	10,9-18,7
Total	26,0	22,5-29,6	26,9	22,1-31,8	25,3	20,1-30,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,1	0,0-0,4	0,3	0,0-0,8	0,0	0,0-0,0
25 a 34	3,1	0,4-5,9	3,7	0,0-8,2	2,7	0,0-6,0
35 a 44	3,8	0,7-6,9	6,6	0,4-12,7	1,5	0,0-3,7
45 a 54	4,5	1,5-7,4	3,6	0,6-6,5	5,2	0,4-9,9
55 a 64	7,0	3,0-10,9	11,5	3,2-19,8	3,7	0,8-6,5
65 e mais	4,5	1,3-7,8	6,5	0,0-13,1	3,3	0,0-6,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,1	2,3-6,0	5,1	1,9-8,3	3,3	1,2-5,4
9 a 11	1,6	0,6-2,6	3,1	0,9-5,3	0,4	0,0-0,8
12 e mais	2,4	1,1-3,7	2,7	0,7-4,7	2,1	0,3-4,0
Total	3,2	2,0-4,3	4,3	2,2-6,3	2,3	1,1-3,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	38,9	28,2-49,6	43,9	28,0-59,9	34,4	20,6-48,3
25 a 34	47,7	38,8-56,6	46,4	33,1-59,7	48,9	37,0-60,7
35 a 44	32,1	26,3-38,0	34,1	25,0-43,3	30,4	22,9-38,0
45 a 54	31,2	24,5-37,8	32,8	22,7-43,0	29,8	21,0-38,6
55 a 64	34,3	26,7-42,0	38,4	25,1-51,8	31,3	22,6-40,0
65 e mais	28,0	21,7-34,4	27,9	16,9-38,9	28,1	20,4-35,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	39,1	33,0-45,2	43,0	33,8-52,3	35,9	27,8-44,0
9 a 11	38,4	34,2-42,5	36,9	30,7-43,1	39,5	33,9-45,0
12 e mais	27,0	23,2-30,8	27,5	21,6-33,5	26,6	21,6-31,5
Total	37,5	33,6-41,4	39,5	33,5-45,4	35,9	30,8-41,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	28,0	17,3-38,8	28,7	14,2-43,2	27,4	11,6-43,2
25 a 34	39,4	30,7-48,2	48,5	34,9-62,1	31,3	20,9-41,8
35 a 44	54,8	48,3-61,3	64,4	54,4-74,4	45,4	37,1-53,7
45 a 54	58,9	51,6-66,2	60,4	49,2-71,6	57,6	47,9-67,3
55 a 64	62,2	54,3-70,1	62,0	48,6-75,4	62,4	53,0-71,8
65 e mais	46,5	39,0-54,0	48,6	36,1-61,2	45,1	35,8-54,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	47,1	40,7-53,6	47,0	37,5-56,4	47,3	38,4-56,1
9 a 11	41,7	37,5-45,9	52,8	46,3-59,3	33,1	27,9-38,3
12 e mais	45,0	40,6-49,4	60,5	53,8-67,1	31,8	26,5-37,1
Total	45,3	41,3-49,2	50,3	44,2-56,3	40,8	35,6-46,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,3	0,8-3,8	3,6	0,8-6,4	1,1	0,0-2,6
25 a 34	14,7	8,8-20,6	14,3	5,3-23,2	15,1	7,2-22,9
35 a 44	18,6	13,9-23,4	19,1	12,3-25,8	18,2	11,5-24,8
45 a 54	25,1	18,1-32,0	28,4	18,0-38,7	22,3	12,8-31,7
55 a 64	21,5	14,7-28,3	19,5	8,3-30,7	23,2	14,8-31,5
65 e mais	14,1	8,7-19,4	11,7	3,7-19,7	15,7	8,6-22,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,3	12,4-20,2	15,1	9,5-20,7	17,4	11,9-22,8
9 a 11	13,0	10,3-15,7	15,0	10,6-19,5	11,4	8,0-14,9
12 e mais	12,0	9,2-14,8	15,2	10,6-19,8	9,2	5,8-12,7
Total	14,8	12,4-17,2	15,1	11,5-18,7	14,4	11,2-17,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,8	12,4-31,3	17,6	7,2-28,1	25,5	10,8-40,2
25 a 34	32,2	23,7-40,8	25,9	14,9-36,9	37,6	25,4-49,7
35 a 44	27,7	22,4-33,0	27,0	19,0-34,9	28,3	21,3-35,4
45 a 54	34,3	27,7-40,8	27,6	18,7-36,4	39,6	30,4-48,8
55 a 64	27,7	20,9-34,5	28,1	16,3-40,0	27,4	19,4-35,3
65 e mais	42,2	35,4-49,0	40,1	28,4-51,8	43,5	35,2-51,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	28,3	22,7-33,8	22,2	15,2-29,2	33,3	25,2-41,4
9 a 11	26,7	23,1-30,3	25,2	19,9-30,6	27,9	23,0-32,8
12 e mais	43,4	39,1-47,7	43,0	36,3-49,7	43,7	38,2-49,3
Total	29,6	26,1-33,1	25,5	20,9-30,2	32,9	27,9-38,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,2	6,2-20,2	14,3	4,2-24,4	12,2	2,5-22,0
25 a 34	16,2	10,1-22,3	19,2	8,7-29,6	13,6	6,9-20,4
35 a 44	13,6	9,6-17,6	14,1	7,9-20,2	13,2	8,0-18,5
45 a 54	16,2	11,3-21,1	11,2	5,9-16,6	20,2	12,6-27,7
55 a 64	13,2	8,6-17,9	12,3	4,7-19,9	13,9	8,1-19,8
65 e mais	17,2	12,3-22,1	17,1	8,6-25,5	17,3	11,3-23,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,7	9,7-17,7	14,3	7,9-20,7	13,2	8,1-18,3
9 a 11	13,5	10,8-16,2	13,4	9,2-17,6	13,6	10,0-17,1
12 e mais	23,7	19,9-27,4	23,7	17,8-29,6	23,6	18,9-28,3
Total	14,8	12,2-17,4	15,2	11,1-19,3	14,5	11,2-17,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	37,5	27,1-47,8	52,4	36,7-68,1	24,4	12,3-36,4
25 a 34	40,1	31,6-48,6	51,0	37,7-64,3	30,8	20,6-40,9
35 a 44	32,0	26,0-38,0	41,0	31,2-50,8	24,5	17,5-31,5
45 a 54	24,4	18,4-30,3	32,2	22,4-41,9	18,1	10,7-25,5
55 a 64	22,4	15,8-28,9	30,4	18,6-42,2	16,5	9,3-23,7
65 e mais	14,4	9,3-19,4	24,2	13,7-34,6	8,2	3,6-12,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	33,4	27,7-39,2	45,3	36,1-54,5	23,6	17,0-30,1
9 a 11	32,0	28,1-35,9	42,3	36,1-48,6	24,1	19,1-29,0
12 e mais	25,9	22,0-29,9	35,1	28,5-41,8	18,2	13,8-22,5
Total	32,2	28,5-35,8	43,3	37,3-49,2	23,1	18,9-27,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	63,1	52,4-73,8	66,0	51,1-80,8	60,7	45,5-75,8
25 a 34	61,9	53,2-70,6	60,6	47,0-74,1	63,0	51,9-74,1
35 a 44	53,4	47,2-59,6	53,6	43,9-63,3	53,2	45,3-61,2
45 a 54	53,0	45,9-60,2	49,8	39,0-60,5	55,6	46,2-65,1
55 a 64	41,0	33,4-48,6	35,8	23,6-47,9	44,8	35,5-54,2
65 e mais	44,1	37,1-51,0	39,0	27,2-50,9	47,2	38,7-55,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	53,5	47,5-59,6	50,8	41,6-60,0	55,9	47,9-63,9
9 a 11	63,3	59,2-67,3	66,2	60,2-72,2	61,0	55,6-66,4
12 e mais	51,6	47,2-55,9	55,3	48,6-61,9	48,4	42,8-54,0
Total	56,1	52,2-59,9	55,5	49,7-61,4	56,5	51,4-61,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	31,9	21,6-42,2	31,7	17,4-46,1	32,0	17,3-46,8
25 a 34	24,1	16,6-31,7	29,9	17,8-42,0	19,2	9,9-28,5
35 a 44	17,8	12,8-22,8	16,9	9,8-24,1	18,5	11,6-25,5
45 a 54	14,1	9,7-18,6	18,6	11,0-26,1	10,6	5,4-15,8
55 a 64	12,0	6,4-17,6	18,4	7,3-29,5	7,3	2,6-12,1
65 e mais	6,9	3,5-10,3	7,0	0,9-13,1	6,8	2,8-10,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,7	16,3-27,1	23,3	15,2-31,5	20,3	13,0-27,6
9 a 11	22,6	19,0-26,1	27,3	21,6-32,9	19,0	14,5-23,5
12 e mais	12,4	9,5-15,2	16,5	11,6-21,4	8,9	5,8-12,1
Total	20,8	17,4-24,3	23,6	18,4-28,8	18,6	14,0-23,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,6	12,1-25,1	24,6	14,0-35,1	13,4	5,3-21,4
25 a 34	11,9	7,3-16,5	16,1	7,7-24,5	8,3	4,0-12,7
35 a 44	15,1	11,1-19,2	19,7	12,4-26,9	11,3	7,1-15,5
45 a 54	16,2	11,6-20,8	16,5	9,9-23,0	16,0	9,6-22,3
55 a 64	15,2	9,9-20,5	15,0	6,4-23,7	15,3	8,7-21,9
65 e mais	13,2	8,9-17,5	21,9	12,8-31,1	7,8	3,9-11,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,7	7,6-13,9	14,3	8,7-19,8	7,8	4,3-11,3
9 a 11	20,5	17,2-23,8	25,8	20,3-31,2	16,5	12,4-20,6
12 e mais	23,9	20,2-27,7	29,5	23,4-35,5	19,3	14,7-23,9
Total	15,1	12,8-17,3	19,2	15,4-23,1	11,7	9,1-14,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	39,6	28,3-50,8	45,6	29,6-61,7	34,3	18,6-49,9
25 a 34	54,5	45,9-63,1	61,2	48,5-73,9	48,7	36,9-60,6
35 a 44	43,6	37,4-49,8	55,1	45,6-64,6	34,0	26,6-41,3
45 a 54	42,6	35,6-49,6	56,8	45,9-67,7	31,2	22,5-39,9
55 a 64	25,5	18,6-32,4	43,2	30,1-56,4	12,5	7,1-17,9
65 e mais	12,5	7,7-17,2	19,5	9,9-29,2	8,1	3,4-12,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	45,8	39,6-51,9	59,4	50,5-68,3	34,4	25,9-42,9
9 a 11	36,1	32,0-40,1	40,8	34,6-46,9	32,4	27,1-37,8
12 e mais	32,8	28,7-36,9	35,7	29,2-42,2	30,4	25,2-35,7
Total	41,5	37,5-45,5	51,4	45,6-57,3	33,4	28,0-38,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,5	0,6-12,4	10,8	0,0-22,8	2,7	0,5-4,9
25 a 34	12,8	6,7-18,9	14,6	4,7-24,4	11,3	3,8-18,7
35 a 44	14,2	9,6-18,7	20,1	12,1-28,1	9,2	4,4-14,0
45 a 54	13,1	7,6-18,5	17,2	8,3-26,1	9,7	3,2-16,3
55 a 64	8,0	3,5-12,5	11,8	3,3-20,4	5,2	0,7-9,8
65 e mais	2,1	0,5-3,6	3,1	0,0-6,1	1,4	0,0-3,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,4	8,4-16,3	18,4	11,3-25,5	7,3	3,5-11,2
9 a 11	8,8	6,3-11,3	9,0	5,4-12,6	8,6	5,3-12,0
12 e mais	4,6	2,7-6,5	5,0	2,1-8,0	4,2	1,7-6,8
Total	10,4	8,0-12,9	14,2	9,8-18,7	7,3	4,8-9,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,1	22,2-44,0	16,6	2,1-31,1	47,5	32,3-62,6
25 a 34	33,4	24,8-41,9	6,6	0,2-13,0	56,1	44,8-67,5
35 a 44	39,1	33,0-45,1	10,4	4,7-16,2	63,0	55,6-70,5
45 a 54	46,5	39,3-53,6	14,7	7,1-22,4	71,9	63,9-79,9
55 a 64	34,9	27,8-42,1	15,1	6,7-23,4	49,5	40,2-58,8
65 e mais	24,7	18,9-30,5	13,0	5,3-20,8	32,0	24,2-39,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,5	35,5-47,5	13,1	6,2-19,9	65,3	57,4-73,1
9 a 11	32,7	28,9-36,6	12,3	8,3-16,4	48,4	42,8-54,0
12 e mais	13,7	10,8-16,6	5,6	2,8-8,4	20,5	15,9-25,1
Total	35,7	32,0-39,5	12,0	7,6-16,3	55,2	50,1-60,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,1	11,4-30,7	39,0	22,5-55,5	5,4	1,9-8,9
25 a 34	21,6	14,4-28,9	39,1	26,2-52,1	6,7	1,3-12,1
35 a 44	21,6	16,3-26,9	37,6	28,1-47,1	8,2	3,6-12,8
45 a 54	13,9	9,6-18,3	26,0	17,4-34,6	4,3	1,2-7,3
55 a 64	6,3	2,9-9,7	9,2	2,7-15,7	4,2	0,6-7,8
65 e mais	4,0	1,3-6,8	10,1	3,2-17,0	0,3	0,0-0,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,4	12,2-22,5	33,8	24,5-43,2	3,6	0,8-6,4
9 a 11	17,0	13,8-20,1	28,1	22,4-33,8	8,4	5,3-11,5
12 e mais	22,1	18,3-25,8	38,0	31,3-44,6	8,7	5,6-11,8
Total	17,8	14,6-21,0	32,8	26,8-38,7	5,6	3,7-7,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,9	0,1-1,6	1,8	0,3-3,4	0,0	0,0-0,0
25 a 34	2,6	0,0-5,3	2,5	0,4-4,6	2,6	0,0-7,3
35 a 44	2,1	0,5-3,7	4,3	0,9-7,8	0,2	0,0-0,6
45 a 54	1,2	0,3-2,1	2,6	0,6-4,7	0,0	0,0-0,0
55 a 64	0,3	0,0-0,8	0,6	0,0-1,9	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,9	0,0-2,1	0,7	0,0-1,8	1,0	0,0-3,1
9 a 11	1,8	0,7-2,9	4,2	1,6-6,7	0,0	0,0-0,0
12 e mais	3,7	2,1-5,4	7,1	3,9-10,3	0,9	0,0-2,1
Total	1,5	0,7-2,3	2,4	1,4-3,5	0,7	0,0-2,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,1	0,0-8,1	0,4	0,0-1,1	5,5	0,0-14,6
25 a 34	4,4	1,3-7,5	2,5	0,0-6,8	6,0	1,5-10,5
35 a 44	2,9	0,6-5,3	2,8	0,0-5,7	3,0	0,0-6,5
45 a 54	5,8	1,9-9,7	3,1	0,0-7,8	8,0	2,1-13,9
55 a 64	8,3	4,1-12,5	3,5	0,0-7,7	11,8	5,4-18,2
65 e mais	6,0	2,6-9,4	2,3	0,0-5,5	8,2	3,2-13,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,3	3,6-8,9	3,2	0,7-5,6	8,9	4,5-13,3
9 a 11	1,8	0,6-2,9	1,0	0,0-2,1	2,4	0,5-4,2
12 e mais	1,3	0,3-2,4	0,2	0,0-0,6	2,3	0,5-4,1
Total	4,4	2,8-6,1	2,2	0,7-3,7	6,2	3,6-8,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	86,9	80,9-93,0	66,6	57,5-75,6
60 a 69	76,0	67,3-84,7	56,2	46,2-66,3
Anos de escolaridade				
0 a 8	81,1	74,4-87,7	57,1	48,0-66,2
9 a 11	85,3	77,8-92,9	73,4	63,9-82,8
12 e mais	93,4	87,6-99,3	87,4	79,7-95,1
Total	83,0	77,9-88,0	62,8	55,9-69,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	67,5	55,2-79,7	66,0	53,9-78,2
35 a 44	85,1	78,9-91,2	78,6	71,6-85,6
45 a 54	91,9	86,1-97,7	86,3	79,5-93,2
55 a 59	91,4	85,1-97,7	77,3	67,3-87,3
Anos de escolaridade				
0 a 8	77,4	68,2-86,6	71,0	61,9-80,2
9 a 11	81,5	75,3-87,8	79,1	72,8-85,4
12 e mais	88,5	84,0-93,0	85,1	80,3-89,9
Total	80,0	74,3-85,8	75,2	69,4-81,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	36,5	26,1-46,9	16,3	8,3-24,4	54,1	39,1-69,0
25 a 34	31,9	23,8-40,0	19,7	10,5-28,9	42,3	30,6-54,1
35 a 44	38,1	32,3-43,8	24,1	16,8-31,4	49,7	41,8-57,7
45 a 54	34,2	27,7-40,6	20,0	12,8-27,1	45,5	36,1-54,9
55 a 64	23,8	17,5-30,2	17,2	6,7-27,7	28,7	20,8-36,6
65 e mais	21,2	15,9-26,4	16,1	7,7-24,6	24,3	17,6-31,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	26,0	20,4-31,6	11,9	6,7-17,2	37,8	29,5-46,1
9 a 11	39,3	35,3-43,4	26,2	20,8-31,6	49,4	43,9-55,0
12 e mais	53,8	49,5-58,1	42,4	35,7-49,0	63,3	58,0-68,7
Total	33,1	29,5-36,6	19,5	15,7-23,3	44,2	39,0-49,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,6	0,0-8,0	4,5	0,0-12,3	2,7	0,0-7,4
25 a 34	9,6	4,5-14,7	9,7	1,5-17,9	9,6	3,2-16,0
35 a 44	17,0	12,4-21,6	17,2	10,4-24,0	16,8	10,5-23,1
45 a 54	34,5	27,5-41,6	29,9	20,5-39,3	38,3	28,4-48,1
55 a 64	49,9	42,1-57,6	44,8	31,7-58,0	53,5	44,4-62,7
65 e mais	54,7	47,8-61,6	47,1	35,0-59,2	59,5	51,3-67,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,0	20,7-29,3	20,2	14,0-26,4	29,1	23,0-35,1
9 a 11	11,4	9,1-13,7	11,8	8,3-15,3	11,1	8,1-14,1
12 e mais	15,4	12,2-18,6	21,0	15,4-26,6	10,7	7,4-14,0
Total	20,0	17,4-22,6	18,0	14,1-21,9	21,7	18,2-25,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,1	0,0-0,2	0,2	0,0-0,5	0,0	0,0-0,0
35 a 44	5,2	2,1-8,3	5,6	0,9-10,3	4,9	0,7-9,1
45 a 54	8,1	3,7-12,5	7,2	2,0-12,3	8,9	2,2-15,6
55 a 64	16,7	10,8-22,5	12,8	4,6-21,0	19,5	11,5-27,4
65 e mais	21,3	15,5-27,1	16,3	8,0-24,5	24,4	16,6-32,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,3	5,4-9,3	5,5	2,9-8,0	8,9	5,9-11,9
9 a 11	1,6	0,9-2,3	1,6	0,5-2,7	1,6	0,6-2,6
12 e mais	3,5	2,1-5,0	4,5	2,1-7,0	2,7	1,0-4,3
Total	5,3	4,1-6,5	4,3	2,7-5,9	6,1	4,3-7,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,5	0,0-6,3	5,4	0,0-13,4	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,8	0,0-2,1	0,4	0,0-1,1	1,2	0,0-3,5
35 a 44	2,9	0,7-5,1	2,9	0,0-6,4	2,9	0,1-5,7
45 a 54	2,0	0,0-4,1	3,0	0,0-6,7	1,2	0,0-3,6
55 a 64	7,8	3,4-12,2	10,0	1,9-18,1	6,1	1,4-10,8
65 e mais	5,5	2,6-8,5	5,6	0,5-10,7	5,5	1,8-9,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,7	1,8-5,6	4,4	0,8-7,9	3,1	1,4-4,9
9 a 11	1,5	0,6-2,4	2,5	0,6-4,3	0,7	0,0-1,5
12 e mais	1,0	0,3-1,8	1,9	0,3-3,5	0,3	0,0-0,8
Total	2,7	1,6-3,9	3,6	1,3-5,8	2,1	1,0-3,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,7	0,7-6,6	3,3	0,5-6,2	4,0	0,0-8,8
25 a 34	6,4	3,0-9,9	3,3	0,9-5,7	9,2	3,1-15,2
35 a 44	15,4	11,3-19,4	13,7	8,2-19,2	16,8	10,9-22,6
45 a 54	28,7	22,1-35,3	27,7	18,0-37,3	29,6	20,6-38,6
55 a 64	34,6	27,4-41,9	16,4	7,6-25,2	48,0	38,7-57,3
65 e mais	40,1	33,3-46,9	23,9	13,2-34,6	50,2	41,7-58,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,6	13,3-19,8	8,6	5,2-11,9	23,2	17,9-28,5
9 a 11	11,5	9,1-13,9	11,6	7,7-15,5	11,4	8,3-14,5
12 e mais	21,5	17,8-25,2	23,9	17,9-29,8	19,5	15,0-24,0
Total	15,7	13,6-17,8	11,2	8,7-13,7	19,4	16,2-22,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,5	0,0-1,2	1,1	0,6-2,7	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,4	0,0-3,9	0,0	0,0-0,0	2,5	0,0-7,2
35 a 44	1,6	0,0-3,2	0,0	0,0-0,0	2,9	0,0-5,9
45 a 54	8,1	3,0-13,2	1,7	0,0-4,4	13,2	4,7-21,8
55 a 64	10,8	6,6-15,0	0,0	0,0-0,0	18,8	11,8-25,7
65 e mais	25,4	19,6-31,1	6,0	0,9-11,1	37,4	29,3-45,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,6	4,6-8,6	0,9	0,0-1,7	11,4	7,7-15,1
9 a 11	2,0	1,1-3,0	1,0	0,0-2,3	2,9	1,6-4,1
12 e mais	2,4	1,1-3,6	0,8	0,0-2,1	3,6	1,6-5,7
Total	4,8	3,6-6,0	0,9	0,2-1,5	8,0	5,8-10,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,9	0,0-8,9	2,0	0,3-3,7	5,6	0,0-14,7
25 a 34	4,6	0,9-8,3	3,4	0,0-7,9	5,7	0,0-11,3
35 a 44	0,5	0,0-1,0	0,5	0,0-1,2	0,5	0,0-1,1
45 a 54	4,0	0,5-7,5	4,0	0,0-9,0	3,9	0,0-8,8
55 a 64	5,2	1,8-8,6	3,0	0,0-7,1	6,9	1,9-11,9
65 e mais	2,2	0,6-3,9	1,3	0,0-3,3	2,8	0,4-5,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,1	1,5-6,7	2,2	0,0-4,5	5,7	1,3-10,0
9 a 11	1,8	0,8-2,9	2,2	0,2-4,1	1,6	0,4-2,7
12 e mais	3,2	1,6-4,7	3,3	0,7-5,9	3,0	1,2-4,9
Total	3,4	1,7-5,0	2,3	0,8-3,9	4,2	1,5-6,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	34,7	25,0-44,4	31,9	18,7-45,1	37,2	23,2-51,1
25 a 34	39,2	30,9-47,6	46,7	33,3-60,2	32,9	23,4-42,5
35 a 44	36,4	30,8-42,0	40,2	31,1-49,4	33,1	26,3-40,0
45 a 54	39,3	32,8-45,8	36,2	26,9-45,6	41,7	32,8-50,7
55 a 64	41,5	34,0-49,0	41,1	28,4-53,8	41,8	32,8-50,8
65 e mais	50,8	43,8-57,8	46,8	34,9-58,6	53,4	44,9-61,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	27,0	21,7-32,4	28,4	19,8-37,0	25,9	19,2-32,5
9 a 11	45,1	41,0-49,3	46,5	40,2-52,8	44,1	38,6-49,6
12 e mais	82,6	79,3-86,0	83,3	78,4-88,2	82,1	77,5-86,6
Total	38,7	35,1-42,3	40,0	34,3-45,6	37,7	33,1-42,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	68,0	56,4-79,6
26 a 30	68,3	50,7-85,8
31 a 35	67,2	54,0-80,3
36 a 40	73,7	63,4-84,0
41 a 45	60,9	49,0-72,8
46 a 50	57,3	42,4-72,2
Anos de escolaridade		
0 a 8	70,5	60,6-80,4
9 a 11	60,7	54,3-67,0
12 e mais	67,8	61,8-73,8
Total	73,2	68,4-78,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,6	4,1-19,0	12,8	1,9-23,7	10,4	0,3-20,6
25 a 34	7,2	4,4-9,9	4,7	1,7-7,7	9,2	4,8-13,7
35 a 44	12,1	8,0-16,3	9,0	3,6-14,4	14,8	8,7-20,8
45 a 54	19,2	12,7-25,7	11,7	3,3-20,1	25,2	15,9-34,5
55 a 64	13,6	8,2-19,0	11,1	1,7-20,5	15,4	9,1-21,8
65 e mais	13,5	8,9-18,1	8,3	2,0-14,6	16,8	10,5-23,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,9	8,3-15,5	8,9	3,8-14,0	14,4	9,3-19,6
9 a 11	11,7	8,8-14,5	10,7	6,5-14,9	12,4	8,6-16,2
12 e mais	12,3	9,6-15,0	7,4	4,2-10,6	16,4	12,3-20,6
Total	11,9	9,5-14,2	9,2	5,9-12,5	14,1	10,8-17,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	50,6	15,8-85,4	52,3	6,1-98,5	48,7	0,0-100,0
25 a 34	53,6	34,0-73,3	41,0	11,8-70,1	58,5	34,4-82,7
35 a 44	72,3	57,8-86,8	92,2	80,5-100,0	61,9	41,3-82,6
45 a 54	81,3	65,6-97,0	89,3	72,6-100,0	78,1	57,8-98,5
55 a 64	67,7	48,2-87,3	58,1	14,5-100,0	72,8	53,4-92,2
65 e mais	85,1	71,6-98,5	69,3	34,5-100,0	90,2	76,6-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	68,5	51,4-85,6	71,4	41,9-100,0	67,0	46,1-87,8
9 a 11	57,6	44,2-71,1	54,2	32,5-75,9	59,8	42,6-77,1
12 e mais	82,0	71,8-92,1	85,4	69,3-100,0	80,7	68,1-93,2
Total	67,1	56,1-78,1	67,4	48,6-86,3	66,9	53,4-80,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,5	3,0-18,1	11,7	4,4-18,9	9,5	0,0-22,4
25 a 34	13,1	8,0-18,1	19,1	10,0-28,1	7,7	3,0-12,4
35 a 44	17,1	12,8-21,5	20,1	13,2-27,0	14,6	9,3-20,0
45 a 54	18,4	13,7-23,0	20,0	12,5-27,6	16,9	11,2-22,7
55 a 64	14,6	9,5-19,7	16,9	8,1-25,7	12,7	6,9-18,5
65 e mais	10,0	5,8-14,3	12,5	5,2-19,8	8,3	3,1-13,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,0	14,4-23,7	21,6	15,4-27,9	16,6	9,9-23,3
9 a 11	8,7	6,3-11,0	11,2	7,5-14,9	6,7	3,7-9,7
12 e mais	8,5	5,8-11,2	12,9	7,9-17,8	4,7	2,2-7,3
Total	14,0	11,5-16,6	17,1	13,4-20,7	11,4	7,9-14,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,8	0,8-14,8	6,1	1,7-10,6	9,3	0,0-22,2
25 a 34	17,0	11,6-22,5	23,3	13,5-33,1	11,4	6,5-16,3
35 a 44	20,2	15,6-24,8	26,9	19,2-34,6	14,4	9,3-19,6
45 a 54	28,9	23,6-34,2	35,1	26,3-43,9	23,5	17,3-29,7
55 a 64	31,5	25,1-38,0	38,7	27,9-49,5	25,5	18,2-32,7
65 e mais	38,6	31,0-46,1	57,6	45,2-70,1	25,1	17,2-32,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,5	18,7-28,4	28,6	22,0-35,3	18,8	12,0-25,6
9 a 11	17,0	13,9-20,1	21,8	16,5-27,2	13,3	9,8-16,8
12 e mais	13,5	10,2-16,8	18,0	12,2-23,8	9,6	6,2-12,9
Total	19,9	17,1-22,6	24,9	20,9-28,8	15,5	11,9-19,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,7	0,0-10,4	0,1	0,0-0,3	7,0	0,0-19,8
25 a 34	6,0	2,3-9,7	7,7	1,3-14,1	4,5	0,5-8,4
35 a 44	6,0	3,2-8,8	9,1	4,0-14,3	3,3	0,5-6,1
45 a 54	8,8	5,3-12,2	12,6	6,3-18,9	5,5	2,1-8,8
55 a 64	8,1	4,3-11,9	13,0	5,8-20,1	3,9	0,5-7,3
65 e mais	1,4	0,0-2,7	2,8	0,0-5,9	0,4	0,0-1,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,6	4,9-12,4	9,7	5,6-13,9	7,6	1,4-13,7
9 a 11	2,1	1,0-3,1	2,8	1,2-4,4	1,5	0,1-2,9
12 e mais	3,5	1,8-5,3	5,6	2,3-9,0	1,7	0,2-3,1
Total	5,7	3,7-7,7	7,0	4,6-9,4	4,6	1,4-7,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	52,4	40,0-64,8	53,7	40,8-66,6	51,2	30,2-72,1
25 a 34	42,2	35,8-48,6	38,6	28,5-48,7	45,5	37,5-53,4
35 a 44	36,1	30,7-41,5	36,9	28,8-45,1	35,3	28,1-42,5
45 a 54	28,0	22,8-33,3	27,8	19,7-35,9	28,2	21,5-35,0
55 a 64	28,5	22,0-34,9	32,1	21,4-42,8	25,4	17,6-33,1
65 e mais	23,1	16,2-29,9	28,0	15,5-40,6	19,5	12,1-26,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,9	35,0-48,9	42,7	34,5-50,9	41,3	30,1-52,4
9 a 11	37,0	32,8-41,2	37,2	31,1-43,4	36,8	31,1-42,4
12 e mais	32,6	28,1-37,1	31,3	24,3-38,3	33,7	27,9-39,5
Total	38,9	34,8-42,9	39,2	34,2-44,2	38,6	32,4-44,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	32,2	16,9-47,5	29,6	17,9-41,2	34,8	7,5-62,1
25 a 34	41,6	34,9-48,3	52,6	42,1-63,2	30,8	23,2-38,4
35 a 44	48,1	42,4-53,7	54,4	46,1-62,7	42,3	34,7-49,9
45 a 54	55,0	49,1-61,0	61,0	52,0-70,1	49,4	41,7-57,1
55 a 64	56,2	49,0-63,4	55,0	43,9-66,1	57,4	48,3-66,4
65 e mais	50,1	41,9-58,4	47,5	34,5-60,4	52,5	42,0-63,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	50,0	42,9-57,0	47,4	39,3-55,5	52,8	41,5-64,2
9 a 11	38,5	34,4-42,7	48,9	42,5-55,3	30,3	25,1-35,4
12 e mais	39,4	34,7-44,2	52,2	44,6-59,8	28,0	22,6-33,4
Total	44,4	40,4-48,5	48,6	43,7-53,6	40,4	33,9-47,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,1	0,0-13,5	2,1	0,0-4,3	10,1	0,0-24,4
25 a 34	7,5	4,3-10,7	10,4	4,6-16,2	4,6	1,8-7,4
35 a 44	13,0	9,2-16,8	10,6	6,0-15,3	15,1	9,3-21,0
45 a 54	15,1	10,9-19,4	13,6	7,4-19,7	16,6	10,8-22,4
55 a 64	20,3	14,7-26,0	16,6	9,0-24,3	24,0	15,9-32,2
65 e mais	21,0	13,7-28,3	13,9	3,2-24,6	27,3	17,5-37,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,9	8,8-17,1	8,8	5,1-12,4	17,5	9,7-25,3
9 a 11	9,6	7,4-11,9	8,7	5,6-11,9	10,4	7,2-13,6
12 e mais	9,7	6,9-12,6	14,1	8,9-19,2	5,8	3,1-8,5
Total	11,3	9,0-13,6	9,6	7,3-12,0	12,9	9,1-16,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	36,1	22,1-50,1	25,2	14,0-36,4	46,2	24,2-68,3
25 a 34	27,1	21,7-32,6	17,8	9,7-25,9	35,5	28,2-42,8
35 a 44	33,3	28,2-38,4	26,2	18,9-33,6	39,3	32,4-46,3
45 a 54	37,6	32,0-43,2	27,1	19,0-35,2	46,7	39,3-54,1
55 a 64	38,9	32,3-45,5	31,2	21,2-41,3	45,4	36,8-54,0
65 e mais	48,2	40,6-55,7	37,7	25,7-49,6	55,6	46,3-64,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	31,3	24,2-38,4	22,5	15,9-29,2	39,4	28,2-50,7
9 a 11	34,1	30,1-38,1	23,6	18,3-28,8	42,4	36,8-48,0
12 e mais	44,9	40,2-49,6	35,3	28,1-42,5	53,2	47,2-59,2
Total	34,4	30,5-38,3	24,9	20,8-29,0	42,6	36,7-48,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,6	9,7-23,4	20,8	9,8-31,7	12,7	5,5-19,9
25 a 34	18,5	13,7-23,3	15,5	7,4-23,5	21,2	15,5-26,9
35 a 44	21,9	17,5-26,3	19,9	13,3-26,6	23,6	17,8-29,5
45 a 54	22,0	17,3-26,7	14,5	8,0-21,0	28,4	21,8-35,0
55 a 64	27,2	21,1-33,2	22,1	12,9-31,3	31,5	23,5-39,4
65 e mais	26,2	19,7-32,7	20,4	10,8-30,0	30,3	21,7-38,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,5	12,6-20,4	17,4	11,0-23,8	15,7	11,2-20,1
9 a 11	21,8	18,3-25,3	16,2	11,4-20,9	26,2	21,2-31,1
12 e mais	30,9	26,5-35,3	25,7	19,0-32,4	35,4	29,8-41,1
Total	20,5	18,0-23,0	18,4	14,5-22,3	22,4	19,0-25,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	40,6	28,6-52,6	53,0	39,9-66,0	29,1	11,3-46,9
25 a 34	48,1	41,6-54,5	58,2	47,8-68,5	39,1	31,1-47,0
35 a 44	42,9	37,4-48,4	60,7	52,7-68,6	27,7	21,0-34,4
45 a 54	45,3	39,4-51,3	59,7	50,6-68,7	32,9	25,8-40,0
55 a 64	38,2	31,3-45,1	53,7	42,8-64,6	25,1	17,5-32,8
65 e mais	36,3	28,8-43,8	49,0	36,1-61,8	27,4	19,3-35,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	48,2	41,7-54,8	63,1	55,3-70,9	34,5	25,3-43,7
9 a 11	39,6	35,5-43,8	53,4	47,0-59,7	28,9	23,6-34,1
12 e mais	34,3	29,7-38,8	42,0	34,5-49,5	27,5	22,1-32,9
Total	43,3	39,6-46,9	56,8	51,9-61,6	31,5	26,5-36,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	69,4	60,3-78,5	67,0	55,3-78,6	71,6	58,4-84,8
25 a 34	61,3	55,0-67,5	67,2	57,5-76,9	56,0	48,1-63,9
35 a 44	54,2	48,7-59,6	50,6	42,3-58,9	57,2	50,1-64,3
45 a 54	55,6	49,8-61,5	52,5	43,2-61,9	58,3	51,0-65,6
55 a 64	60,4	53,7-67,1	65,8	55,5-76,1	55,9	47,2-64,6
65 e mais	62,5	55,2-69,8	63,4	51,4-75,4	61,9	52,8-71,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	62,6	56,9-68,3	60,3	52,7-67,9	64,7	56,6-72,8
9 a 11	61,5	57,3-65,6	63,2	57,0-69,4	60,2	54,6-65,7
12 e mais	53,8	49,1-58,5	60,4	53,1-67,8	48,0	42,1-54,0
Total	60,8	57,5-64,2	61,2	56,6-65,8	60,5	55,7-65,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,5	23,2-43,8	50,2	37,1-63,4	18,0	8,8-27,2
25 a 34	30,6	24,4-36,7	35,6	25,6-45,6	26,1	18,5-33,7
35 a 44	25,4	20,5-30,2	31,5	23,7-39,3	20,1	14,2-26,0
45 a 54	15,6	11,3-19,9	19,9	12,5-27,4	11,9	7,2-16,6
55 a 64	13,6	8,9-18,3	18,8	10,2-27,4	9,2	4,5-13,8
65 e mais	8,7	4,2-13,2	10,1	2,1-18,2	7,7	2,5-12,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	24,2	19,0-29,5	33,6	25,4-41,8	15,5	10,3-20,7
9 a 11	28,8	24,8-32,7	35,9	29,8-42,1	23,1	18,1-28,2
12 e mais	21,2	17,3-25,1	26,6	20,0-33,2	16,5	12,0-21,0
Total	25,2	22,1-28,3	33,2	28,3-38,1	18,2	14,9-21,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,1	11,8-26,5	30,4	18,6-42,2	8,7	3,2-14,3
25 a 34	12,2	8,7-15,7	10,8	6,0-15,6	13,5	8,5-18,4
35 a 44	15,9	11,9-20,0	17,5	11,0-24,1	14,5	9,5-19,5
45 a 54	16,9	12,4-21,4	17,5	10,6-24,5	16,4	10,6-22,2
55 a 64	18,1	12,3-23,9	24,0	13,8-34,2	13,0	7,0-19,1
65 e mais	12,0	7,2-16,8	10,5	2,6-18,5	13,1	7,2-19,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,9	9,3-16,4	14,3	8,3-20,3	11,6	7,7-15,5
9 a 11	16,6	13,4-19,7	21,0	15,8-26,2	13,1	9,2-16,9
12 e mais	23,4	19,3-27,4	30,5	23,6-37,5	17,1	12,7-21,6
Total	15,7	13,5-18,0	18,9	15,1-22,7	13,0	10,5-15,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	50,3	37,7-63,0	62,4	50,7-74,1	39,2	15,4-62,9
25 a 34	49,0	42,6-55,5	59,1	48,8-69,3	40,1	32,1-48,0
35 a 44	55,2	49,8-60,6	67,3	59,8-74,9	44,9	37,7-52,1
45 a 54	46,3	40,4-52,2	57,9	48,7-67,0	36,2	29,2-43,3
55 a 64	34,5	27,8-41,2	51,7	40,7-62,7	20,0	13,5-26,5
65 e mais	11,8	7,1-16,6	19,7	10,3-29,2	6,2	1,8-10,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	52,5	46,0-59,0	67,3	60,1-74,6	38,8	27,3-50,2
9 a 11	42,0	37,8-46,2	53,2	46,8-59,5	33,2	27,9-38,6
12 e mais	36,7	32,1-41,3	39,2	31,9-46,6	34,6	28,9-40,3
Total	46,6	42,8-50,5	58,5	53,9-63,2	36,2	30,0-42,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,5	6,6-20,5	21,3	9,2-33,5	6,3	1,8-10,7
25 a 34	17,7	12,5-22,9	20,5	11,2-29,8	15,2	10,1-20,3
35 a 44	11,0	7,4-14,5	8,6	3,8-13,4	13,0	7,9-18,1
45 a 54	10,0	6,7-13,2	12,7	7,1-18,2	7,6	3,8-11,4
55 a 64	9,6	5,2-14,1	14,5	6,0-23,1	5,5	2,1-8,9
65 e mais	2,8	0,3-5,3	2,8	0,0-7,0	2,7	0,0-5,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,5	9,5-17,6	19,9	12,7-27,1	7,6	4,6-10,7
9 a 11	13,2	10,2-16,2	12,8	8,3-17,3	13,5	9,4-17,5
12 e mais	8,1	5,6-10,5	6,2	3,0-9,4	9,7	6,1-13,3
Total	12,5	10,2-14,9	15,5	11,3-19,7	9,9	7,7-12,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	38,2	23,8-52,7	15,9	6,3-25,5	59,0	41,1-76,9
25 a 34	41,7	35,4-47,9	15,8	8,5-23,0	64,8	57,5-72,1
35 a 44	46,6	41,1-52,1	14,4	8,3-20,5	74,1	68,3-79,9
45 a 54	39,1	33,5-44,7	8,5	3,9-13,2	65,5	58,5-72,5
55 a 64	38,2	31,7-44,8	14,7	7,8-21,6	58,1	49,4-66,8
65 e mais	32,4	25,5-39,2	16,9	7,8-26,0	43,3	34,1-52,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	47,5	40,8-54,2	15,5	9,7-21,2	77,2	71,3-83,1
9 a 11	37,0	33,0-41,0	13,4	9,2-17,6	55,5	49,8-61,2
12 e mais	26,0	22,0-30,0	13,1	7,8-18,5	37,2	31,5-42,9
Total	40,7	36,7-44,7	14,5	11,0-17,9	63,5	58,9-68,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,1	13,4-30,8	37,5	24,2-50,8	7,9	2,6-13,2
25 a 34	20,6	15,4-25,8	33,5	23,9-43,1	9,1	4,7-13,4
35 a 44	16,2	12,1-20,3	25,8	18,5-33,1	8,0	3,9-12,1
45 a 54	16,3	11,8-20,8	27,8	19,5-36,1	6,3	2,7-9,9
55 a 64	7,1	3,8-10,4	13,0	6,3-19,7	2,1	0,3-3,9
65 e mais	1,3	0,0-2,6	2,3	0,0-5,1	0,6	0,0-1,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,5	11,0-20,0	26,8	18,9-34,6	5,1	2,4-7,7
9 a 11	18,0	14,6-21,4	28,5	22,6-34,4	9,8	6,2-13,3
12 e mais	20,0	16,0-24,0	34,5	27,3-41,7	7,3	4,1-10,5
Total	17,0	14,4-19,7	28,5	23,8-33,2	7,0	5,1-8,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,4	1,4-5,4	6,7	2,7-10,7	0,4	0,0-1,2
25 a 34	3,6	0,7-6,6	7,7	1,6-13,8	0,0	0,0-0,0
35 a 44	2,5	0,8-4,2	5,5	1,9-9,1	0,0	0,0-0,0
45 a 54	2,0	0,1-3,9	4,2	0,2-8,3	0,0	0,0-0,0
55 a 64	1,2	0,0-2,4	2,5	0,0-5,2	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,7	0,0-1,7	1,6	0,0-4,2	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,7	0,2-3,3	3,6	0,4-6,9	0,0	0,0-0,0
9 a 11	3,5	1,9-5,1	7,6	4,1-11,0	0,3	0,0-0,8
12 e mais	4,3	2,4-6,2	9,2	5,2-13,2	0,0	0,0-0,0
Total	2,7	1,7-3,7	5,7	1,1-7,9	0,1	0,0-0,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,3	0,0-0,8	0,0	0,0-0,0	0,6	0,0-1,5
25 a 34	2,6	1,0-4,2	0,2	0,0-0,6	4,7	1,7-7,7
35 a 44	4,7	2,4-6,9	4,6	1,1-8,2	4,7	1,8-7,6
45 a 54	4,3	1,9-6,7	2,2	0,0-5,3	6,0	2,5-9,6
55 a 64	7,2	3,6-10,8	5,9	0,8-11,0	8,3	3,3-13,3
65 e mais	10,4	6,1-14,8	7,0	1,0-13,0	12,8	6,9-18,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,0	3,5-6,5	3,7	1,8-5,6	6,2	3,8-8,6
9 a 11	2,3	1,2-3,4	0,5	0,0-1,2	3,8	1,9-5,6
12 e mais	1,8	0,5-3,1	0,5	0,0-1,6	2,9	0,7-5,1
Total	3,6	2,8-4,5	2,2	1,2-3,3	4,9	3,5-6,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	91,2	86,0-96,4	82,8	76,4-89,1
60 a 69	89,9	84,0-95,8	63,9	54,1-73,7
Anos de escolaridade				
0 a 8	88,2	82,5-93,8	71,3	63,7-78,8
9 a 11	92,3	86,6-98,0	80,0	70,7-89,2
12 e mais	100,0	0,0-100,0	90,4	83,0-97,9
Total	90,7	86,8-94,6	75,7	70,2-81,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	83,1	77,3-88,9	76,3	68,9-83,7
35 a 44	90,5	85,7-95,3	84,6	79,1-90,1
45 a 54	93,1	88,9-97,3	87,6	82,5-92,7
55 a 59	98,1	95,2-100,0	88,4	80,9-95,9
Anos de escolaridade				
0 a 8	85,5	80,3-90,7	77,3	70,8-83,9
9 a 11	91,2	87,2-95,1	86,6	82,1-91,0
12 e mais	92,7	89,4-96,1	87,8	83,6-92,0
Total	88,6	85,7-91,6	82,2	78,5-85,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	27,2	19,0-35,3	20,6	11,8-29,5	33,2	18,2-48,3
25 a 34	36,7	30,8-42,6	16,6	9,4-23,9	54,6	46,7-62,5
35 a 44	40,9	35,6-46,3	24,3	17,1-31,4	55,2	47,9-62,4
45 a 54	38,1	32,5-43,6	19,2	12,2-26,2	54,4	46,9-61,9
55 a 64	31,7	25,5-37,9	14,7	6,9-22,4	46,0	37,3-54,7
65 e mais	25,2	19,1-31,4	10,6	3,0-18,1	35,6	27,0-44,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,1	20,7-29,6	12,4	7,3-17,5	36,9	28,6-45,2
9 a 11	40,2	36,0-44,3	24,1	18,7-29,6	52,8	47,1-58,5
12 e mais	53,0	48,2-57,7	31,8	24,6-38,9	71,5	66,0-76,9
Total	34,4	31,3-37,5	19,1	15,6-22,6	47,8	42,3-53,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,9	0,4-3,3	3,3	0,6-6,1	0,5	0,0-1,2
25 a 34	7,7	4,5-10,9	9,1	4,3-13,9	6,5	2,2-10,7
35 a 44	16,5	12,5-20,6	16,7	10,4-22,9	16,4	11,1-21,7
45 a 54	31,5	26,1-37,0	30,0	21,5-38,4	32,9	25,9-39,9
55 a 64	50,0	43,1-57,0	44,5	33,6-55,3	54,7	46,1-63,4
65 e mais	66,2	59,1-73,3	66,3	54,2-78,3	66,2	57,5-74,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,9	19,9-27,8	20,7	15,8-25,6	26,8	20,4-33,2
9 a 11	13,0	10,6-15,5	15,3	11,0-19,5	11,3	8,5-14,0
12 e mais	14,7	11,6-17,8	17,0	11,7-22,3	12,7	9,1-16,3
Total	18,9	16,8-21,1	18,5	15,5-21,5	19,4	16,4-22,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,6	0,1-1,1	0,0	0,0-0,0	1,1	0,1-2,1
35 a 44	2,0	0,6-3,4	2,0	0,0-4,3	2,0	0,4-3,6
45 a 54	5,8	3,0-8,6	7,7	2,7-12,7	4,2	1,4-7,1
55 a 64	10,7	6,4-15,0	10,9	4,2-17,7	10,4	4,9-16,0
65 e mais	21,7	15,1-28,3	24,5	12,6-36,4	19,7	12,3-27,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,2	3,7-6,7	5,4	3,0-7,7	5,0	3,1-6,9
9 a 11	1,8	1,0-2,6	1,4	0,4-2,3	2,2	1,0-3,3
12 e mais	2,7	1,2-4,3	3,3	0,5-6,2	2,2	0,6-3,8
Total	3,7	2,9-4,5	3,8	2,5-5,2	3,6	2,6-4,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,1	0,0-0,3	0,2	0,0-0,6	0,0	0,0-0,0
35 a 44	0,9	0,0-1,8	0,4	0,0-1,2	1,3	0,0-3,0
45 a 54	3,9	1,4-6,4	2,9	0,0-6,2	4,8	1,2-8,4
55 a 64	4,5	0,8-8,1	8,4	0,8-16,0	1,2	0,0-2,6
65 e mais	9,0	4,7-13,3	11,8	4,2-19,3	7,1	1,9-12,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,5	1,4-3,6	2,4	0,8-4,0	2,5	1,0-4,0
9 a 11	0,8	0,3-1,3	0,9	0,1-1,7	0,8	0,1-1,4
12 e mais	1,1	0,1-2,0	2,0	0,1-4,0	0,2	0,0-0,5
Total	1,7	1,1-2,3	1,9	1,0-2,9	1,6	0,8-2,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,9	2,1-7,6	5,1	0,9-9,3	4,7	1,1-8,2
25 a 34	8,3	5,1-11,4	8,3	3,3-13,3	8,3	4,3-12,2
35 a 44	15,8	11,9-19,8	14,1	8,5-19,8	17,3	11,7-22,9
45 a 54	22,7	17,8-27,7	15,5	8,5-22,6	29,0	22,2-35,8
55 a 64	36,4	29,7-43,1	26,1	16,6-35,6	45,1	36,3-53,9
65 e mais	33,7	26,6-40,8	20,9	11,0-30,8	42,7	33,5-52,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,7	12,6-18,8	11,2	7,3-15,1	19,9	14,7-25,0
9 a 11	13,9	11,1-16,7	12,0	8,1-16,0	15,3	11,5-19,2
12 e mais	15,8	12,4-19,2	14,4	9,1-19,7	17,0	12,6-21,5
Total	15,1	13,2-17,1	12,0	9,4-14,5	17,9	15,0-20,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,2	0,0-0,6	0,0	0,0-0,0	0,4	0,0-1,1
35 a 44	0,9	0,0-2,1	0,0	0,0-0,0	1,7	0,0-3,9
45 a 54	3,0	1,2-4,7	0,4	0,0-1,3	5,2	2,0-8,3
55 a 64	8,3	4,8-11,9	2,5	0,0-5,9	13,3	7,6-19,0
65 e mais	22,7	16,6-28,9	3,7	0,0-7,7	36,2	27,2-45,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,3	3,1-5,6	0,7	0,1-1,4	7,7	5,1-10,3
9 a 11	1,1	0,5-1,6	0,3	0,0-0,7	1,7	0,7-2,6
12 e mais	1,7	0,7-2,6	0,0	0,0-0,0	3,1	1,4-4,8
Total	2,9	2,2-3,5	0,5	0,1-0,9	4,9	3,7-6,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,1	0,8-3,5	1,9	0,0-3,8	2,4	0,3-4,4
25 a 34	4,0	0,8-7,2	4,7	0,0-10,9	3,4	1,0-5,9
35 a 44	3,5	1,6-5,5	2,1	0,0-4,8	4,8	2,0-7,5
45 a 54	2,5	0,9-4,0	1,6	0,0-3,5	3,2	0,9-5,5
55 a 64	4,5	1,7-7,4	5,2	0,5-9,9	4,0	0,4-7,6
65 e mais	6,1	2,8-9,3	0,0	0,0-0,0	10,4	5,0-15,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,1	1,3-4,9	3,1	0,0-6,5	3,1	1,6-4,6
9 a 11	3,3	1,9-4,7	1,6	0,2-3,0	4,7	2,4-6,9
12 e mais	4,7	2,7-6,7	3,9	1,0-6,7	5,4	2,6-8,3
Total	3,4	2,4-4,5	2,8	0,9-4,7	4,0	2,8-5,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	40,3	29,2-51,4	46,9	33,8-60,0	34,2	18,8-49,5
25 a 34	36,3	30,2-42,3	36,7	26,7-46,6	35,9	28,6-43,1
35 a 44	45,8	40,4-51,2	45,9	37,6-54,2	45,8	38,7-52,9
45 a 54	49,2	43,3-55,1	47,9	38,6-57,2	50,4	42,9-57,8
55 a 64	55,5	48,5-62,4	49,5	38,5-60,5	60,5	51,9-69,0
65 e mais	62,3	54,9-69,6	61,7	49,7-73,7	62,7	53,5-71,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,4	24,2-34,6	30,4	22,7-38,2	28,5	21,6-35,4
9 a 11	50,7	46,5-55,0	54,2	47,8-60,6	48,0	42,3-53,7
12 e mais	80,0	76,1-83,9	77,6	71,3-84,0	82,2	77,4-86,9
Total	44,4	40,8-47,9	45,2	40,3-50,0	43,7	38,5-48,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	75,6	64,5-86,7
26 a 30	78,5	70,5-86,5
31 a 35	74,6	64,1-85,1
36 a 40	73,2	63,9-82,5
41 a 45	63,7	53,4-74,1
46 a 50	65,1	54,7-75,5
Anos de escolaridade		
0 a 8	79,5	71,5-87,5
9 a 11	67,5	61,5-73,5
12 e mais	69,8	63,6-75,9
Total	61,0	54,8-67,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,4	0,0-29,7	4,8	0,0-10,8	23,2	0,0-49,7
25 a 34	18,2	13,1-23,3	11,0	3,4-18,6	24,7	17,8-31,5
35 a 44	13,3	9,8-16,7	8,9	4,7-13,2	16,9	11,7-22,2
45 a 54	19,2	14,8-23,7	11,1	5,6-16,6	26,3	19,8-32,9
55 a 64	19,5	14,1-24,9	15,9	7,8-24,0	22,6	15,3-29,8
65 e mais	13,1	8,2-18,0	6,7	1,3-12,0	17,8	10,5-25,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,9	11,7-26,0	11,5	6,5-16,6	25,7	13,5-37,9
9 a 11	11,3	8,7-13,8	4,8	2,5-7,2	16,3	12,3-20,3
12 e mais	17,1	13,7-20,5	9,6	5,3-13,9	23,7	18,7-28,6
Total	16,2	12,2-20,1	9,2	6,3-12,1	22,2	15,7-28,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	85,5	60,7-100,0	25,2	0,0-66,0	97,1	91,1-100,0
25 a 34	61,9	46,1-77,8	50,2	12,6-87,8	66,7	51,2-82,2
35 a 44	74,8	62,5-87,1	67,0	42,5-91,4	78,4	64,7-92,0
45 a 54	82,0	71,2-92,7	80,2	55,4-100,0	82,6	71,1-94,1
55 a 64	88,2	77,3-99,2	75,3	49,9-100,0	95,9	89,7-100,0
65 e mais	94,7	84,7-100,0	100,0	100,0-100,0	93,3	80,6-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	71,6	56,1-87,1	49,7	26,7-72,7	80,9	66,7-95,0
9 a 11	84,4	75,7-93,1	87,3	70,6-100,0	83,7	73,7-93,7
12 e mais	85,7	77,4-94,0	82,9	63,5-100,0	86,6	77,8-95,5
Total	76,9	68,0-85,8	61,2	43,8-78,6	82,6	74,3-90,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,8	0,0-31,8	27,0	0,0-59,9	1,9	0,1-3,7
25 a 34	12,5	6,7-18,3	17,8	7,2-28,4	8,0	2,3-13,6
35 a 44	8,7	4,9-12,5	13,1	6,2-20,1	4,9	1,2-8,6
45 a 54	12,9	8,5-17,4	14,4	7,3-21,6	11,8	6,1-17,4
55 a 64	10,1	5,7-14,6	12,8	5,8-19,8	8,2	2,3-14,0
65 e mais	8,5	4,7-12,3	13,7	5,5-21,8	5,4	2,0-8,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,2	6,2-22,1	22,0	6,4-37,5	7,5	4,1-10,8
9 a 11	8,3	5,7-10,9	12,4	7,6-17,2	5,2	2,4-7,9
12 e mais	8,4	5,8-10,9	12,8	7,9-17,7	4,9	2,7-7,1
Total	11,5	7,0-16,0	17,8	8,7-26,9	6,3	4,3-8,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	15,3	1,9-28,7	21,4	0,0-46,4	9,7	0,0-20,4
25 a 34	11,3	5,4-17,1	9,7	2,9-16,4	12,6	3,5-21,7
35 a 44	24,0	18,1-30,0	22,9	13,8-32,1	25,0	17,2-32,8
45 a 54	43,0	36,4-49,6	52,8	42,7-62,9	35,2	26,8-43,6
55 a 64	44,7	37,3-52,0	58,3	46,4-70,1	34,6	25,8-43,3
65 e mais	39,1	32,5-45,8	58,3	47,0-69,6	27,6	19,9-35,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	31,0	24,2-37,8	34,5	22,3-46,7	28,0	20,9-35,1
9 a 11	15,6	12,6-18,5	18,8	13,6-24,0	13,1	9,7-16,5
12 e mais	18,5	15,4-21,6	24,5	19,0-29,9	13,7	10,4-17,1
Total	24,5	20,7-28,3	28,5	21,6-35,5	21,1	17,2-25,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,2	0,0-29,6	23,5	0,0-57,5	0,0	0,0-0,0
25 a 34	5,5	0,9-10,0	8,5	0,0-17,3	2,9	0,0-6,6
35 a 44	4,6	1,5-7,6	7,3	1,6-13,0	2,3	0,0-5,1
45 a 54	5,8	2,6-9,0	5,6	1,7-9,6	5,9	1,1-10,7
55 a 64	3,3	0,9-5,8	5,4	0,6-10,1	1,8	0,0-4,3
65 e mais	1,8	0,1-3,5	3,3	0,0-7,3	0,9	0,0-2,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,8	0,8-16,9	15,5	0,0-31,6	3,1	0,8-5,4
9 a 11	2,9	1,3-4,5	4,6	1,8-7,4	1,6	0,0-3,3
12 e mais	2,8	1,0-4,6	5,0	1,3-8,7	1,1	0,0-2,2
Total	6,1	1,6-10,6	10,8	1,3-20,2	2,3	0,9-3,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	50,9	35,5-66,3	45,8	17,1-74,6	55,5	41,1-69,9
25 a 34	43,6	35,0-52,2	45,5	32,1-59,0	42,0	31,0-52,9
35 a 44	34,7	28,4-41,0	31,7	22,2-41,3	37,3	29,0-45,5
45 a 54	33,4	27,0-39,7	30,8	21,1-40,5	35,4	27,0-43,8
55 a 64	24,2	17,8-30,5	14,9	6,9-22,8	31,1	22,2-40,0
65 e mais	18,4	13,2-23,6	21,9	12,1-31,6	16,3	10,4-22,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	43,1	35,0-51,1	41,6	27,2-56,0	44,3	35,7-53,0
9 a 11	33,9	29,6-38,2	32,0	25,5-38,4	35,4	29,7-41,1
12 e mais	29,6	26,0-33,3	27,0	21,3-32,7	31,7	26,9-36,6
Total	38,1	33,4-42,9	36,5	27,9-45,1	39,5	34,4-44,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,6	9,1-30,2	18,0	4,1-31,8	21,5	6,2-36,7
25 a 34	38,0	29,5-46,6	43,9	30,8-57,1	31,8	20,8-42,9
35 a 44	55,5	48,9-62,0	62,8	52,6-73,0	48,8	40,4-57,2
45 a 54	58,6	51,9-65,3	60,5	50,4-70,7	56,9	48,0-65,8
55 a 64	67,9	60,5-75,3	71,1	59,4-82,9	65,3	55,9-74,8
65 e mais	59,7	52,6-66,9	57,6	45,9-69,3	61,3	52,4-70,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	49,7	41,1-58,4	44,4	31,2-57,6	55,6	46,1-65,1
9 a 11	37,9	33,5-42,4	43,0	35,9-50,1	33,9	28,3-39,5
12 e mais	42,9	38,8-47,0	61,6	55,3-67,8	27,6	23,1-32,2
Total	44,9	40,4-49,5	47,1	39,2-55,0	42,9	38,0-47,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,0	1,0-13,0	10,0	0,0-21,5	3,7	0,6-6,8
25 a 34	8,6	3,7-13,5	13,0	4,3-21,8	4,0	0,3-7,8
35 a 44	19,8	13,9-25,7	24,7	14,9-34,5	15,4	8,7-22,0
45 a 54	16,0	11,2-20,7	16,1	9,2-22,9	15,9	9,3-22,5
55 a 64	24,5	18,3-30,7	24,6	14,9-34,3	24,5	16,4-32,5
65 e mais	17,8	11,9-23,8	10,8	4,1-17,5	23,0	14,3-31,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,9	11,1-20,6	16,3	8,3-24,2	15,4	10,5-20,3
9 a 11	11,9	9,1-14,7	14,2	9,5-18,9	10,1	6,7-13,5
12 e mais	11,5	9,0-14,0	17,9	13,2-22,5	6,3	3,8-8,7
Total	13,9	11,3-16,4	16,0	11,4-20,6	11,8	9,3-14,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,7	11,1-36,3	28,4	4,4-52,4	19,5	9,5-29,5
25 a 34	37,9	29,7-46,2	35,0	22,5-47,5	40,4	29,6-51,2
35 a 44	36,5	30,3-42,6	39,0	28,9-49,0	34,3	26,8-41,8
45 a 54	40,0	33,7-46,2	37,0	27,7-46,4	42,4	33,9-50,8
55 a 64	49,1	41,7-56,5	44,7	32,9-56,5	52,3	43,0-61,7
65 e mais	47,1	40,4-53,9	37,5	26,7-48,2	52,9	44,6-61,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	33,5	26,6-40,5	31,8	19,6-44,0	34,9	27,4-42,5
9 a 11	32,4	28,2-36,5	31,1	24,7-37,6	33,3	27,9-38,7
12 e mais	52,3	48,3-56,4	54,4	48,0-60,8	50,7	45,5-55,8
Total	36,5	32,4-40,6	35,5	28,3-42,8	37,3	32,8-41,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,7	4,3-29,2	21,4	0,0-45,2	12,5	3,3-21,6
25 a 34	22,1	15,2-29,0	20,7	10,2-31,1	23,3	14,1-32,5
35 a 44	20,9	16,0-25,9	23,5	15,1-31,9	18,8	13,2-24,4
45 a 54	20,9	15,9-26,0	17,1	10,0-24,3	24,0	17,0-30,9
55 a 64	27,2	20,6-33,9	24,5	15,0-34,1	29,2	20,2-38,2
65 e mais	18,1	12,9-23,2	13,5	6,6-20,3	20,8	13,9-27,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,2	11,9-24,4	19,3	7,9-30,7	17,2	11,1-23,3
9 a 11	18,5	15,1-21,8	16,5	11,3-21,7	20,0	15,6-24,4
12 e mais	31,5	27,7-35,3	32,2	25,9-38,6	31,0	26,3-35,6
Total	20,6	17,0-24,2	20,8	14,1-27,4	20,4	16,8-24,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	26,9	14,6-39,2	30,1	9,0-51,2	24,0	9,4-38,7
25 a 34	32,8	24,6-40,9	52,0	38,8-65,2	16,5	9,1-23,9
35 a 44	29,1	23,2-35,0	35,8	25,9-45,8	23,4	16,4-30,4
45 a 54	25,1	18,9-31,3	37,7	27,4-48,0	15,1	8,5-21,7
55 a 64	20,1	13,9-26,3	33,4	21,7-45,2	10,2	5,1-15,4
65 e mais	15,6	10,5-20,7	27,1	16,5-37,6	8,7	4,2-13,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	28,0	21,4-34,7	38,8	26,5-51,2	18,7	11,5-26,0
9 a 11	27,1	23,0-31,2	37,0	30,1-43,9	19,6	14,9-24,4
12 e mais	24,2	20,6-27,8	37,8	31,6-44,1	13,3	9,6-17,0
Total	27,1	23,2-30,9	38,2	30,9-45,4	18,0	13,9-22,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	55,7	39,7-71,6	58,9	29,2-88,7	52,7	37,5-67,8
25 a 34	44,1	35,9-52,3	43,7	30,9-56,5	44,4	33,8-54,9
35 a 44	50,1	43,5-56,6	54,4	43,8-64,9	46,4	38,3-54,5
45 a 54	42,0	35,4-48,5	44,4	34,4-54,4	40,1	31,4-48,8
55 a 64	42,1	34,6-49,5	39,1	27,2-51,0	44,3	34,8-53,8
65 e mais	34,1	27,7-40,5	30,5	20,3-40,8	36,3	28,1-44,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	38,8	31,4-46,3	40,1	26,9-53,3	37,8	29,7-45,8
9 a 11	60,1	55,7-64,5	62,1	55,4-68,9	58,6	52,8-64,4
12 e mais	49,1	45,0-53,1	53,8	47,4-60,2	45,3	40,1-50,5
Total	46,6	42,2-51,0	48,4	40,4-56,3	45,2	40,4-50,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,9	8,1-21,8	9,8	3,2-16,4	19,6	9,3-29,9
25 a 34	15,5	9,4-21,7	18,3	8,4-28,2	13,1	5,4-20,8
35 a 44	12,0	7,7-16,4	14,2	7,0-21,4	10,2	5,1-15,4
45 a 54	9,8	5,4-14,2	10,5	4,4-16,6	9,3	3,1-15,5
55 a 64	7,3	3,4-11,2	9,4	2,5-16,2	5,7	1,2-10,3
65 e mais	3,2	0,7-5,6	5,0	0,0-10,2	2,1	0,0-4,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,1	7,1-15,2	9,9	4,2-15,5	12,3	6,7-17,8
9 a 11	16,1	12,7-19,6	19,6	13,8-25,4	13,5	9,3-17,7
12 e mais	8,7	6,6-10,7	11,1	7,4-14,8	6,7	4,4-9,0
Total	12,1	9,7-14,5	12,7	9,0-16,4	11,6	8,4-14,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,2	6,1-14,3	13,5	4,8-22,1	7,2	3,3-11,0
25 a 34	20,9	13,9-28,0	26,3	14,4-38,2	16,4	8,4-24,4
35 a 44	12,1	8,4-15,8	12,6	7,1-18,1	11,7	6,7-16,8
45 a 54	11,6	8,3-15,0	11,9	6,9-16,9	11,4	6,8-16,0
55 a 64	17,2	12,3-22,1	20,2	11,7-28,7	15,0	9,3-20,6
65 e mais	16,9	12,1-21,8	22,4	12,9-31,9	13,6	8,5-18,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,5	6,8-14,2	11,1	4,7-17,5	10,0	5,7-14,2
9 a 11	18,8	15,2-22,5	25,5	19,2-31,8	13,8	9,7-17,9
12 e mais	21,3	18,0-24,6	26,3	20,7-32,0	17,2	13,5-21,0
Total	14,7	12,3-17,2	17,6	13,2-22,0	12,4	9,7-15,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	31,6	13,6-49,5	51,2	23,6-78,8	13,8	4,5-23,0
25 a 34	43,8	35,4-52,3	52,1	38,9-65,4	36,8	26,6-47,1
35 a 44	38,7	32,4-45,0	43,0	32,6-53,3	35,1	27,4-42,8
45 a 54	42,3	35,7-48,9	52,8	42,8-62,8	34,0	25,8-42,2
55 a 64	29,4	22,3-36,5	48,2	36,1-60,2	15,4	8,5-22,4
65 e mais	11,0	6,4-15,6	22,6	12,1-33,1	4,0	1,2-6,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	35,5	27,1-43,9	53,1	39,8-66,5	20,3	13,8-26,8
9 a 11	38,0	33,5-42,6	43,9	36,8-51,1	33,6	27,8-39,3
12 e mais	33,1	29,3-36,9	35,5	29,3-41,6	31,2	26,4-36,0
Total	35,8	31,0-40,6	47,6	39,4-55,8	26,1	22,1-30,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,6	1,1-4,2	3,2	0,3-6,1	2,1	0,5-3,8
25 a 34	14,2	7,4-20,9	17,8	6,3-29,2	11,1	3,5-18,7
35 a 44	7,1	4,1-10,1	6,3	1,6-11,1	7,8	4,0-11,5
45 a 54	8,9	4,8-13,0	9,9	3,5-16,2	8,1	2,8-13,5
55 a 64	12,4	6,8-18,0	22,7	11,7-33,6	4,7	0,1-9,4
65 e mais	4,5	1,4-7,5	9,2	2,0-16,5	1,6	0,0-3,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	9,5	5,8-13,2	13,6	6,8-20,4	5,9	2,0-9,8
9 a 11	8,3	5,7-10,8	8,0	4,1-12,0	8,4	5,1-11,7
12 e mais	5,3	3,4-7,3	5,0	2,1-7,8	5,7	3,0-8,3
Total	8,4	6,2-10,6	10,6	6,7-14,5	6,6	4,2-9,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,9	12,2-33,6	3,1	0,2-6,1	40,8	25,6-56,0
25 a 34	46,1	37,5-54,6	17,0	6,7-27,2	70,7	62,2-79,2
35 a 44	35,6	29,4-41,9	16,6	8,1-25,1	51,7	43,5-59,8
45 a 54	38,5	31,8-45,1	12,3	5,3-19,2	59,3	51,1-67,6
55 a 64	35,7	28,7-42,7	14,6	6,5-22,7	51,4	42,0-60,8
65 e mais	18,3	13,3-23,4	11,8	3,8-19,8	22,3	15,8-28,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	38,0	30,9-45,0	13,4	6,9-19,8	59,1	51,0-67,3
9 a 11	38,9	34,4-43,4	15,7	10,0-21,4	56,5	50,6-62,3
12 e mais	16,2	13,4-18,9	4,3	2,2-6,5	25,6	21,2-30,0
Total	34,4	30,4-38,4	12,4	8,5-16,3	52,4	47,6-57,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	24,5	7,3-41,7	41,6	12,0-71,2	9,0	1,8-16,2
25 a 34	21,3	14,3-28,4	32,2	19,8-44,5	12,2	5,2-19,2
35 a 44	20,4	15,1-25,7	33,4	23,7-43,1	9,4	4,7-14,1
45 a 54	19,7	14,3-25,0	34,1	24,3-43,9	8,2	3,8-12,5
55 a 64	7,0	3,5-10,5	13,3	5,5-21,0	2,4	0,7-4,1
65 e mais	5,0	2,1-7,8	13,1	5,8-20,4	0,1	0,0-0,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,6	10,4-26,9	32,6	17,6-47,6	6,7	2,4-11,0
9 a 11	17,7	14,1-21,2	26,3	20,2-32,4	11,1	7,0-15,2
12 e mais	22,2	18,6-25,8	39,1	32,7-45,6	8,8	5,8-11,7
Total	19,0	14,4-23,6	32,0	23,4-40,7	8,3	5,7-11,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,6	0,4-2,8	3,2	0,3-6,1	0,2	0,0-0,5
25 a 34	2,0	0,0-4,0	4,2	0,0-8,7	0,1	0,0-0,2
35 a 44	2,0	0,4-3,6	4,4	0,8-8,0	0,0	0,0-0,0
45 a 54	4,3	2,0-6,7	9,0	3,9-14,1	0,6	0,0-1,5
55 a 64	1,0	0,0-2,1	2,3	0,0-4,9	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,9	0,0-2,1	2,5	0,0-5,6	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,3	0,1-2,5	2,8	0,2-5,4	0,0	0,0-0,0
9 a 11	1,9	0,8-3,0	4,5	2,0-7,0	0,0	0,0-0,0
12 e mais	4,6	2,9-6,3	9,4	5,8-13,1	0,8	0,0-1,6
Total	2,1	1,3-2,8	4,4	2,6-6,2	0,1	0,0-0,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,7	0,0-19,8	15,9	0,0-39,9	0,4	0,0-1,1
25 a 34	1,5	0,0-3,6	0,4	0,0-1,1	2,6	0,0-6,2
35 a 44	3,6	0,7-6,5	3,9	0,0-9,5	3,3	0,8-5,9
45 a 54	4,7	1,6-7,9	6,0	0,4-11,6	3,7	0,3-7,1
55 a 64	7,0	2,8-11,2	7,1	1,2-13,0	6,9	1,0-12,8
65 e mais	6,9	3,5-10,3	3,8	0,0-8,3	8,8	4,2-13,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,0	1,7-12,2	9,8	0,0-20,6	4,6	2,2-7,0
9 a 11	2,8	1,4-4,3	2,7	0,6-4,8	2,9	0,9-5,0
12 e mais	0,7	0,1-1,3	0,8	0,0-1,9	0,7	0,0-1,3
Total	4,7	1,8-7,7	6,3	0,1-12,5	3,4	2,0-4,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	90,9	85,7-96,0	65,7	56,3-75,0
60 a 69	81,8	73,7-89,9	60,0	49,7-70,2
Anos de escolaridade				
0 a 8	83,6	77,0-90,3	54,2	44,3-64,2
9 a 11	92,7	87,4-98,0	72,5	62,8-82,3
12 e mais	96,5	93,3-99,6	88,6	83,1-94,0
Total	87,5	83,0-92,0	63,5	56,5-70,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	72,5	62,9-82,1	69,6	59,8-79,4
35 a 44	85,8	79,5-92,1	78,8	71,7-86,0
45 a 54	90,9	85,0-96,7	82,1	74,6-89,5
55 a 59	86,7	75,2-98,2	72,9	59,4-86,5
Anos de escolaridade				
0 a 8	78,6	70,5-86,7	73,2	64,7-81,7
9 a 11	82,1	75,1-89,0	74,3	66,8-81,7
12 e mais	88,5	84,1-92,8	82,6	77,6-87,6
Total	81,7	77,1-86,3	75,5	70,7-80,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	27,7	16,9-38,5	10,7	3,5-17,8	43,2	28,5-57,9
25 a 34	41,0	32,8-49,2	28,2	15,9-40,5	51,9	40,8-62,9
35 a 44	43,2	36,9-49,5	31,6	22,3-40,8	52,9	44,7-61,2
45 a 54	35,2	29,2-41,1	16,0	10,3-21,8	50,4	41,6-59,2
55 a 64	31,3	24,9-37,6	22,2	13,6-30,7	38,0	29,2-46,8
65 e mais	22,7	17,1-28,4	12,7	5,5-20,0	28,8	21,1-36,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	26,0	20,0-32,0	14,3	7,0-21,6	36,1	28,0-44,2
9 a 11	39,9	35,5-44,4	23,4	17,2-29,6	52,4	46,4-58,4
12 e mais	56,8	52,8-60,8	42,1	35,7-48,6	68,5	63,9-73,2
Total	35,3	31,5-39,1	21,5	16,6-26,5	46,6	41,8-51,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,3	1,0-11,6	4,6	0,9-8,2	7,8	0,0-17,1
25 a 34	7,0	3,3-10,7	7,1	0,9-13,3	6,9	2,5-11,3
35 a 44	25,6	19,5-31,8	28,5	18,4-38,5	23,2	15,7-30,7
45 a 54	41,1	34,5-47,8	38,6	28,7-48,5	43,1	34,2-52,0
55 a 64	50,9	43,5-58,3	48,1	36,2-60,1	52,9	43,5-62,3
65 e mais	64,8	58,4-71,2	56,8	45,4-68,1	69,6	62,2-77,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	28,3	22,9-33,7	21,9	14,2-29,6	33,7	26,8-40,6
9 a 11	17,4	14,2-20,6	19,8	14,3-25,3	15,6	11,8-19,4
12 e mais	22,1	18,8-25,4	27,1	21,3-32,9	18,1	14,5-21,8
Total	24,1	21,2-27,1	22,2	17,6-26,9	0,0	0,0-0,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,1	0,0-0,4	0,0	0,0-0,0	0,3	0,0-0,8
25 a 34	0,7	0,0-1,7	0,0	0,0-0,0	1,2	0,0-3,1
35 a 44	5,5	1,4-9,5	6,6	0,0-13,7	4,5	0,3-8,8
45 a 54	4,5	2,1-6,9	5,2	1,2-9,2	3,9	1,0-6,8
55 a 64	20,9	14,6-27,3	18,4	8,8-28,0	22,8	14,4-31,2
65 e mais	19,7	14,4-25,0	17,2	8,6-25,8	21,2	14,4-28,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,8	5,4-10,1	6,8	3,0-10,6	8,6	5,7-11,5
9 a 11	3,1	1,8-4,5	2,0	0,8-3,2	4,0	1,8-6,1
12 e mais	1,8	0,9-2,8	2,7	0,8-4,7	1,1	0,4-1,8
Total	5,4	4,1-6,7	4,8	2,7-6,9	5,9	4,3-7,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,3	0,0-2,8	0,0	0,0-0,0	2,3	0,0-5,2
35 a 44	0,4	0,0-1,3	1,0	0,0-2,8	0,0	0,0-0,0
45 a 54	2,3	0,5-4,1	2,6	0,0-5,7	2,0	0,0-4,1
55 a 64	4,9	2,1-7,6	6,3	1,1-11,5	3,8	1,0-6,6
65 e mais	9,8	6,1-13,4	10,6	4,5-16,6	9,3	4,7-13,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,2	1,2-3,2	1,7	0,5-2,9	2,6	1,1-4,2
9 a 11	1,7	0,5-2,9	1,9	0,1-3,6	1,5	0,0-3,1
12 e mais	1,8	0,8-2,8	2,2	0,5-4,0	1,4	0,2-2,6
Total	2,0	1,3-2,6	1,8	0,9-2,7	2,1	1,2-3,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,0	1,2-4,7	3,8	0,6-7,1	2,2	0,4-4,0
25 a 34	10,3	5,8-14,9	11,2	2,9-19,5	9,6	5,0-14,2
35 a 44	27,0	21,0-33,1	27,8	18,2-37,5	26,3	18,7-34,0
45 a 54	23,9	18,5-29,3	12,8	7,7-17,9	32,8	24,4-41,1
55 a 64	39,7	32,5-47,0	34,4	22,9-45,9	43,7	34,5-52,9
65 e mais	37,0	30,5-43,4	33,7	23,1-44,3	38,9	30,9-46,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,8	14,6-23,1	15,5	8,9-22,1	21,7	16,5-26,9
9 a 11	17,3	14,2-20,5	15,7	11,0-20,4	18,6	14,4-22,7
12 e mais	21,4	18,2-24,6	22,4	17,2-27,6	20,7	16,7-24,6
Total	18,9	16,3-21,4	16,7	12,6-20,8	20,6	17,5-23,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,1	0,0-0,4	0,0	0,0-0,0	0,3	0,0-0,8
25 a 34	0,5	0,0-1,3	0,0	0,0-0,0	1,0	0,0-2,4
35 a 44	1,4	0,1-2,8	1,3	0,0-3,9	1,6	0,4-2,7
45 a 54	6,2	2,8-9,7	0,6	0,0-1,5	10,7	4,7-16,7
55 a 64	13,4	8,3-18,6	5,5	0,0-11,8	19,3	11,8-26,9
65 e mais	28,0	22,0-33,9	7,1	1,5-12,6	40,5	32,4-48,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,4	4,6-8,2	1,5	0,1-3,0	10,6	7,5-13,7
9 a 11	2,7	1,6-3,8	1,2	0,1-2,3	3,8	2,1-5,5
12 e mais	3,5	2,3-4,7	0,8	0,0-1,8	5,7	3,7-7,7
Total	4,9	3,8-5,9	1,3	0,4-2,2	7,8	6,1-9,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,6	0,1-1,2	0,4	0,0-1,1	0,8	0,0-1,6
25 a 34	2,3	0,2-4,5	2,0	0,0-4,3	2,6	0,0-6,1
35 a 44	1,7	0,7-2,7	1,6	0,0-3,2	1,8	0,4-3,1
45 a 54	2,8	0,7-4,9	2,5	0,0-6,2	3,0	0,7-5,4
55 a 64	1,0	0,0-2,1	0,6	0,0-1,4	1,4	0,0-3,1
65 e mais	4,8	2,1-7,5	6,7	1,3-12,2	3,6	0,9-6,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,5	0,4-2,6	1,1	0,0-2,2	1,9	0,1-3,6
9 a 11	2,3	1,0-3,6	2,5	0,2-4,9	2,1	0,8-3,4
12 e mais	3,0	1,7-4,2	3,1	1,2-5,1	2,8	1,2-4,5
Total	2,0	1,3-2,7	1,8	0,9-2,8	2,1	1,1-3,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,9	15,1-32,7	20,3	8,1-32,5	27,1	15,8-38,4
25 a 34	24,3	18,2-30,3	22,6	13,4-31,7	25,7	17,8-33,7
35 a 44	37,6	31,6-43,6	29,2	20,6-37,8	44,7	36,7-52,7
45 a 54	41,9	35,6-48,3	36,8	27,5-46,1	46,0	37,4-54,7
55 a 64	39,6	32,9-46,4	34,9	24,8-45,1	43,1	34,2-52,0
65 e mais	48,5	41,7-55,3	38,9	28,0-49,8	54,4	46,0-62,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,8	13,4-22,2	10,6	5,3-16,0	24,0	17,8-30,3
9 a 11	36,5	32,3-40,8	35,1	28,6-41,7	37,6	32,0-43,3
12 e mais	73,3	69,6-77,0	70,6	64,5-76,7	75,4	70,9-79,9
Total	32,8	29,4-36,2	27,5	22,4-32,7	37,2	32,9-41,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	55,2	41,2-69,2
26 a 30	68,3	54,0-82,6
31 a 35	69,8	54,8-84,9
36 a 40	60,4	47,6-73,2
41 a 45	62,6	51,5-73,7
46 a 50	52,1	39,7-64,5
Anos de escolaridade		
0 a 8	64,9	53,0-76,8
9 a 11	57,5	50,7-64,4
12 e mais	57,3	51,3-63,4
Total	70,7	65,1-76,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,2	2,0-10,4	4,5	1,0-8,0	7,8	0,8-14,8
25 a 34	13,8	8,1-19,6	13,7	3,2-24,2	13,9	8,0-19,9
35 a 44	15,2	10,4-20,0	12,6	4,7-20,5	17,4	11,5-23,4
45 a 54	15,6	10,7-20,4	6,1	2,7-9,5	23,2	15,3-31,0
55 a 64	15,0	9,3-20,7	7,8	1,4-14,2	20,3	11,9-28,8
65 e mais	16,5	11,6-21,5	11,9	5,2-18,6	19,3	12,7-26,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,3	9,3-17,2	10,7	4,4-17,1	15,4	10,6-20,3
9 a 11	10,5	7,7-13,2	6,8	3,6-9,9	13,2	9,0-17,5
12 e mais	16,3	13,3-19,2	10,7	6,9-14,5	20,7	16,5-25,0
Total	13,0	10,6-15,3	9,6	6,0-13,3	15,7	12,8-18,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	77,7	58,4-97,0	66,5	40,2-92,8	83,7	61,1-100,0
25 a 34	43,2	22,7-63,7	15,0	0,0-31,3	66,6	44,0-89,3
35 a 44	80,5	68,3-92,7	100,0	100,0-100,0	68,7	51,4-85,9
45 a 54	75,4	61,5-89,3	85,7	68,7-100,0	73,3	56,9-89,7
55 a 64	73,4	53,1-93,7	85,5	66,0-100,0	69,5	44,6-94,4
65 e mais	84,5	72,2-96,8	83,1	59,7-100,0	85,0	70,6-99,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	62,8	47,0-78,5	50,8	20,7-80,8	70,1	55,6-84,5
9 a 11	70,7	57,5-83,8	79,0	59,7-98,4	67,4	51,0-83,9
12 e mais	82,0	74,8-89,3	76,2	61,1-91,3	84,5	76,4-92,5
Total	68,8	59,1-78,5	61,0	39,7-82,2	72,8	64,0-81,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,9	6,6-23,1	27,6	13,0-42,1	3,3	0,0-8,8
25 a 34	17,2	10,5-24,0	25,7	14,0-37,5	9,2	3,0-15,4
35 a 44	15,5	10,4-20,6	21,9	13,7-30,2	9,2	3,2-15,2
45 a 54	20,5	14,2-26,9	26,1	15,9-36,3	14,8	7,5-22,0
55 a 64	14,2	7,4-21,0	23,5	10,8-36,3	5,8	1,0-10,6
65 e mais	9,2	3,2-15,2	12,4	0,5-24,3	6,6	1,6-11,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,4	15,7-27,1	31,9	22,6-41,2	10,4	5,3-15,5
9 a 11	9,1	6,9-11,3	14,7	10,7-18,8	4,6	2,4-6,8
12 e mais	7,9	5,4-10,3	11,4	7,0-15,8	4,4	2,2-6,6
Total	16,0	12,6-19,4	24,8	18,9-30,7	7,7	4,9-10,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	15,1	7,3-22,8	14,1	3,7-24,5	16,0	4,6-27,3
25 a 34	23,5	16,0-31,0	35,0	22,5-47,5	12,5	5,1-19,9
35 a 44	29,4	22,9-35,8	36,2	26,6-45,8	22,7	14,2-31,2
45 a 54	33,7	26,2-41,1	37,8	26,2-49,3	29,4	20,0-38,9
55 a 64	49,6	40,2-58,9	46,9	32,0-61,7	52,1	40,4-63,7
65 e mais	52,8	43,1-62,5	67,7	52,4-83,0	41,1	30,1-52,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,6	28,5-40,6	38,4	29,3-47,5	30,5	22,6-38,5
9 a 11	15,8	13,0-18,6	22,8	17,9-27,6	10,3	7,2-13,4
12 e mais	14,0	10,7-17,2	19,3	13,7-25,0	8,7	5,8-11,7
Total	26,3	22,7-30,0	31,9	26,2-37,6	21,1	16,6-25,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,5	0,0-8,1	7,3	0,0-16,6	0,0	0,0-0,0
25 a 34	3,5	0,6-6,3	6,5	0,7-12,2	0,7	0,0-1,7
35 a 44	5,6	2,1-9,1	7,0	2,4-11,6	4,2	0,0-9,5
45 a 54	5,9	2,2-9,6	8,0	1,9-14,1	3,7	0,0-7,8
55 a 64	4,8	0,6-8,9	7,9	0,0-16,1	1,9	0,0-4,2
65 e mais	3,6	0,0-8,2	7,5	0,0-17,8	0,5	0,0-1,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,0	3,0-9,1	9,9	4,3-15,4	2,0	0,0-4,1
9 a 11	1,9	1,0-2,8	3,0	1,2-4,7	1,0	0,1-1,9
12 e mais	2,0	0,9-3,0	3,1	1,1-5,1	0,9	0,0-1,7
Total	4,2	2,5-6,0	7,1	3,7-10,5	1,5	0,4-2,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	43,1	33,6-52,6	41,5	27,7-55,3	44,5	31,3-57,7
25 a 34	42,1	34,4-49,9	48,4	35,9-60,8	36,2	27,1-45,3
35 a 44	39,3	32,7-46,0	42,6	32,8-52,3	36,2	27,3-45,1
45 a 54	43,9	35,9-51,8	46,9	34,8-59,0	40,8	30,8-50,8
55 a 64	20,0	13,1-27,0	18,2	8,1-28,4	21,7	12,2-31,1
65 e mais	26,1	17,4-34,9	23,8	9,0-38,6	28,0	17,6-38,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,4	33,9-46,9	43,1	33,6-52,6	37,5	28,8-46,2
9 a 11	41,2	37,2-45,1	43,7	37,8-49,6	39,2	33,9-44,5
12 e mais	31,4	27,0-35,9	30,6	23,6-37,5	32,3	26,8-37,8
Total	40,0	36,0-43,9	42,3	36,3-48,4	37,8	32,6-42,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	31,4	21,1-41,7	38,5	23,9-53,1	24,9	10,3-39,6
25 a 34	44,6	36,6-52,5	49,0	36,6-61,5	39,9	29,5-50,2
35 a 44	61,2	54,5-67,9	63,7	53,7-73,7	58,5	49,4-67,5
45 a 54	63,4	55,7-71,2	66,5	55,0-78,0	59,8	49,5-70,1
55 a 64	64,7	54,7-74,7	56,2	40,9-71,5	74,3	62,6-86,1
65 e mais	55,2	43,3-67,1	51,3	33,3-69,4	60,3	46,7-73,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	50,7	43,4-58,0	48,4	38,5-58,2	53,4	42,7-64,2
9 a 11	43,2	39,2-47,2	55,8	49,8-61,7	32,6	27,5-37,7
12 e mais	48,4	43,7-53,0	59,6	52,4-66,9	37,1	31,4-42,8
Total	47,7	43,4-52,0	51,7	45,5-58,0	43,5	37,6-49,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	9,0	1,5-16,5	8,9	0,2-17,7	9,0	0,0-20,9
25 a 34	12,0	7,2-16,8	9,4	4,7-14,2	14,7	6,5-22,9
35 a 44	18,9	13,2-24,5	16,4	10,1-22,6	21,6	12,2-31,0
45 a 54	21,5	14,6-28,3	18,1	9,0-27,1	25,6	15,3-35,8
55 a 64	26,7	17,1-36,3	24,4	9,8-38,9	29,3	16,9-41,7
65 e mais	22,6	12,4-32,8	19,4	3,8-35,1	26,8	14,8-38,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,8	11,6-22,0	10,8	5,5-16,1	24,0	14,8-33,3
9 a 11	12,4	9,9-14,9	15,8	11,7-19,8	9,6	6,6-12,5
12 e mais	11,6	8,7-14,6	17,1	11,8-22,4	6,2	3,8-8,5
Total	14,7	11,7-17,7	13,0	9,5-16,4	16,6	11,7-21,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,1	15,2-31,0	22,8	10,7-35,0	23,4	13,0-33,7
25 a 34	19,2	12,8-25,7	18,4	7,3-29,6	20,0	13,1-26,8
35 a 44	22,2	17,2-27,1	14,1	8,8-19,5	30,1	22,1-38,1
45 a 54	24,5	18,3-30,6	13,3	7,4-19,1	36,0	26,3-45,8
55 a 64	20,1	13,2-27,1	12,0	4,0-20,0	27,5	17,0-38,0
65 e mais	29,0	19,9-38,0	24,3	9,2-39,4	32,7	21,9-43,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,4	15,1-25,8	17,7	9,6-25,9	23,3	16,3-30,2
9 a 11	21,7	18,6-24,9	15,9	11,9-20,0	26,3	21,7-30,9
12 e mais	35,2	30,9-39,6	30,1	23,6-36,5	40,3	34,6-45,9
Total	22,0	18,8-25,3	18,1	13,0-23,2	25,7	21,5-29,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,0	10,1-23,9	18,1	6,8-29,3	16,0	7,8-24,1
25 a 34	8,2	4,9-11,6	5,2	1,1-9,3	11,1	5,9-16,3
35 a 44	14,0	10,0-18,1	9,7	5,0-14,4	18,3	11,8-24,8
45 a 54	11,9	7,6-16,3	4,6	1,6-7,6	19,4	11,6-27,2
55 a 64	12,7	7,1-18,3	10,4	2,7-18,1	14,8	6,8-22,8
65 e mais	16,0	8,3-23,7	16,0	2,8-29,2	16,0	7,1-24,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,3	7,4-15,2	9,3	3,5-15,2	13,4	8,1-18,6
9 a 11	13,5	10,8-16,1	10,3	6,9-13,8	15,9	12,0-19,8
12 e mais	22,3	18,6-26,0	19,2	13,7-24,6	25,4	20,4-30,4
Total	12,9	10,5-15,4	10,4	6,7-14,1	15,3	12,0-18,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	41,3	31,4-51,1	59,2	45,9-72,5	24,9	13,6-36,2
25 a 34	40,7	32,9-48,4	50,0	37,6-62,5	31,8	23,0-40,5
35 a 44	36,8	30,0-43,5	51,7	42,1-61,4	22,1	14,1-30,1
45 a 54	28,6	21,4-35,8	38,1	26,5-49,7	18,8	11,1-26,6
55 a 64	21,0	13,3-28,8	35,1	21,1-49,1	8,3	2,3-14,3
65 e mais	17,0	9,2-24,7	28,4	12,9-43,9	7,9	2,2-13,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	36,9	30,2-43,5	52,8	43,3-62,2	20,2	12,6-27,8
9 a 11	36,5	32,6-40,4	46,1	40,1-52,0	29,0	24,0-34,1
12 e mais	32,6	28,1-37,2	41,7	34,4-49,0	23,9	18,9-28,8
Total	36,4	32,4-40,5	49,8	43,7-55,8	23,9	19,3-28,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	62,8	53,1-72,5	61,2	46,6-75,8	64,2	51,3-77,1
25 a 34	64,7	57,1-72,2	58,1	45,8-70,4	70,9	62,4-79,5
35 a 44	70,3	64,0-76,6	70,4	61,2-79,5	70,2	61,6-78,9
45 a 54	60,4	52,6-68,3	58,3	46,3-70,3	62,7	52,7-72,6
55 a 64	57,0	47,7-66,3	52,4	37,6-67,3	61,1	49,7-72,5
65 e mais	63,6	54,2-73,0	64,9	48,2-81,6	62,6	52,0-73,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	62,2	55,7-68,7	57,3	47,7-66,9	67,3	58,8-75,9
9 a 11	67,4	63,7-71,2	68,6	63,0-74,2	66,5	61,4-71,6
12 e mais	65,6	61,2-69,9	64,4	57,5-71,2	66,7	61,3-72,2
Total	36,4	32,4-40,5	61,5	55,4-67,6	67,0	62,0-72,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,6	24,3-42,9	42,0	27,9-56,1	25,9	13,9-37,8
25 a 34	37,6	29,9-45,4	45,3	32,8-57,7	30,4	21,3-39,5
35 a 44	26,5	20,3-32,7	29,8	20,4-39,2	23,3	15,2-31,4
45 a 54	20,4	14,0-26,8	20,2	10,6-29,7	20,6	12,1-29,1
55 a 64	13,0	7,2-18,8	14,5	5,2-23,8	11,6	4,4-18,8
65 e mais	4,8	2,0-7,6	2,8	0,0-6,1	6,4	2,2-10,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	28,8	22,4-35,2	33,6	24,0-43,2	23,8	15,6-32,0
9 a 11	30,5	26,7-34,3	36,7	30,8-42,5	25,6	20,8-30,5
12 e mais	27,8	23,3-32,3	34,8	27,5-42,1	21,0	16,3-25,7
Total	29,3	25,4-33,2	34,7	28,6-40,8	24,3	19,5-29,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,1	17,1-33,2	40,8	26,8-54,8	10,8	6,0-15,7
25 a 34	21,5	14,3-28,6	33,3	20,7-45,9	10,2	5,8-14,7
35 a 44	17,3	12,5-22,1	18,0	11,5-24,6	16,6	9,7-23,6
45 a 54	15,5	10,3-20,8	14,9	7,7-22,1	16,2	8,7-23,7
55 a 64	9,8	5,1-14,6	12,5	4,8-20,2	7,4	1,6-13,3
65 e mais	7,5	2,6-12,5	10,7	0,9-20,6	5,0	0,8-9,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,2	10,7-21,7	25,8	16,3-35,2	6,2	2,8-9,6
9 a 11	24,4	21,0-27,9	32,8	27,1-38,5	17,8	13,8-21,9
12 e mais	23,4	19,6-27,1	25,1	19,1-31,1	21,7	17,1-26,3
Total	19,7	16,3-23,0	28,0	22,1-33,9	11,8	9,3-14,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	47,6	37,8-57,4	66,4	54,8-78,0	30,5	19,6-41,4
25 a 34	51,1	43,4-58,9	59,7	47,9-71,5	43,0	33,5-52,5
35 a 44	53,5	46,8-60,2	59,9	50,4-69,4	47,2	37,9-56,5
45 a 54	50,7	42,9-58,6	52,9	40,9-65,0	48,5	38,4-58,6
55 a 64	43,9	34,4-53,3	63,7	49,8-77,5	25,9	15,6-36,2
65 e mais	14,8	6,7-22,9	27,3	10,9-43,7	5,0	1,2-8,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	51,1	44,5-57,7	66,5	58,0-74,9	34,9	26,6-43,2
9 a 11	45,5	41,5-49,4	51,4	45,5-57,3	40,8	35,6-46,0
12 e mais	40,9	36,4-45,5	39,9	32,8-46,9	42,0	36,3-47,7
Total	48,3	44,3-52,4	59,6	53,9-65,2	37,7	32,7-42,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	15,7	9,2-22,2	24,3	12,3-36,3	7,9	3,3-12,6
25 a 34	21,8	14,5-29,1	29,1	16,8-41,4	14,9	7,6-22,3
35 a 44	22,1	16,3-27,9	24,3	15,9-32,6	20,0	11,9-28,1
45 a 54	21,0	14,0-28,0	26,7	15,3-38,1	15,1	7,5-22,7
55 a 64	13,8	7,1-20,5	20,1	8,1-32,1	8,1	1,9-14,2
65 e mais	5,1	0,0-10,6	10,7	0,0-22,8	0,7	0,0-1,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,6	16,2-27,0	29,9	21,0-38,7	12,9	7,4-18,4
9 a 11	16,6	13,7-19,5	20,0	15,3-24,8	13,9	10,4-17,5
12 e mais	7,7	5,2-10,2	9,9	5,4-14,3	5,6	3,3-7,9
Total	18,8	15,5-22,0	25,2	19,6-30,7	12,7	9,5-16,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,5	24,5-42,5	15,9	6,6-25,2	49,6	36,1-63,1
25 a 34	41,2	33,8-48,7	20,3	11,9-28,7	61,1	51,9-70,3
35 a 44	36,8	30,3-43,4	10,6	4,9-16,4	62,5	53,7-71,2
45 a 54	29,6	23,0-36,3	7,2	2,8-11,6	52,7	42,7-62,8
55 a 64	38,8	29,6-48,0	24,8	10,3-39,2	51,5	39,8-63,2
65 e mais	17,8	11,3-24,3	11,7	2,0-21,4	22,6	14,2-31,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,3	28,2-40,4	11,8	6,0-17,5	57,9	48,8-67,0
9 a 11	40,6	36,7-44,5	23,1	17,8-28,4	54,4	49,0-59,8
12 e mais	22,0	18,2-25,8	12,7	7,2-18,2	31,0	25,8-36,3
Total	35,6	31,8-39,4	15,5	11,6-19,4	54,5	49,2-59,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,0	10,8-27,2	36,1	21,7-50,6	3,4	0,9-5,9
25 a 34	25,6	18,3-32,9	44,1	31,5-56,6	8,0	4,5-11,6
35 a 44	23,9	17,9-29,8	39,0	29,2-48,7	9,1	4,2-14,0
45 a 54	18,6	12,7-24,5	33,7	22,9-44,6	3,1	1,2-5,0
55 a 64	5,6	1,9-9,2	7,8	1,2-14,5	3,5	0,0-7,1
65 e mais	4,6	0,0-10,3	10,4	0,0-23,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,2	14,3-26,1	37,2	27,5-47,0	2,3	0,3-4,3
9 a 11	20,2	17,1-23,3	34,5	28,9-40,1	8,9	6,0-11,9
12 e mais	23,2	19,2-27,2	33,8	27,0-40,5	13,0	9,1-16,9
Total	20,4	16,9-24,0	36,1	29,9-42,3	5,7	4,0-7,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,3	0,0-0,5	0,6	0,0-1,1	0,0	0,0-0,0
25 a 34	2,3	0,8-3,8	4,4	1,3-7,6	0,2	0,0-0,7
35 a 44	3,3	1,5-5,1	5,2	2,4-8,0	1,4	0,0-3,6
45 a 54	1,0	0,2-1,8	1,9	0,3-3,5	0,0	0,0-0,0
55 a 64	0,2	0,0-0,7	0,5	0,0-1,4	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,1	0,0-0,2	0,2	0,0-0,5	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,7	0,0-1,4	0,9	0,0-2,2	0,4	0,0-1,2
9 a 11	2,1	1,2-3,1	4,5	2,5-6,6	0,2	0,0-0,6
12 e mais	5,4	3,1-7,8	10,4	5,9-14,9	0,6	0,0-1,6
Total	1,5	0,9-2,1	2,8	1,7-3,9	0,3	0,0-0,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,8	2,0-13,6	3,4	0,0-9,2	11,8	2,2-21,4
25 a 34	6,8	1,6-11,9	10,1	0,4-19,9	3,6	0,3-6,9
35 a 44	6,0	2,1-9,9	3,1	0,0-7,8	8,8	2,6-15,1
45 a 54	9,3	3,7-15,0	9,7	0,5-18,8	9,0	2,4-15,6
55 a 64	5,5	1,8-9,3	3,0	0,0-6,8	7,9	1,7-14,0
65 e mais	18,4	10,9-25,9	11,0	0,2-21,9	24,2	14,3-34,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,9	6,6-15,1	9,3	3,2-15,5	12,5	6,6-18,4
9 a 11	4,0	2,4-5,6	2,1	0,7-3,5	5,5	2,9-8,2
12 e mais	1,3	0,4-2,1	1,9	0,3-3,5	0,6	0,0-1,2
Total	7,7	5,2-10,2	6,4	2,7-10,2	8,9	5,6-12,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	67,6	57,4-77,8	51,7	41,0-62,3
60 a 69	71,4	60,0-82,9	55,2	42,6-67,8
Anos de escolaridade				
0 a 8	66,1	56,6-75,6	49,2	39,2-59,1
9 a 11	73,9	61,5-86,2	58,3	44,7-71,9
12 e mais	91,4	82,0-100,0	85,7	74,8-96,6
Total	68,9	61,1-76,7	52,9	44,6-61,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	84,4	78,0-90,8	77,9	69,8-86,1
35 a 44	89,3	83,8-94,9	84,6	77,8-91,5
45 a 54	89,7	82,6-96,7	75,8	66,7-84,9
55 a 59	94,0	87,9-100,0	81,6	70,6-92,5
Anos de escolaridade				
0 a 8	86,8	80,8-92,9	76,2	68,1-84,4
9 a 11	87,2	82,3-92,1	83,6	78,5-88,7
12 e mais	90,2	85,9-94,4	84,6	79,5-89,7
Total	87,3	83,6-91,0	79,8	75,1-84,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	28,7	20,4-36,9	18,6	9,3-27,9	37,9	25,1-50,6
25 a 34	31,4	24,5-38,3	20,4	10,6-30,2	41,9	32,6-51,1
35 a 44	26,1	20,9-31,2	20,1	13,2-27,1	31,9	24,3-39,5
45 a 54	21,2	15,7-26,7	7,6	2,7-12,5	35,2	26,1-44,3
55 a 64	14,7	8,7-20,8	6,9	1,4-12,4	21,9	12,1-31,6
65 e mais	7,2	3,8-10,6	2,3	0,0-4,7	11,0	5,4-16,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,4	13,1-23,7	11,4	5,1-17,8	25,8	17,5-34,1
9 a 11	34,8	31,1-38,6	23,7	18,5-28,9	43,6	38,3-48,9
12 e mais	45,3	40,7-49,8	30,0	23,4-36,6	60,1	54,4-65,8
Total	26,3	22,9-29,7	16,8	12,6-21,1	35,2	30,2-40,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,3	1,6-13,0	2,7	0,0-6,7	11,6	1,6-21,6
25 a 34	6,6	3,3-9,9	6,1	0,8-11,4	7,1	3,2-11,1
35 a 44	18,6	13,5-23,8	13,1	7,1-19,0	24,1	16,0-32,1
45 a 54	37,0	29,3-44,6	29,7	18,6-40,9	44,4	34,3-54,5
55 a 64	49,6	40,3-59,0	40,7	26,1-55,4	57,6	46,0-69,2
65 e mais	59,7	49,9-69,5	51,8	34,4-69,2	66,0	55,5-76,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,8	17,3-26,3	15,1	9,9-20,2	28,9	21,6-36,1
9 a 11	11,0	8,9-13,1	8,3	5,7-11,0	13,2	10,0-16,3
12 e mais	17,3	13,8-20,7	19,7	14,2-25,2	14,9	10,8-19,0
Total	17,6	15,0-20,2	13,3	10,1-16,5	21,8	17,8-25,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,9	0,0-4,7	3,4	0,0-9,2	0,6	0,0-1,4
25 a 34	1,3	0,0-3,1	1,9	0,0-5,5	0,7	0,0-1,6
35 a 44	3,3	1,0-5,5	3,5	0,0-7,1	3,0	0,4-5,7
45 a 54	9,0	4,2-13,8	11,9	3,5-20,3	6,0	1,8-10,1
55 a 64	10,4	4,2-16,6	6,6	0,0-15,8	13,9	5,5-22,2
65 e mais	18,7	11,2-26,3	13,7	1,7-25,7	22,7	13,3-32,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,4	3,2-7,7	6,1	2,1-10,2	4,7	2,7-6,6
9 a 11	2,1	1,2-3,0	1,9	0,6-3,1	2,3	1,0-3,5
12 e mais	3,5	2,0-4,9	3,6	1,6-5,5	3,4	1,3-5,4
Total	4,1	2,8-5,4	4,6	2,1-7,0	3,6	2,5-4,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,0-0,4	0,1	0,0-0,2	0,3	0,0-0,7
25 a 34	0,3	0,0-0,8	0,2	0,0-0,5	0,5	0,0-1,4
35 a 44	1,6	0,1-3,2	0,9	0,0-2,5	2,3	0,0-5,0
45 a 54	2,2	0,1-4,3	2,2	0,0-5,5	2,2	0,0-4,9
55 a 64	9,9	3,7-16,0	11,2	0,6-21,7	8,7	1,9-15,4
65 e mais	14,1	6,9-21,3	16,7	3,6-29,8	12,0	4,3-19,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,8	1,6-4,0	2,6	0,9-4,4	3,0	1,4-4,6
9 a 11	0,7	0,2-1,3	0,6	0,0-1,2	0,8	0,0-1,6
12 e mais	2,0	0,8-3,1	1,7	0,1-3,4	2,2	0,7-3,7
Total	2,0	1,3-2,7	1,9	0,8-3,0	2,1	1,2-3,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,1	2,2-10,0	8,1	1,0-15,2	4,3	0,8-7,8
25 a 34	7,1	2,5-11,7	7,8	0,8-14,8	6,4	0,4-12,4
35 a 44	15,4	10,8-20,1	12,1	6,7-17,5	18,7	11,3-26,0
45 a 54	26,9	20,1-33,8	21,8	12,2-31,3	32,2	22,6-41,8
55 a 64	32,3	23,8-40,7	27,4	14,5-40,3	36,7	25,8-47,6
65 e mais	42,2	32,4-52,1	43,5	26,0-60,9	41,3	30,3-52,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,8	11,9-19,8	13,2	7,5-18,8	18,6	13,1-24,2
9 a 11	10,1	8,0-12,1	11,8	8,5-15,1	8,7	6,2-11,2
12 e mais	16,3	13,2-19,5	17,7	12,8-22,6	15,0	11,1-18,9
Total	13,8	11,5-16,2	13,1	9,5-16,6	14,5	11,5-17,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,5	0,5-12,5	0,7	0,0-1,9	11,8	0,9-22,8
25 a 34	0,2	0,0-0,5	0,1	0,0-0,3	0,3	0,0-0,8
35 a 44	3,2	0,3-6,1	0,7	0,0-1,6	5,7	0,2-11,2
45 a 54	2,1	0,8-3,3	0,7	0,0-1,6	3,5	1,1-5,9
55 a 64	16,0	9,6-22,4	9,1	0,8-17,4	22,2	12,8-31,6
65 e mais	24,2	16,7-31,8	8,5	0,0-17,4	36,7	26,2-47,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,9	3,6-10,2	1,2	0,2-2,2	12,8	6,5-19,2
9 a 11	2,1	1,1-3,1	1,7	0,3-3,1	2,5	1,0-3,9
12 e mais	3,0	1,5-4,6	0,8	0,0-1,7	5,3	2,5-8,1
Total	4,9	3,0-6,8	1,3	0,6-2,1	8,3	4,7-11,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,6	0,1-9,1	1,5	0,1-3,0	7,4	0,0-15,7
25 a 34	5,0	2,1-8,0	3,2	0,0-7,2	6,7	2,4-11,0
35 a 44	2,3	0,9-3,6	0,8	0,0-1,8	3,7	1,2-6,2
45 a 54	2,4	0,9-3,9	1,6	0,0-3,5	3,2	0,8-5,5
55 a 64	2,3	0,0-4,6	2,6	0,0-6,6	2,0	0,0-4,4
65 e mais	4,0	1,2-6,8	0,0	0,0-0,0	7,2	2,2-12,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,0	0,5-5,6	1,3	0,0-3,2	4,9	0,1-9,7
9 a 11	4,9	3,2-6,7	2,8	0,7-4,8	6,6	3,9-9,3
12 e mais	5,0	3,1-6,9	3,1	0,7-5,4	6,9	4,0-9,9
Total	3,9	2,3-5,5	1,9	0,6-3,2	5,7	2,9-8,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,7	15,1-28,3	25,6	14,8-36,4	18,1	10,3-26,0
25 a 34	24,0	17,9-30,0	21,2	11,5-30,8	26,7	19,2-34,1
35 a 44	30,7	25,0-36,3	29,8	21,7-38,0	31,5	23,6-39,4
45 a 54	37,0	29,6-44,3	37,3	25,9-48,6	36,6	27,3-46,0
55 a 64	45,0	35,8-54,3	42,0	27,3-56,8	47,8	36,1-59,4
65 e mais	38,9	29,5-48,3	28,8	13,2-44,3	47,0	36,0-58,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,3	15,6-25,0	19,4	12,2-26,7	21,2	15,3-27,2
9 a 11	33,4	29,7-37,1	35,5	30,0-41,0	31,7	26,7-36,7
12 e mais	60,7	56,1-65,3	56,8	49,6-64,1	64,4	58,9-70,0
Total	28,0	24,9-31,2	27,5	22,6-32,4	28,5	24,5-32,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	74,9	65,5-84,4
26 a 30	67,9	52,4-83,4
31 a 35	77,4	65,0-89,9
36 a 40	70,1	58,0-82,2
41 a 45	54,1	39,0-69,2
46 a 50	61,4	46,5-76,4
Anos de escolaridade		
0 a 8	68,0	57,2-78,8
9 a 11	73,5	68,5-78,5
12 e mais	72,3	66,7-77,9
Total	62,0	55,5-68,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,9	2,0-13,8	3,9	0,0-9,7	11,6	1,8-21,3
25 a 34	13,6	7,7-19,4	12,9	2,9-22,9	14,2	7,9-20,6
35 a 44	12,0	7,6-16,4	7,4	3,0-11,7	16,5	9,1-23,8
45 a 54	16,2	9,9-22,4	16,1	5,6-26,5	16,2	9,5-22,9
55 a 64	11,9	6,6-17,2	4,1	0,0-8,6	19,1	10,3-27,8
65 e mais	21,2	12,8-29,6	13,3	0,0-26,9	27,3	17,0-37,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,2	9,6-18,8	11,5	5,2-17,8	17,0	10,3-23,6
9 a 11	9,6	7,4-11,7	5,1	2,4-7,7	13,1	9,8-16,4
12 e mais	10,3	7,7-12,9	8,1	4,3-12,0	12,4	8,9-15,9
Total	12,2	9,5-15,0	9,1	5,2-13,1	15,1	11,3-18,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,9	0,0-68,2	87,6	60,3-100,0	17,6	0,0-38,2
25 a 34	86,3	74,2-98,4	93,1	81,3-100,0	80,4	62,1-98,8
35 a 44	74,4	57,2-91,6	88,3	72,2-100,0	68,5	45,5-91,5
45 a 54	72,1	53,2-91,0	71,5	41,3-100,0	72,8	50,1-95,5
55 a 64	68,0	44,5-91,4	66,7	13,0-100,0	68,2	42,2-94,3
65 e mais	90,5	74,0-100,0	67,9	15,5-100,0	99,1	97,4-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	71,5	54,4-88,5	90,1	79,0-100,0	58,4	35,4-81,3
9 a 11	68,8	57,7-80,0	62,1	35,7-88,5	70,9	58,9-82,9
12 e mais	86,6	77,4-95,9	88,9	71,6-100,0	85,2	74,7-95,6
Total	71,7	60,0-83,4	85,0	74,2-95,8	64,2	48,9-79,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	9,7	3,0-16,4	16,1	3,2-29,0	3,9	0,0-8,3
25 a 34	8,1	3,7-12,5	9,5	1,6-17,4	7,0	2,4-11,5
35 a 44	9,1	5,1-13,1	10,1	3,0-17,3	8,2	4,1-12,3
45 a 54	14,5	9,5-19,4	21,1	11,9-30,4	8,7	4,6-12,8
55 a 64	9,0	5,1-12,9	13,8	6,2-21,4	5,4	1,8-9,0
65 e mais	9,8	5,2-14,3	16,1	6,3-25,8	5,8	1,8-9,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,1	6,6-13,5	14,1	7,5-20,7	6,5	3,6-9,5
9 a 11	9,7	7,1-12,4	13,5	8,6-18,4	6,8	4,2-9,4
12 e mais	8,0	5,6-10,4	10,5	6,2-14,7	6,1	3,4-8,9
Total	9,7	7,4-12,0	13,5	9,1-17,9	6,6	4,6-8,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,8	2,1-19,4	19,6	2,8-36,3	2,8	0,0-6,1
25 a 34	13,9	6,8-20,9	16,3	5,2-27,5	11,8	2,8-20,7
35 a 44	20,7	14,9-26,5	20,6	11,3-29,9	20,8	13,6-28,0
45 a 54	38,1	31,5-44,8	37,6	26,8-48,5	38,6	30,4-46,7
55 a 64	37,7	30,5-44,9	50,3	39,3-61,4	28,4	19,5-37,3
65 e mais	41,7	33,8-49,6	59,6	46,0-73,1	30,5	22,0-39,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	26,3	21,1-31,6	29,8	20,8-38,8	23,3	17,5-29,1
9 a 11	12,2	9,6-14,8	17,1	12,5-21,7	8,3	5,5-11,1
12 e mais	16,9	13,8-20,0	22,6	17,0-28,3	12,5	9,1-15,9
Total	21,6	18,3-24,9	25,9	20,0-31,7	18,0	14,5-21,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,7	0,0-10,5	6,8	0,0-17,9	2,8	0,0-7,0
25 a 34	1,8	0,3-3,3	1,6	0,0-3,4	2,0	0,0-4,3
35 a 44	1,7	0,4-3,0	1,8	0,0-4,1	1,6	0,1-3,1
45 a 54	2,3	0,5-4,2	3,1	0,0-6,3	1,7	0,0-3,8
55 a 64	2,6	0,8-4,3	3,9	0,4-7,4	1,6	0,1-3,2
65 e mais	4,3	0,9-7,6	11,1	2,6-19,6	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,9	0,6-5,2	4,2	0,0-8,6	1,8	0,0-3,7
9 a 11	2,9	1,5-4,3	3,9	1,4-6,5	2,1	0,6-3,6
12 e mais	1,6	0,6-2,6	1,6	0,2-3,0	1,6	0,3-2,9
Total	2,8	1,3-4,2	3,8	0,9-6,8	1,8	0,6-3,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	53,9	41,9-66,0	54,4	36,2-72,6	53,5	37,5-69,4
25 a 34	37,0	28,3-45,7	29,2	16,6-41,7	43,6	32,3-54,9
35 a 44	42,4	35,4-49,4	49,2	38,0-60,5	36,6	28,0-45,1
45 a 54	34,0	27,3-40,6	31,3	20,8-41,9	36,2	27,9-44,5
55 a 64	28,5	21,8-35,1	25,3	15,9-34,7	30,8	21,6-40,0
65 e mais	16,6	11,3-21,9	12,9	4,5-21,4	18,9	12,1-25,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,9	35,4-48,4	40,1	29,8-50,3	43,5	35,2-51,7
9 a 11	38,7	34,5-43,0	38,6	31,8-45,4	38,9	33,4-44,3
12 e mais	29,7	25,6-33,7	30,9	24,5-37,3	28,7	23,6-33,9
Total	39,6	35,4-43,9	38,7	31,9-45,4	40,4	35,1-45,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,2	6,9-21,5	18,9	5,8-31,9	9,2	4,2-14,2
25 a 34	40,9	31,3-50,5	49,5	34,0-65,0	33,5	21,7-45,3
35 a 44	52,7	45,6-59,9	60,1	48,9-71,3	45,6	36,5-54,8
45 a 54	58,3	51,2-65,5	63,6	52,5-74,7	52,6	43,9-61,4
55 a 64	64,2	56,9-71,5	66,0	55,8-76,2	62,6	52,4-72,9
65 e mais	51,9	42,9-60,8	47,3	32,8-61,8	55,7	44,8-66,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	43,7	36,7-50,7	44,9	34,3-55,5	42,5	33,3-51,6
9 a 11	42,9	38,5-47,3	54,1	47,3-60,9	33,2	27,9-38,5
12 e mais	36,1	31,8-40,4	49,5	42,4-56,7	25,8	21,0-30,5
Total	42,5	38,2-46,8	47,9	41,0-54,8	37,3	32,0-42,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,9	0,0-10,4	6,9	0,0-17,1	2,8	0,0-5,6
25 a 34	14,1	6,7-21,5	15,3	4,0-26,6	13,1	3,3-22,9
35 a 44	16,8	10,9-22,8	19,2	10,6-27,8	14,6	6,3-22,8
45 a 54	17,3	12,1-22,5	15,2	7,8-22,5	19,6	12,2-26,9
55 a 64	25,9	19,0-32,8	30,3	19,7-41,0	21,9	13,2-30,6
65 e mais	12,2	7,0-17,3	6,1	0,3-11,8	17,3	9,3-25,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,5	10,7-20,4	14,4	7,4-21,4	16,7	10,1-23,4
9 a 11	13,1	9,9-16,3	17,2	11,7-22,8	9,5	6,1-12,9
12 e mais	8,6	6,1-11,1	11,6	6,8-16,4	6,2	3,8-8,6
Total	13,9	10,9-16,9	14,8	10,2-19,4	13,1	9,2-16,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,3	7,0-19,6	7,4	3,3-11,6	18,5	7,5-29,5
25 a 34	29,0	20,9-37,1	22,8	11,3-34,3	34,3	23,4-45,2
35 a 44	34,9	28,7-41,1	32,5	22,2-42,8	36,9	29,4-44,5
45 a 54	35,6	29,4-41,8	31,9	21,8-42,0	38,8	31,3-46,3
55 a 64	38,5	31,4-45,6	30,7	20,9-40,5	44,2	34,5-54,0
65 e mais	33,7	26,5-40,9	32,4	19,7-45,2	34,5	26,0-42,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,1	18,2-28,1	16,8	10,2-23,4	28,6	21,6-35,6
9 a 11	31,7	27,8-35,7	29,3	23,3-35,4	33,7	28,5-38,8
12 e mais	49,6	45,3-54,0	48,2	41,2-55,3	50,7	45,2-56,2
Total	28,5	25,1-31,9	23,5	18,7-28,3	32,7	28,1-37,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,5	2,9-14,2	4,2	1,2-7,1	12,5	2,3-22,6
25 a 34	13,3	7,4-19,2	9,1	2,7-15,5	16,9	7,8-26,0
35 a 44	16,7	12,6-20,9	13,4	7,9-18,9	19,5	13,5-25,5
45 a 54	18,4	13,9-22,9	15,9	9,1-22,8	20,5	14,5-26,5
55 a 64	22,3	16,4-28,2	15,8	8,3-23,2	27,1	18,6-35,6
65 e mais	17,1	11,3-22,9	17,8	7,3-28,3	16,6	9,9-23,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,1	7,5-14,7	5,8	2,6-8,9	15,7	9,8-21,6
9 a 11	17,1	13,9-20,3	16,1	11,1-21,1	17,9	13,8-22,0
12 e mais	27,1	23,2-31,0	27,0	20,6-33,4	27,2	22,4-32,0
Total	14,5	12,1-17,0	10,8	8,0-13,5	17,7	13,9-21,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	29,0	19,2-38,8	41,9	24,5-59,4	17,4	8,1-26,6
25 a 34	30,8	22,3-39,4	40,8	25,9-55,6	22,4	13,9-30,9
35 a 44	31,8	25,4-38,3	41,4	30,4-52,5	23,7	17,0-30,4
45 a 54	30,8	24,5-37,1	40,1	29,1-51,0	22,8	16,2-29,5
55 a 64	23,4	17,2-29,6	35,2	24,6-45,8	14,7	7,8-21,6
65 e mais	17,3	11,2-23,4	35,4	22,0-48,8	5,9	1,9-9,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	28,8	23,2-34,5	41,2	31,2-51,2	18,0	12,6-23,4
9 a 11	30,4	26,4-34,5	38,5	31,9-45,2	24,0	19,1-28,9
12 e mais	28,1	24,1-32,1	40,0	33,1-46,9	18,9	14,4-23,4
Total	29,1	25,4-32,8	40,4	33,8-47,0	19,7	16,1-23,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	54,0	41,8-66,1	70,3	54,4-86,2	39,3	24,7-53,8
25 a 34	52,7	43,4-61,9	51,0	35,9-66,1	54,1	42,9-65,3
35 a 44	45,3	38,4-52,1	50,6	39,3-61,8	40,8	32,8-48,8
45 a 54	48,5	41,7-55,3	52,8	41,6-64,0	44,7	36,5-52,9
55 a 64	42,1	34,7-49,4	40,3	29,5-51,1	43,4	33,5-53,3
65 e mais	47,9	40,1-55,6	49,1	34,9-63,3	47,1	38,1-56,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	48,6	42,1-55,1	54,9	44,8-65,1	43,1	35,1-51,1
9 a 11	52,6	48,3-56,9	55,2	48,4-62,1	50,5	45,0-56,0
12 e mais	49,4	45,1-53,8	54,7	47,7-61,7	45,4	39,9-50,9
Total	49,7	45,5-54,0	55,0	48,2-61,7	45,3	40,1-50,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,5	9,4-23,6	12,5	5,5-19,5	20,1	8,5-31,8
25 a 34	24,6	16,3-33,0	33,8	19,0-48,5	16,8	8,7-25,0
35 a 44	12,9	8,5-17,4	19,8	11,1-28,4	7,2	3,8-10,5
45 a 54	7,9	4,4-11,4	10,1	4,0-16,3	6,0	2,1-9,8
55 a 64	5,6	2,6-8,6	5,5	1,1-10,0	5,6	1,6-9,6
65 e mais	4,2	1,3-7,1	5,7	0,0-11,5	3,2	0,2-6,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,2	9,5-18,9	19,1	11,1-27,0	9,9	4,5-15,4
9 a 11	19,2	15,6-22,9	20,5	14,8-26,2	18,2	13,5-22,9
12 e mais	11,5	8,7-14,3	13,1	8,4-17,8	10,2	6,7-13,8
Total	15,2	12,0-18,3	18,7	13,5-24,0	12,1	8,6-15,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,6	5,6-19,7	20,9	6,9-34,8	5,2	2,1-8,3
25 a 34	18,3	10,7-25,9	22,0	8,7-35,2	15,2	6,9-23,4
35 a 44	17,3	12,3-22,2	17,2	10,7-23,6	17,3	9,9-24,7
45 a 54	12,3	8,1-16,5	8,2	4,0-12,4	15,8	9,2-22,5
55 a 64	17,4	12,0-22,8	24,6	15,3-33,9	12,1	5,9-18,4
65 e mais	13,9	8,8-19,0	21,9	11,6-32,1	9,0	3,6-14,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,4	7,9-17,0	14,2	6,2-22,2	10,9	6,1-15,7
9 a 11	21,1	17,6-24,5	28,2	22,2-34,2	15,4	11,5-19,3
12 e mais	20,2	16,7-23,7	25,5	19,5-31,5	16,1	12,0-20,3
Total	15,6	12,6-18,6	19,0	13,6-24,3	12,7	9,6-15,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	42,1	29,5-54,6	48,1	29,5-66,7	36,6	19,5-53,8
25 a 34	45,3	36,1-54,5	46,0	31,1-60,9	44,6	33,1-56,1
35 a 44	46,2	39,4-53,1	53,3	42,0-64,6	40,2	31,7-48,7
45 a 54	38,0	31,3-44,7	48,0	36,8-59,2	29,4	21,7-37,1
55 a 64	27,2	20,7-33,7	34,6	24,4-44,8	21,8	13,5-30,0
65 e mais	5,3	2,0-8,7	10,8	2,6-18,9	1,9	0,1-3,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,7	34,0-47,3	43,9	33,6-54,3	37,8	29,2-46,5
9 a 11	38,3	34,0-42,6	51,7	45,0-58,5	27,7	22,6-32,8
12 e mais	37,0	32,8-41,2	40,8	34,0-47,7	34,1	28,8-39,4
Total	39,6	35,3-44,0	45,5	38,6-52,4	34,7	29,1-40,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	24,0	10,8-37,1	26,9	7,6-46,1	21,4	3,2-39,5
25 a 34	21,6	13,5-29,6	24,5	11,1-37,8	19,1	9,4-28,8
35 a 44	13,9	8,6-19,2	18,4	8,9-27,9	10,0	4,6-15,4
45 a 54	14,2	8,6-19,8	17,8	8,7-26,9	11,1	4,2-18,0
55 a 64	7,0	3,3-10,8	13,4	5,5-21,4	2,3	0,1-4,5
65 e mais	1,7	0,0-3,7	1,4	0,0-4,2	1,8	0,0-4,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,0	15,6-28,4	26,0	16,1-35,9	18,5	10,2-26,8
9 a 11	10,3	7,4-13,2	14,1	9,0-19,2	7,4	4,2-10,6
12 e mais	5,6	3,6-7,7	5,9	3,0-8,8	5,4	2,6-8,2
Total	17,0	12,8-21,2	20,7	14,1-27,3	13,9	8,6-19,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	31,8	19,8-43,9	10,4	0,0-21,6	51,1	35,3-66,9
25 a 34	40,2	31,4-49,0	6,1	2,3-9,9	69,2	59,5-78,9
35 a 44	37,6	31,4-43,9	13,1	7,2-19,1	58,4	50,0-66,8
45 a 54	35,9	29,7-42,1	11,2	4,9-17,5	57,2	49,2-65,3
55 a 64	31,2	24,5-38,0	12,5	5,5-19,5	45,0	35,2-54,8
65 e mais	18,1	12,5-23,8	16,1	5,4-26,7	19,4	13,1-25,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	37,2	30,9-43,4	9,0	4,0-14,0	61,7	54,1-69,3
9 a 11	37,8	33,7-41,9	14,9	10,2-19,6	55,9	50,4-61,3
12 e mais	17,0	13,8-20,3	8,1	4,4-11,8	23,9	19,1-28,6
Total	34,9	30,9-39,0	10,4	6,9-13,8	55,5	50,4-60,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	15,0	8,9-21,1	17,3	8,0-26,6	12,9	4,8-21,1
25 a 34	19,5	12,1-26,8	33,0	18,9-47,0	8,0	3,4-12,6
35 a 44	20,3	13,9-26,6	32,1	21,3-43,0	10,2	3,4-17,1
45 a 54	13,8	9,3-18,3	24,4	15,4-33,4	4,6	2,0-7,2
55 a 64	9,2	5,2-13,3	20,3	11,6-29,1	1,1	0,0-2,3
65 e mais	6,4	2,5-10,3	13,1	4,1-22,0	2,2	0,0-5,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,9	8,5-17,3	20,4	12,4-28,5	6,3	2,3-10,2
9 a 11	21,2	17,6-24,8	32,6	26,3-39,0	12,2	8,3-16,0
12 e mais	22,6	18,9-26,3	40,5	33,6-47,4	8,8	5,8-11,8
Total	16,2	13,2-19,1	25,8	20,2-31,3	8,1	5,5-10,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,0	0,7-3,3	3,5	0,8-6,1	0,7	0,0-1,8
25 a 34	1,7	0,5-2,9	3,6	0,9-6,3	0,0	0,0-0,0
35 a 44	1,8	0,6-2,9	3,6	1,1-6,1	0,2	0,0-0,6
45 a 54	0,9	0,1-1,6	1,6	0,0-3,2	0,2	0,0-0,7
55 a 64	1,4	0,2-2,6	3,3	0,5-6,2	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,3	0,0-0,8	0,7	0,0-2,1	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,1	0,0-0,2	0,1	0,0-0,4	0,0	0,0-0,0
9 a 11	3,6	1,9-5,4	7,7	3,9-11,4	0,4	0,0-1,3
12 e mais	4,8	2,8-6,8	9,8	5,5-14,1	0,9	0,0-1,9
Total	1,5	1,0-2,1	3,1	2,0-4,3	0,2	0,0-0,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,4	1,2-13,7	6,5	0,0-15,6	8,3	0,0-16,9
25 a 34	4,3	0,0-8,9	0,3	0,0-0,6	7,8	0,0-15,9
35 a 44	4,0	0,1-7,9	2,2	0,0-5,9	5,5	0,0-12,0
45 a 54	9,8	5,2-14,4	6,4	1,1-11,8	12,7	5,7-19,7
55 a 64	11,8	6,7-16,9	4,9	0,2-9,6	16,9	8,9-24,8
65 e mais	10,2	5,8-14,6	3,6	0,0-7,8	14,3	7,9-20,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	9,0	5,4-12,5	4,1	0,2-7,9	13,2	7,7-18,8
9 a 11	3,1	1,8-4,5	2,5	0,6-4,4	3,6	1,8-5,5
12 e mais	2,5	1,2-3,8	3,2	0,7-5,6	2,0	0,7-3,4
Total	6,7	4,5-8,9	3,6	1,0-6,1	9,3	5,9-12,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
50 a 59	86,3	80,5-92,1	68,1	60,2-76,1
60 a 69	90,8	84,9-96,7	66,2	55,7-76,8
Anos de escolaridade				
0 a 8	85,7	80,0-91,5	63,3	55,0-71,6
9 a 11	92,3	86,4-98,2	70,8	60,4-81,1
12 e mais	95,1	90,0-100,0	88,9	81,5-96,3
Total	87,8	83,4-92,2	67,5	61,1-73,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	72,6	62,7-82,6	66,7	56,3-77,2
35 a 44	83,4	77,3-89,5	77,1	70,4-83,8
45 a 54	92,2	87,8-96,7	81,7	75,6-87,9
55 a 59	86,4	76,6-96,1	72,2	59,9-84,5
Anos de escolaridade				
0 a 8	81,5	74,0-88,9	73,4	65,4-81,4
9 a 11	77,2	70,9-83,4	69,1	62,4-75,7
12 e mais	85,8	80,6-90,9	81,4	76,0-86,9
Total	80,9	76,2-85,7	73,4	68,3-78,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	46,3	34,0-58,6	40,9	21,6-60,2	51,2	35,3-67,1
25 a 34	40,3	31,3-49,2	32,7	18,1-47,2	46,7	35,6-57,8
35 a 44	39,3	33,0-45,6	28,2	19,6-36,8	48,7	40,3-57,0
45 a 54	31,9	26,1-37,7	22,6	13,6-31,5	39,9	32,4-47,5
55 a 64	23,2	17,5-29,0	13,1	6,6-19,7	30,6	22,1-39,2
65 e mais	14,7	9,9-19,5	6,6	2,1-11,2	19,7	12,7-26,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	31,2	24,6-37,9	27,9	17,3-38,6	34,1	25,8-42,5
9 a 11	42,3	38,0-46,5	27,0	20,8-33,2	54,3	48,8-59,8
12 e mais	58,2	53,9-62,5	43,3	36,3-50,4	69,6	64,5-74,7
Total	37,3	33,0-41,5	29,4	22,5-36,4	43,8	38,6-49,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,0	2,3-17,7	15,3	1,1-29,5	5,3	0,0-11,6
25 a 34	13,1	6,5-19,6	9,0	0,0-18,2	16,5	7,3-25,7
35 a 44	17,3	11,5-23,1	16,1	7,4-24,8	18,4	10,6-26,1
45 a 54	33,8	27,1-40,5	32,7	21,7-43,7	34,8	26,7-42,9
55 a 64	49,3	41,9-56,7	38,9	28,4-49,4	56,9	47,2-66,7
65 e mais	56,5	48,6-64,3	42,7	29,2-56,3	65,0	56,7-73,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,8	20,8-30,8	21,7	13,8-29,5	29,4	23,0-35,9
9 a 11	13,5	10,8-16,1	12,0	8,3-15,7	14,7	10,9-18,4
12 e mais	18,5	15,2-21,8	22,4	16,5-28,3	15,5	11,9-19,0
Total	21,8	18,6-25,0	19,4	14,3-24,5	23,8	19,8-27,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,4	0,0-3,6	2,4	0,0-7,0	0,5	0,0-1,3
25 a 34	0,1	0,0-0,2	0,0	0,0-0,0	0,2	0,0-0,4
35 a 44	1,5	0,3-2,8	1,5	0,0-3,0	1,5	0,0-3,5
45 a 54	14,4	9,0-19,9	14,2	6,5-21,9	14,7	7,1-22,3
55 a 64	14,9	9,4-20,3	12,9	5,8-20,0	16,3	8,5-24,2
65 e mais	17,2	11,3-23,0	15,2	4,9-25,5	18,4	11,4-25,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,0	4,1-7,9	4,7	1,9-7,4	7,2	4,6-9,7
9 a 11	2,7	1,7-3,8	3,9	2,0-5,8	1,8	0,7-2,9
12 e mais	4,1	2,4-5,8	6,3	2,8-9,7	2,4	1,0-3,9
Total	4,9	3,7-6,1	4,6	2,8-6,5	5,2	3,6-6,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,6	0,0-1,8	0,0	0,0-0,0	1,1	0,0-3,3
35 a 44	1,3	0,0-2,8	0,5	0,0-1,6	2,0	0,0-4,5
45 a 54	1,6	0,0-3,6	2,9	0,0-7,2	0,5	0,0-1,0
55 a 64	8,2	3,8-12,7	7,7	1,3-14,1	8,6	2,5-14,7
65 e mais	7,9	3,6-12,1	9,1	0,5-17,7	7,1	2,8-11,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,5	1,4-3,6	1,9	0,5-3,4	3,0	1,4-4,7
9 a 11	0,5	0,2-0,8	0,7	0,0-1,3	0,4	0,1-0,7
12 e mais	1,0	0,0-2,0	1,5	0,0-3,6	0,6	0,0-1,2
Total	1,8	1,1-2,5	1,6	0,6-2,5	2,0	1,0-3,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,5	1,3-5,7	1,9	0,0-3,8	4,9	1,1-8,8
25 a 34	8,4	3,9-12,9	7,2	1,3-13,1	9,4	2,8-16,0
35 a 44	22,2	16,1-28,3	21,4	12,4-30,3	22,8	14,5-31,1
45 a 54	33,6	27,0-40,1	29,2	18,7-39,6	37,3	29,2-45,5
55 a 64	36,5	29,6-43,5	28,1	18,7-37,6	42,7	33,0-52,4
65 e mais	38,1	30,8-45,4	15,5	6,7-24,4	52,2	43,2-61,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,0	13,3-20,7	10,3	5,6-15,0	22,8	17,3-28,4
9 a 11	16,9	14,0-19,8	17,6	12,8-22,4	16,4	12,9-19,9
12 e mais	23,3	19,5-27,0	26,1	19,6-32,5	21,1	16,8-25,5
Total	17,7	15,2-20,2	13,9	10,5-17,4	20,9	17,4-24,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,4	0,0-3,2	0,3	0,0-1,0	2,3	0,0-5,6
35 a 44	0,2	0,0-0,6	0,0	0,0-0,0	0,4	0,0-1,1
45 a 54	7,1	2,9-11,2	3,3	0,0-7,9	10,4	4,0-16,8
55 a 64	14,3	9,1-19,6	6,2	0,2-12,2	20,3	12,5-28,2
65 e mais	32,1	24,9-39,2	10,7	0,0-22,1	45,4	36,5-54,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,4	4,6-8,1	2,1	0,4-3,7	10,1	7,1-13,1
9 a 11	1,4	0,8-2,0	0,5	0,0-1,2	2,2	1,3-3,1
12 e mais	2,9	1,7-4,1	1,5	0,0-3,2	3,9	2,2-5,6
Total	4,7	3,6-5,8	1,6	0,5-2,7	7,3	5,5-9,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,4	0,4-2,3	1,4	0,0-2,8	1,4	0,1-2,7
25 a 34	4,3	0,9-7,8	2,5	0,3-4,8	5,9	0,0-11,8
35 a 44	3,4	1,4-5,4	2,5	0,2-4,8	4,1	1,0-7,2
45 a 54	1,9	0,1-3,7	0,4	0,0-1,2	3,2	0,0-6,4
55 a 64	3,7	1,4-6,1	2,9	0,0-6,5	4,4	1,2-7,5
65 e mais	5,8	2,1-9,5	4,3	0,0-9,4	6,7	1,7-11,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,8	1,1-4,5	0,7	0,0-1,3	4,7	1,6-7,7
9 a 11	3,5	1,9-5,1	4,8	1,7-7,8	2,5	0,9-4,1
12 e mais	4,3	2,5-6,1	4,2	1,3-7,0	4,4	2,2-6,6
Total	3,2	2,0-4,3	2,1	1,1-3,0	4,1	2,1-6,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,8	17,2-34,4	23,2	10,7-35,8	28,2	16,5-39,9
25 a 34	21,1	16,1-26,0	19,4	12,1-26,8	22,5	15,9-29,0
35 a 44	36,0	29,9-42,0	31,3	22,1-40,4	40,0	32,1-47,8
45 a 54	39,0	32,7-45,3	40,4	29,7-51,1	37,8	30,6-45,0
55 a 64	37,7	30,8-44,7	38,0	27,7-48,2	37,6	28,2-47,0
65 e mais	50,8	43,1-58,6	41,4	27,5-55,4	56,7	47,8-65,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,6	12,7-20,5	13,0	7,2-18,7	19,8	14,4-25,1
9 a 11	42,7	38,5-46,9	43,0	36,4-49,7	42,4	37,0-47,8
12 e mais	81,5	78,0-84,9	82,3	77,0-87,6	80,8	76,3-85,3
Total	31,1	27,8-34,3	28,3	23,4-33,3	33,3	29,1-37,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	57,4	43,5-71,4
26 a 30	61,7	45,5-77,9
31 a 35	68,1	51,3-84,9
36 a 40	67,1	56,4-77,8
41 a 45	66,2	54,5-77,9
46 a 50	55,7	43,6-67,9
Anos de escolaridade		
0 a 8	63,8	53,0-74,5
9 a 11	59,4	53,3-65,6
12 e mais	60,3	53,9-66,7
Total	69,8	65,2-74,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,0	2,9-13,1	2,6	0,4-4,8	12,9	3,7-22,1
25 a 34	12,4	6,8-17,9	6,3	0,2-12,3	17,5	9,0-26,1
35 a 44	14,6	10,0-19,1	8,8	2,5-15,2	19,4	13,1-25,8
45 a 54	13,6	9,6-17,6	7,1	2,2-12,1	19,2	13,3-25,2
55 a 64	19,9	13,9-25,8	11,3	3,9-18,7	26,2	17,5-34,8
65 e mais	17,0	11,1-22,9	13,8	4,3-23,3	19,0	11,6-26,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,3	8,8-15,8	5,6	2,2-9,0	18,2	12,6-23,8
9 a 11	13,0	10,0-16,0	7,9	3,7-12,2	16,9	12,8-21,1
12 e mais	15,4	12,3-18,4	11,4	6,9-15,9	18,4	14,3-22,5
Total	12,9	10,5-15,2	6,8	4,3-9,3	17,9	14,3-21,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	44,3	14,3-74,3	51,1	11,6-90,7	43,1	8,9-77,2
25 a 34	68,4	45,3-91,4	96,0	87,3-100,0	59,9	32,5-87,3
35 a 44	72,3	58,3-86,2	91,9	78,9-100,0	64,7	47,5-81,8
45 a 54	73,2	58,3-88,2	84,1	55,6-100,0	69,9	52,8-87,0
55 a 64	73,5	58,7-88,2	100,0	100,0-100,0	65,0	46,7-83,3
65 e mais	94,0	85,7-100,0	0,0	100,0-100,0	91,4	79,6-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	65,4	50,6-80,3	95,8	87,4-100,0	57,3	40,4-74,3
9 a 11	68,4	56,7-80,1	80,4	62,2-98,7	64,0	50,4-77,7
12 e mais	88,1	80,7-95,5	88,1	72,7-100,0	88,1	79,9-96,3
Total	69,4	59,7-79,0	90,0	82,3-97,7	62,9	51,4-74,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,3	4,6-15,9	18,6	7,8-29,4	2,6	0,9-4,3
25 a 34	16,4	9,8-23,0	24,8	13,1-36,6	8,6	3,5-13,6
35 a 44	15,2	10,3-20,2	22,4	14,1-30,8	8,3	3,3-13,4
45 a 54	14,1	9,5-18,6	18,4	10,9-25,9	9,9	4,9-15,0
55 a 64	14,0	7,8-20,2	18,4	7,4-29,4	10,2	3,7-16,7
65 e mais	5,2	1,1-9,3	7,6	0,5-15,7	3,4	0,5-7,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,4	11,9-21,0	25,9	17,8-34,1	7,4	4,2-10,6
9 a 11	9,6	7,5-11,7	13,6	10,0-17,2	6,2	3,8-8,6
12 e mais	9,0	5,8-12,1	12,0	6,7-17,3	5,9	2,6-9,3
Total	13,5	10,7-16,3	20,7	15,7-25,8	6,9	4,8-8,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,5	8,6-20,5	14,9	6,7-23,0	14,3	5,6-22,9
25 a 34	20,4	14,7-26,2	26,3	16,4-36,3	14,9	9,2-20,7
35 a 44	24,9	19,5-30,2	31,1	22,2-40,0	18,9	13,2-24,6
45 a 54	35,2	28,7-41,6	43,6	33,8-53,4	27,1	18,9-35,2
55 a 64	46,2	37,3-55,0	54,9	40,3-69,5	38,6	28,5-48,8
65 e mais	44,3	35,1-53,5	56,9	42,2-71,7	35,2	23,7-46,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	28,5	23,8-33,1	33,3	25,8-40,7	23,9	18,3-29,5
9 a 11	19,2	16,4-22,1	25,1	20,4-29,9	14,1	10,9-17,4
12 e mais	15,5	11,8-19,2	18,3	12,4-24,2	12,7	8,3-17,1
Total	24,3	21,4-27,1	29,3	24,7-34,0	19,6	16,2-23,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,3	0,1-0,7	0,3	0,2-0,9	0,3	0,2-0,9
25 a 34	5,4	0,2-10,5	9,5	0,7-19,7	1,4	0,1-2,8
35 a 44	2,7	0,4-4,9	4,7	0,4-8,9	0,8	0,8-2,4
45 a 54	5,8	3,0-8,5	7,4	2,8-11,9	4,2	1,1-7,4
55 a 64	1,8	0,0-3,5	0,5	0,2-1,3	2,8	0,4-6,0
65 e mais	0,2	0,2-0,5	0,0	0,0-0,0	0,3	0,3-0,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,4	0,7-6,2	5,9	0,4-11,4	1,0	0,2-1,9
9 a 11	2,3	1,2-3,4	3,0	1,1-4,9	1,7	0,4-2,9
12 e mais	3,2	1,4-4,9	4,0	1,0-6,9	2,3	0,4-4,2
Total	3,0	1,4-4,7	4,8	1,5-8,1	1,4	0,7-2,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	50,6	42,3-58,9	52,4	40,3-64,5	49,0	37,6-60,4
25 a 34	43,9	36,6-51,1	44,4	32,7-56,0	43,4	34,6-52,2
35 a 44	36,8	30,9-42,7	39,3	30,2-48,4	34,4	26,7-42,1
45 a 54	34,8	28,3-41,2	39,0	29,4-48,6	30,8	22,2-39,4
55 a 64	29,0	20,9-37,0	31,8	17,9-45,8	26,5	17,8-35,3
65 e mais	24,2	15,7-32,8	23,1	10,2-35,9	25,1	13,7-36,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	43,3	37,7-48,9	44,6	36,0-53,1	42,1	34,8-49,4
9 a 11	41,6	38,0-45,3	45,5	40,0-51,0	38,3	33,4-43,2
12 e mais	25,6	21,0-30,2	24,6	17,8-31,5	26,6	20,4-32,8
Total	41,3	37,7-44,8	43,1	37,7-48,6	39,5	35,0-44,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,7	18,2-33,3	27,8	16,8-38,8	23,7	13,2-34,1
25 a 34	38,1	31,3-45,0	31,7	22,2-41,2	45,4	36,4-54,4
35 a 44	54,6	48,5-60,7	57,1	47,8-66,5	51,9	43,9-59,8
45 a 54	57,3	50,4-64,1	62,9	52,9-72,9	51,4	41,9-60,9
55 a 64	55,7	46,3-65,2	58,2	43,8-72,6	52,9	41,3-64,6
65 e mais	46,1	35,8-56,3	47,1	32,2-62,1	45,1	31,0-59,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,7	36,1-47,3	37,1	29,3-44,9	46,9	39,1-54,8
9 a 11	40,9	37,2-44,5	44,4	38,9-49,8	37,6	32,7-42,5
12 e mais	49,4	44,1-54,7	67,5	60,2-74,7	31,1	24,6-37,6
Total	42,1	38,7-45,5	42,2	37,1-47,3	42,0	37,4-46,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,7	2,4-9,1	6,3	1,5-11,2	5,1	0,5-9,7
25 a 34	12,8	8,1-17,4	8,4	4,0-12,9	17,6	9,6-25,6
35 a 44	18,4	13,7-23,1	17,9	11,1-24,7	18,8	12,3-25,3
45 a 54	21,3	16,2-26,3	24,8	17,2-32,4	17,6	10,9-24,2
55 a 64	19,3	11,4-27,2	18,4	5,9-30,9	20,3	11,0-29,6
65 e mais	19,0	10,7-27,3	13,7	3,1-24,2	23,8	11,4-36,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,7	10,3-17,1	10,6	6,5-14,6	17,3	11,7-22,9
9 a 11	13,1	10,7-15,6	13,3	9,8-16,9	12,9	9,5-16,3
12 e mais	17,1	12,7-21,4	24,6	17,4-31,8	9,4	5,0-13,8
Total	13,8	11,7-16,0	12,7	10,0-15,5	14,9	11,7-18,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,6	16,1-29,1	26,0	15,6-36,4	19,5	11,7-27,3
25 a 34	24,7	18,2-31,1	25,3	14,2-36,4	24,0	17,2-30,8
35 a 44	21,7	17,1-26,4	18,7	12,0-25,3	24,7	18,4-31,0
45 a 54	25,2	19,8-30,6	22,9	15,1-30,7	27,4	20,0-34,8
55 a 64	29,8	21,9-37,8	24,2	11,4-37,1	34,6	25,0-44,3
65 e mais	29,2	20,8-37,6	30,2	16,8-43,6	28,5	17,8-39,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,4	16,9-26,0	23,2	15,6-30,8	19,7	14,6-24,9
9 a 11	26,4	23,1-29,6	23,7	19,0-28,4	28,6	24,2-33,0
12 e mais	33,6	28,7-38,6	29,6	22,6-36,6	37,7	30,8-44,5
Total	24,1	21,2-27,0	24,0	19,2-28,7	24,3	20,8-27,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,9	9,2-20,6	18,8	9,4-28,2	11,3	4,8-17,7
25 a 34	18,0	11,9-24,2	20,3	9,4-31,1	15,9	9,9-21,9
35 a 44	11,6	8,0-15,3	10,4	4,9-15,9	12,8	7,9-17,7
45 a 54	14,2	9,9-18,6	14,9	8,2-21,6	13,6	8,0-19,2
55 a 64	16,3	10,1-22,6	10,7	1,0-20,4	21,1	13,1-29,1
65 e mais	22,8	14,8-30,8	24,7	11,8-37,6	21,4	11,3-31,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,7	10,5-18,9	17,4	10,2-24,6	12,1	7,7-16,5
9 a 11	15,9	13,3-18,6	15,3	11,3-19,3	16,4	12,9-20,0
12 e mais	20,1	15,8-24,3	18,1	12,2-24,1	22,0	16,0-28,0
Total	15,5	12,9-18,2	16,8	12,3-21,2	14,4	11,5-17,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	37,9	30,0-45,9	54,6	42,5-66,7	22,5	14,0-31,1
25 a 34	33,6	26,8-40,5	39,0	28,0-50,0	28,6	20,2-37,0
35 a 44	25,9	20,5-31,4	38,8	29,6-47,9	13,6	8,6-18,7
45 a 54	18,8	13,9-23,7	28,4	19,9-36,9	9,6	5,1-14,1
55 a 64	21,1	13,5-28,8	34,4	20,1-48,8	9,8	4,5-15,1
65 e mais	14,0	7,3-20,7	20,3	8,3-32,3	9,4	2,1-16,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	28,0	22,8-33,2	40,5	32,1-48,9	16,2	10,4-21,9
9 a 11	32,8	29,2-36,3	42,6	37,1-48,0	24,4	19,9-28,9
12 e mais	28,8	23,9-33,7	36,2	28,5-43,9	21,4	15,6-27,2
Total	29,7	26,4-33,0	40,8	35,5-46,1	19,4	15,8-23,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	63,6	55,4-71,7	68,0	56,6-79,4	59,5	48,1-70,8
25 a 34	72,1	65,1-79,1	74,2	63,1-85,3	70,2	61,5-78,9
35 a 44	70,3	64,9-75,7	68,9	60,4-77,4	71,7	64,9-78,4
45 a 54	69,1	63,1-75,2	68,2	58,9-77,5	70,0	62,2-77,8
55 a 64	61,3	52,9-69,7	63,6	49,5-77,7	59,3	49,4-69,2
65 e mais	51,9	42,5-61,2	45,6	31,3-59,9	56,4	44,4-68,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	64,9	59,5-70,3	65,6	57,5-73,7	64,2	57,1-71,4
9 a 11	71,1	67,8-74,4	73,1	68,3-78,0	69,3	64,8-73,8
12 e mais	69,8	65,0-74,5	74,0	67,2-80,8	65,5	59,0-72,1
Total	67,4	64,0-70,7	68,8	63,7-73,8	66,1	61,7-70,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	29,7	22,4-37,1	36,2	24,8-47,7	23,8	14,5-33,0
25 a 34	34,0	26,8-41,1	38,5	26,7-50,3	29,7	21,9-37,5
35 a 44	24,5	19,5-29,6	25,8	17,9-33,7	23,3	16,9-29,7
45 a 54	21,7	16,5-26,9	26,4	18,0-34,9	17,2	11,1-23,3
55 a 64	17,5	10,5-24,5	25,2	12,2-38,1	10,9	4,7-17,2
65 e mais	11,8	5,9-17,7	17,4	6,6-28,2	7,7	1,3-14,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,7	20,6-30,9	30,7	22,3-39,1	21,0	15,1-26,9
9 a 11	29,8	26,3-33,2	34,2	29,0-39,5	25,9	21,5-30,4
12 e mais	28,1	23,2-33,0	32,8	25,2-40,5	23,4	17,5-29,2
Total	27,3	24,1-30,5	32,0	26,8-37,3	22,9	19,2-26,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,0	15,2-28,8	31,9	20,3-43,4	12,9	6,7-19,2
25 a 34	13,7	9,2-18,3	18,0	10,3-25,7	9,7	4,6-14,9
35 a 44	13,4	9,5-17,3	14,0	7,7-20,3	12,9	8,2-17,6
45 a 54	11,4	7,1-15,6	14,2	7,0-21,4	8,7	4,3-13,1
55 a 64	7,9	4,0-11,9	6,8	1,3-12,3	8,9	3,3-14,4
65 e mais	14,1	7,3-20,9	21,4	8,5-34,4	8,8	2,3-15,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,1	10,1-18,1	19,3	12,3-26,2	9,2	5,4-13,1
9 a 11	16,2	13,4-18,9	19,9	15,4-24,3	13,0	9,6-16,3
12 e mais	20,1	15,8-24,3	24,9	18,2-31,7	15,2	10,2-20,1
Total	15,3	12,8-17,8	20,0	15,6-24,3	11,0	8,5-13,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	45,4	37,1-53,8	61,2	49,7-72,6	30,9	20,3-41,5
25 a 34	50,5	43,3-57,6	68,4	58,3-78,5	33,6	25,9-41,3
35 a 44	56,9	51,1-62,7	69,5	61,5-77,4	44,8	37,2-52,3
45 a 54	46,9	40,3-53,6	60,3	50,7-69,9	34,2	25,5-42,9
55 a 64	43,4	34,5-52,2	64,0	50,1-77,9	25,7	17,0-34,3
65 e mais	11,0	5,3-16,7	18,9	7,7-30,1	5,4	0,3-10,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	48,1	42,5-53,6	68,6	61,0-76,2	28,6	22,0-35,1
9 a 11	48,4	44,7-52,0	58,7	53,3-64,1	39,5	34,6-44,3
12 e mais	40,7	35,5-45,9	43,6	35,8-51,4	37,8	31,0-44,6
Total	47,5	44,1-51,0	63,2	58,3-68,2	33,1	28,9-37,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	9,8	4,6-14,9	18,6	8,7-28,6	1,6	0,2-3,0
25 a 34	10,2	5,9-14,6	12,3	4,8-19,9	8,2	3,7-12,8
35 a 44	13,2	8,5-17,9	14,8	6,7-23,0	11,6	6,8-16,5
45 a 54	11,0	6,9-15,1	14,8	8,0-21,7	7,3	2,8-11,8
55 a 64	13,8	7,5-20,1	18,6	7,0-30,3	9,6	3,7-15,4
65 e mais	4,5	0,6-8,4	9,2	0,4-17,9	1,2	0,6-3,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,8	9,1-16,4	19,4	12,8-26,0	6,4	3,6-9,3
9 a 11	8,4	6,4-10,3	9,5	6,3-12,6	7,5	5,1-9,9
12 e mais	6,0	3,6-8,5	7,0	2,9-11,1	5,1	2,3-7,9
Total	10,7	8,5-12,9	15,1	11,0-19,2	6,7	4,8-8,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	29,6	21,8-37,4	13,3	4,8-21,9	44,7	33,2-56,1
25 a 34	39,2	32,3-46,0	12,0	5,3-18,7	64,6	56,6-72,7
35 a 44	40,5	34,8-46,2	16,7	10,5-22,8	63,4	56,0-70,8
45 a 54	40,8	34,3-47,3	15,1	8,0-22,3	65,3	56,9-73,7
55 a 64	31,9	24,2-39,7	10,6	0,9-20,2	50,2	40,0-60,4
65 e mais	29,3	21,2-37,4	23,7	11,5-35,9	33,3	22,4-44,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	38,3	33,0-43,6	13,7	8,2-19,2	61,6	54,5-68,7
9 a 11	36,6	33,1-40,1	16,2	12,2-20,2	54,1	49,1-59,0
12 e mais	19,2	15,3-23,0	9,6	4,9-14,4	28,7	22,8-34,7
Total	36,1	32,8-39,4	14,2	10,7-17,7	56,3	51,9-60,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,5	11,7-25,3	27,6	16,4-38,8	10,0	2,6-17,4
25 a 34	20,2	14,6-25,7	28,2	18,3-38,0	12,7	7,4-18,0
35 a 44	23,5	18,3-28,7	35,1	26,3-43,9	12,3	7,3-17,3
45 a 54	20,8	15,5-26,2	36,9	27,5-46,2	5,6	1,8-9,3
55 a 64	8,0	3,5-12,4	12,9	4,3-21,5	3,8	0,1-7,6
65 e mais	2,2	0,1-4,6	4,9	0,6-10,3	0,4	0,4-1,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,3	13,8-22,7	27,0	19,4-34,6	10,0	5,5-14,5
9 a 11	19,7	16,8-22,6	31,8	26,8-36,8	9,3	6,4-12,2
12 e mais	18,8	14,5-23,0	27,2	20,1-34,2	10,4	5,9-14,8
Total	18,8	16,0-21,6	28,6	23,8-33,4	9,8	7,0-12,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,1	0,5-4,7	4,4	1,0-9,8	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,5	0,1-1,1	1,1	0,2-2,3	0,0	0,0-0,1
35 a 44	2,2	0,6-3,8	4,1	0,8-7,3	0,3	0,2-0,8
45 a 54	1,3	0,1-2,4	2,6	0,3-5,0	0,0	0,0-0,0
55 a 64	0,4	0,3-1,0	0,8	0,7-2,3	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,0	0,2-2,3	2,1	0,4-4,7	0,0	0,0-0,0
9 a 11	1,6	0,6-2,6	3,5	1,4-5,7	0,0	0,0-0,0
12 e mais	2,3	0,9-3,7	3,6	1,2-6,0	1,0	0,3-2,3
Total	1,3	0,5-2,2	2,7	1,0-4,4	0,1	0,0-0,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,4	0,8-8,0	4,1	1,1-9,3	4,7	0,2-9,6
25 a 34	6,8	1,3-12,2	9,1	1,4-19,6	4,6	1,2-7,9
35 a 44	5,9	3,0-8,7	3,9	0,4-7,3	7,8	3,3-12,2
45 a 54	6,9	3,6-10,3	5,2	0,7-9,7	8,6	3,7-13,5
55 a 64	11,2	5,0-17,5	15,0	3,4-26,6	8,0	2,2-13,8
65 e mais	14,1	6,8-21,5	9,1	0,0-18,2	17,8	7,2-28,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	9,0	5,6-12,5	9,4	3,4-15,5	8,7	5,2-12,2
9 a 11	3,5	2,2-4,7	2,5	0,9-4,2	4,2	2,5-6,0
12 e mais	2,3	0,8-3,9	1,5	0,3-3,4	3,1	0,7-5,6
Total	6,6	4,5-8,7	6,5	2,8-10,2	6,7	4,6-8,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	82,8	75,6-90,0	65,0	55,9-74,2
55 a 59	77,0	65,3-88,6	63,9	51,4-76,3
Anos de escolaridade				
0 a 8	78,4	70,5-86,4	63,9	54,7-73,1
9 a 11	87,1	78,9-95,4	69,5	58,0-81,0
12 e mais	89,6	78,9-100,0	59,6	42,6-76,7
Total	80,7	74,4-86,9	64,6	57,2-72,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	81,9	75,7-88,1	80,9	74,6-87,2
35 a 44	86,4	80,2-92,5	78,5	71,3-85,7
45 a 54	88,9	83,0-94,8	80,7	73,7-87,7
55 a 59	87,0	77,4-96,5	78,4	67,5-89,3
Anos de escolaridade				
0 a 8	82,3	76,4-88,2	76,1	69,6-82,5
9 a 11	86,9	82,6-91,1	83,6	79,1-88,1
12 e mais	92,1	87,6-96,6	89,4	84,5-94,4
Total	84,8	81,2-88,4	80,0	76,0-83,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	31,6	23,9-39,2	16,9	8,0-25,8	45,1	33,8-56,4
25 a 34	30,1	23,8-36,5	20,1	11,5-28,6	39,6	31,0-48,2
35 a 44	31,0	25,9-36,0	17,2	11,5-23,0	44,1	36,6-51,6
45 a 54	29,0	23,0-34,9	25,4	16,7-34,1	32,4	24,2-40,5
55 a 64	17,4	11,4-23,3	9,0	1,0-17,1	24,5	16,2-32,8
65 e mais	12,9	6,6-19,2	6,9	0,2-13,7	17,1	7,7-26,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,6	20,7-30,5	15,4	9,3-21,4	35,4	28,2-42,5
9 a 11	31,7	28,3-35,0	20,6	16,2-24,9	41,2	36,4-46,0
12 e mais	40,2	35,1-45,4	26,3	19,5-33,2	54,1	47,2-61,1
Total	28,9	25,8-32,0	18,0	14,1-21,9	38,9	34,5-43,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,1	5,3-14,9	6,6	0,2-13,0	13,4	6,3-20,4
25 a 34	8,0	4,7-11,3	4,6	2,1-7,1	11,2	5,5-16,9
35 a 44	14,3	10,3-18,2	13,2	7,4-19,0	15,3	9,9-20,6
45 a 54	28,5	22,4-34,5	24,3	16,5-32,2	32,4	23,4-41,4
55 a 64	35,5	27,1-43,9	31,7	17,9-45,5	38,7	28,8-48,7
65 e mais	54,0	44,8-63,3	49,8	35,2-64,3	57,1	45,2-69,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,4	14,9-21,9	13,5	9,0-17,9	23,1	17,8-28,4
9 a 11	13,3	10,9-15,6	10,5	7,6-13,5	15,6	12,1-19,1
12 e mais	14,1	10,3-17,9	18,3	12,0-24,6	9,9	5,8-14,0
Total	16,3	14,1-18,5	12,9	10,1-15,8	19,4	16,2-22,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,1	0,8-7,0	5,9	2,0-13,7	0,5	0,3-1,4
25 a 34	1,2	0,1-2,5	1,7	0,7-4,2	0,7	0,2-1,5
35 a 44	3,8	1,7-5,9	4,9	1,6-8,2	2,8	0,2-5,3
45 a 54	6,0	2,9-9,2	6,1	1,6-10,7	5,9	1,5-10,4
55 a 64	10,9	5,1-16,6	10,9	0,8-21,0	10,8	4,5-17,1
65 e mais	18,1	10,6-25,6	18,5	6,9-30,1	17,8	8,0-27,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,6	3,3-7,8	7,1	2,9-11,4	4,1	2,3-5,9
9 a 11	2,3	1,4-3,2	2,5	1,2-3,9	2,1	0,9-3,3
12 e mais	3,4	1,1-5,7	3,9	0,3-7,5	2,9	0,1-5,7
Total	4,3	2,9-5,6	5,3	2,8-7,9	3,3	2,2-4,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,1	0,1-0,3	0,0	0,0-0,0	0,2	0,2-0,6
25 a 34	1,7	0,2-3,7	0,4	0,2-1,0	2,9	0,7-6,6
35 a 44	2,6	0,4-4,8	0,3	0,3-0,9	4,7	0,6-8,9
45 a 54	3,1	1,0-5,3	2,8	0,1-5,7	3,4	0,3-6,6
55 a 64	12,9	6,0-19,8	14,6	2,6-26,7	11,4	3,9-18,9
65 e mais	8,4	3,3-13,6	12,2	2,8-21,6	5,7	0,0-11,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,4	1,8-5,0	2,2	0,6-3,8	4,5	1,9-7,1
9 a 11	1,5	0,8-2,3	1,3	0,4-2,1	1,8	0,6-2,9
12 e mais	1,8	0,6-3,1	2,3	0,3-4,4	1,4	0,0-2,7
Total	2,6	1,7-3,6	1,9	0,9-2,9	3,3	1,8-4,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,0	2,1-7,9	5,8	0,8-10,8	4,3	1,1-7,4
25 a 34	7,7	4,8-10,6	6,3	2,4-10,2	9,1	4,8-13,4
35 a 44	21,9	16,8-26,9	22,9	15,1-30,7	20,8	14,3-27,3
45 a 54	32,4	26,3-38,4	27,3	19,0-35,6	37,2	28,6-45,8
55 a 64	35,1	26,9-43,3	28,5	15,2-41,8	40,8	30,8-50,8
65 e mais	35,9	26,8-45,0	25,8	12,9-38,8	43,1	30,9-55,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,0	13,8-20,2	14,0	9,4-18,7	19,8	15,4-24,3
9 a 11	13,4	11,2-15,7	13,2	9,9-16,5	13,6	10,6-16,7
12 e mais	18,5	14,3-22,6	21,0	14,3-27,6	16,0	11,1-20,8
Total	15,9	13,9-18,0	14,4	11,4-17,4	17,4	14,6-20,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,8	0,1-1,7	0,0	0,0-0,0	1,4	0,3-3,2
25 a 34	0,7	0,4-1,9	1,5	0,9-3,9	0,0	0,0-0,0
35 a 44	1,1	0,1-2,3	1,6	0,6-3,9	0,5	0,3-1,3
45 a 54	7,5	4,1-11,0	3,3	0,3-6,4	11,6	5,6-17,6
55 a 64	18,9	11,5-26,2	12,5	0,8-24,2	24,3	15,1-33,5
65 e mais	27,9	19,3-36,6	9,0	0,4-17,6	41,6	29,4-53,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,9	4,3-7,6	3,4	1,3-5,6	8,3	5,8-10,8
9 a 11	1,5	0,7-2,4	0,5	0,0-1,0	2,5	0,9-4,0
12 e mais	1,7	0,4-3,0	1,5	0,6-3,6	2,0	0,4-3,6
Total	4,1	3,1-5,1	2,3	1,1-3,6	5,8	4,3-7,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,6	1,9-7,3	2,9	0,0-5,9	6,1	1,7-10,6
25 a 34	3,4	1,6-5,3	0,7	0,1-1,4	6,0	2,6-9,4
35 a 44	2,9	1,1-4,6	3,3	0,4-6,3	2,5	0,5-4,4
45 a 54	2,0	0,5-3,4	2,5	0,0-4,9	1,5	0,1-3,2
55 a 64	3,3	0,8-5,8	3,9	0,0-7,8	2,8	0,4-6,0
65 e mais	2,1	0,0-4,3	1,7	0,5-3,8	2,4	1,0-5,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,9	1,4-4,4	2,0	0,3-3,6	3,8	1,3-6,3
9 a 11	3,8	2,4-5,1	2,3	0,9-3,8	5,0	2,8-7,2
12 e mais	5,3	3,1-7,5	4,4	1,3-7,5	6,2	3,1-9,3
Total	3,4	2,4-4,4	2,3	1,2-3,4	4,4	2,7-6,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	28,5	21,5-35,5	33,8	22,9-44,7	23,6	14,8-32,5
25 a 34	31,8	25,7-38,0	32,6	23,4-41,9	31,1	22,9-39,3
35 a 44	36,5	31,0-41,9	39,6	30,9-48,3	33,5	26,8-40,2
45 a 54	33,3	27,4-39,3	34,4	25,7-43,1	32,3	24,2-40,5
55 a 64	29,4	21,7-37,1	24,9	12,0-37,7	33,3	24,2-42,4
65 e mais	33,5	24,8-42,3	34,2	20,4-48,1	33,0	21,8-44,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,4	17,0-25,9	22,0	15,4-28,7	20,8	14,9-26,8
9 a 11	42,6	39,0-46,2	48,6	43,1-54,1	37,4	32,7-42,2
12 e mais	63,0	57,9-68,1	63,2	55,6-70,7	62,8	56,0-69,6
Total	32,0	29,0-35,0	34,2	29,6-38,9	30,0	26,1-33,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	65,3	55,3-75,2
26 a 30	73,2	62,3-84,1
31 a 35	81,9	74,2-89,6
36 a 40	72,4	63,3-81,6
41 a 45	63,8	52,1-75,4
46 a 50	59,8	46,8-72,7
Anos de escolaridade		
0 a 8	72,6	64,8-80,5
9 a 11	67,2	62,2-72,3
12 e mais	64,8	57,4-72,3
Total	64,8	59,3-70,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,4	1,7-11,0	2,0	0,3-4,2	10,4	2,0-18,8
25 a 34	10,9	6,9-14,8	8,0	2,5-13,5	13,5	7,9-19,1
35 a 44	13,1	9,1-17,1	10,5	4,9-16,2	15,6	9,9-21,3
45 a 54	12,9	8,6-17,1	6,9	2,3-11,6	18,6	11,7-25,4
55 a 64	12,7	7,3-18,1	8,9	1,1-16,7	16,0	8,6-23,4
65 e mais	14,8	7,8-21,7	10,5	0,6-21,6	17,8	8,8-26,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,7	8,4-14,9	7,5	3,9-11,1	15,6	10,4-20,8
9 a 11	9,5	7,4-11,7	6,5	3,7-9,2	12,1	8,9-15,3
12 e mais	8,3	5,5-11,0	4,8	1,8-7,8	11,8	7,2-16,3
Total	10,7	8,6-12,7	6,9	4,6-9,3	14,1	10,9-17,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	80,3	59,1-100,0	26,3	20,3-72,9	89,8	74,5-100,0
25 a 34	41,3	23,3-59,3	37,3	5,8-68,9	43,6	22,1-65,1
35 a 44	84,7	74,7-94,6	87,7	71,7-100,0	82,7	70,1-95,2
45 a 54	77,4	62,3-92,5	76,1	46,4-100,0	77,8	60,3-95,3
55 a 64	85,2	68,7-100,0	100,0	0,0-0,0	78,2	55,5-100,0
65 e mais	91,2	82,1-100,0	100,0	0,0-0,0	87,3	74,4-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	73,4	60,5-86,4	63,8	38,7-88,9	77,9	63,7-92,1
9 a 11	63,8	51,5-76,1	68,4	45,5-91,3	61,6	47,0-76,2
12 e mais	74,3	57,8-90,9	81,4	57,4-100,0	71,5	50,8-92,2
Total	70,6	61,5-79,8	66,2	48,6-83,9	72,6	62,2-83,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,7	2,6-14,7	10,4	1,3-19,5	7,0	1,1-15,2
25 a 34	12,0	6,4-17,6	15,2	6,4-24,1	9,2	2,0-16,4
35 a 44	13,9	8,4-19,4	15,7	6,4-24,9	12,5	6,0-18,9
45 a 54	16,9	11,8-21,9	19,9	10,7-29,2	14,4	9,2-19,6
55 a 64	19,5	13,7-25,4	22,5	12,9-32,2	17,4	10,2-24,6
65 e mais	8,6	4,8-12,3	9,1	3,2-15,1	8,2	3,4-13,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,1	12,9-21,4	19,0	12,1-25,8	15,6	10,3-20,9
9 a 11	7,5	5,5-9,5	10,3	6,8-13,9	5,2	3,0-7,4
12 e mais	6,1	3,9-8,4	8,7	4,5-12,9	3,9	2,0-5,8
Total	12,7	10,2-15,2	15,0	10,9-19,0	10,8	7,8-13,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,8	3,1-18,6	5,2	0,7-9,6	16,0	2,4-29,7
25 a 34	15,4	8,1-22,7	20,0	7,6-32,4	11,4	3,3-19,5
35 a 44	15,8	11,4-20,3	18,1	10,7-25,5	14,0	8,6-19,3
45 a 54	34,0	27,3-40,7	41,7	30,0-53,4	27,8	20,8-34,8
55 a 64	31,7	24,8-38,6	39,0	27,2-50,8	26,4	18,4-34,3
65 e mais	36,8	29,9-43,7	44,8	33,3-56,2	31,8	23,0-40,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,0	19,9-30,0	27,8	20,1-35,5	22,6	15,8-29,3
9 a 11	14,0	11,4-16,6	14,5	10,6-18,4	13,6	10,1-17,0
12 e mais	14,9	11,8-18,1	17,0	12,1-22,0	13,1	9,2-17,1
Total	20,2	17,3-23,2	22,4	17,8-26,9	18,5	14,5-22,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,3	0,2-8,8	6,1	1,4-13,7	2,6	2,4-7,6
25 a 34	5,8	1,2-10,5	6,5	0,1-13,0	5,2	1,5-11,8
35 a 44	6,4	2,2-10,6	7,7	0,2-15,6	5,3	1,4-9,3
45 a 54	7,8	3,6-11,9	13,2	5,0-21,5	3,3	0,4-6,3
55 a 64	6,7	3,1-10,2	10,0	3,3-16,6	4,3	0,5-8,1
65 e mais	3,2	0,8-5,5	4,2	0,3-8,0	2,5	0,4-5,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,8	5,5-12,2	11,2	5,6-16,8	6,8	2,8-10,7
9 a 11	2,0	0,9-3,1	3,8	1,4-6,1	0,6	0,1-1,2
12 e mais	1,4	0,5-2,3	1,9	0,3-3,4	1,0	0,0-2,0
Total	5,7	3,8-7,6	7,7	4,5-11,0	4,1	1,8-6,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	53,3	43,7-63,0	45,7	32,0-59,5	60,3	48,3-72,4
25 a 34	47,2	39,1-55,2	50,6	37,8-63,3	44,2	33,9-54,6
35 a 44	39,2	32,0-46,4	38,5	27,6-49,3	39,9	30,3-49,5
45 a 54	32,5	25,9-39,1	35,0	23,1-46,8	30,6	23,6-37,5
55 a 64	26,3	19,8-32,9	26,6	16,3-37,0	26,1	17,6-34,6
65 e mais	25,2	18,5-31,9	35,8	23,7-48,0	18,4	11,3-25,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,0	40,1-52,0	44,8	35,7-53,9	47,0	39,2-54,8
9 a 11	39,9	35,9-44,0	44,6	38,5-50,7	36,3	30,9-41,7
12 e mais	23,9	20,0-27,8	22,6	16,8-28,5	25,0	19,8-30,2
Total	41,2	37,5-44,9	41,7	36,2-47,3	40,8	35,9-45,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,7	14,3-31,1	26,4	14,4-38,3	19,2	7,2-31,2
25 a 34	41,1	32,9-49,3	49,7	36,8-62,7	32,5	22,5-42,5
35 a 44	46,3	39,4-53,2	49,5	39,0-60,0	43,3	34,1-52,6
45 a 54	57,6	50,9-64,4	57,4	46,0-68,7	57,9	50,2-65,6
55 a 64	56,1	48,7-63,6	57,9	46,1-69,6	54,8	45,2-64,4
65 e mais	54,2	46,5-61,9	45,6	34,2-57,1	60,9	50,9-70,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	45,1	38,9-51,3	40,5	31,4-49,6	49,7	41,4-58,0
9 a 11	39,6	35,6-43,6	49,6	43,6-55,7	31,3	26,3-36,4
12 e mais	42,5	37,9-47,2	58,8	51,8-65,9	28,5	23,1-33,8
Total	42,9	39,4-46,5	45,9	40,3-51,4	40,2	35,7-44,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,9	1,3-8,4	5,1	1,6-8,7	4,6	1,5-10,6
25 a 34	7,4	3,7-11,0	9,6	3,2-16,1	5,2	1,8-8,5
35 a 44	14,9	10,4-19,3	16,3	9,4-23,2	13,5	7,9-19,2
45 a 54	15,0	10,4-19,5	13,0	6,3-19,6	16,8	10,6-22,9
55 a 64	18,6	12,3-24,9	14,3	5,2-23,4	21,9	13,4-30,4
65 e mais	20,5	14,3-26,8	17,7	9,2-26,2	22,8	13,8-31,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,7	8,6-14,9	8,4	4,2-12,7	15,0	10,4-19,6
9 a 11	10,8	8,5-13,2	13,9	9,9-17,9	8,3	5,6-11,0
12 e mais	12,6	9,3-15,8	18,4	12,7-24,2	7,5	4,2-10,8
Total	11,6	9,7-13,4	11,5	8,7-14,4	11,6	9,1-14,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	35,8	26,3-45,4	37,2	23,1-51,3	34,6	21,8-47,5
25 a 34	37,3	29,2-45,3	38,0	24,9-51,1	36,6	26,7-46,6
35 a 44	36,2	30,2-42,3	30,6	22,1-39,2	40,9	32,5-49,3
45 a 54	39,8	33,6-45,9	33,3	23,4-43,2	44,9	37,5-52,4
55 a 64	36,5	29,8-43,2	30,2	20,3-40,0	41,1	32,2-49,9
65 e mais	44,2	37,1-51,3	47,3	35,6-59,0	42,3	33,5-51,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	33,1	27,5-38,8	31,8	22,7-41,0	34,2	27,1-41,3
9 a 11	41,0	37,0-44,9	38,6	32,8-44,5	42,8	37,4-48,2
12 e mais	48,6	43,9-53,2	44,6	37,6-51,6	52,0	46,0-58,1
Total	37,6	34,2-41,0	35,6	30,1-41,1	39,2	34,8-43,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,0	10,1-25,8	15,4	4,8-26,1	20,3	8,8-31,7
25 a 34	22,4	15,2-29,6	22,8	10,4-35,1	22,1	14,0-30,2
35 a 44	17,7	13,5-22,0	14,8	8,5-21,1	20,2	14,4-26,0
45 a 54	18,8	14,7-22,8	13,0	7,7-18,2	23,4	17,7-29,2
55 a 64	20,3	15,1-25,5	17,0	9,5-24,4	22,7	15,6-29,7
65 e mais	22,3	16,3-28,4	22,5	11,7-33,3	22,3	15,1-29,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,3	11,6-20,9	16,0	8,5-23,6	16,5	10,7-22,2
9 a 11	22,3	18,9-25,6	17,6	13,1-22,2	25,8	21,1-30,6
12 e mais	28,2	24,1-32,2	23,0	17,2-28,8	32,7	27,0-38,3
Total	19,7	16,9-22,6	17,5	12,9-22,0	21,6	17,9-25,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	30,5	22,3-38,8	39,9	26,5-53,2	22,0	13,3-30,7
25 a 34	40,3	32,3-48,3	53,3	40,5-66,0	29,1	19,2-39,0
35 a 44	35,8	29,1-42,4	57,6	47,5-67,6	17,5	11,0-24,1
45 a 54	22,1	15,8-28,4	37,3	25,7-49,0	9,9	5,7-14,0
55 a 64	17,5	12,2-22,8	21,9	13,3-30,6	14,3	7,6-20,9
65 e mais	15,6	10,3-20,9	25,7	16,0-35,4	9,1	3,0-15,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	30,6	25,2-36,1	46,7	37,6-55,8	17,0	11,3-22,8
9 a 11	32,0	28,1-35,8	43,1	37,2-49,1	23,3	18,5-28,1
12 e mais	27,3	23,1-31,5	37,5	30,7-44,4	18,4	13,5-23,2
Total	30,6	27,3-33,9	44,4	38,9-49,9	19,2	15,6-22,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	43,6	34,4-52,9	42,0	29,0-54,9	45,1	31,9-58,3
25 a 34	44,9	37,1-52,7	41,3	29,5-53,2	48,0	37,8-58,2
35 a 44	48,2	41,4-55,1	54,0	43,7-64,3	43,4	34,7-52,2
45 a 54	43,4	36,8-50,1	52,7	41,4-64,1	35,9	28,7-43,2
55 a 64	33,9	27,1-40,7	34,6	23,7-45,4	33,5	24,7-42,2
65 e mais	35,7	28,7-42,8	36,0	24,4-47,6	35,6	26,7-44,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	37,4	31,9-42,9	37,7	29,2-46,3	37,1	30,1-44,2
9 a 11	54,1	50,1-58,2	57,0	51,0-63,0	51,9	46,4-57,4
12 e mais	44,1	39,5-48,7	48,3	41,2-55,4	40,5	34,5-46,5
Total	43,4	40,0-46,9	44,9	39,5-50,3	42,2	37,8-46,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,3	8,3-20,3	16,1	6,4-25,8	12,7	5,6-19,8
25 a 34	15,9	10,6-21,2	12,9	6,8-19,0	18,5	10,3-26,6
35 a 44	10,5	5,9-15,1	15,2	7,1-23,3	6,6	1,6-11,6
45 a 54	6,0	2,3-9,7	10,5	2,8-18,2	2,4	0,4-4,4
55 a 64	1,7	0,4-3,0	2,0	0,2-4,2	1,4	0,1-3,0
65 e mais	4,7	1,7-7,7	6,4	0,8-12,1	3,6	0,2-6,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,0	6,5-13,6	11,4	5,7-17,0	8,9	4,4-13,4
9 a 11	13,4	10,5-16,3	15,5	11,0-19,9	11,8	7,9-15,7
12 e mais	8,4	5,9-11,0	10,8	6,6-14,9	6,4	3,3-9,5
Total	10,9	8,6-13,1	12,5	9,0-16,0	9,5	6,7-12,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,6	13,1-26,1	31,8	19,9-43,7	8,4	4,0-12,8
25 a 34	23,1	15,5-30,7	29,9	17,0-42,8	17,2	9,2-25,3
35 a 44	17,3	11,6-23,1	17,4	10,3-24,6	17,3	8,5-26,0
45 a 54	13,7	9,7-17,7	14,6	8,2-21,0	12,9	7,8-18,0
55 a 64	17,6	12,0-23,1	21,3	11,1-31,6	14,8	9,1-20,6
65 e mais	17,0	11,9-22,1	18,7	10,3-27,1	16,0	9,5-22,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,5	11,8-21,2	20,9	12,9-28,9	12,8	7,6-18,0
9 a 11	21,8	18,4-25,2	29,3	23,7-34,8	16,0	11,9-20,0
12 e mais	21,4	17,5-25,2	25,8	19,4-32,1	17,5	13,0-22,0
Total	18,8	15,9-21,6	24,0	19,2-28,9	14,4	11,2-17,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	29,4	21,1-37,8	31,8	19,9-43,7	27,3	15,5-39,1
25 a 34	43,2	35,3-51,1	46,1	33,5-58,6	40,7	30,7-50,7
35 a 44	40,0	33,4-46,7	56,4	46,3-66,6	26,3	19,4-33,3
45 a 54	36,5	29,8-43,3	46,1	34,6-57,7	28,8	22,0-35,6
55 a 64	19,4	14,0-24,7	30,9	20,6-41,2	11,0	6,0-16,1
65 e mais	8,6	4,9-12,3	17,2	8,9-25,5	3,1	0,6-5,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	30,1	24,7-35,5	40,8	32,0-49,6	21,1	14,5-27,7
9 a 11	39,8	35,8-43,8	48,9	42,9-54,9	32,8	27,6-38,0
12 e mais	33,9	29,4-38,3	30,0	23,2-36,7	37,3	31,4-43,2
Total	33,6	30,3-37,0	41,7	36,3-47,1	26,9	22,9-31,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,5	1,1-5,9	4,1	0,0-8,2	2,9	0,3-5,5
25 a 34	13,0	6,2-19,9	14,2	3,0-25,4	12,0	3,7-20,3
35 a 44	7,3	3,4-11,3	10,1	2,5-17,7	5,0	1,8-8,3
45 a 54	7,5	4,1-11,0	13,1	5,9-20,3	3,1	1,2-4,9
55 a 64	1,9	0,0-3,7	3,1	0,8-6,9	1,0	0,4-2,4
65 e mais	1,8	0,0-3,6	4,7	0,1-9,2	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,6	3,9-11,2	10,9	4,7-17,2	4,7	0,7-8,7
9 a 11	7,1	4,9-9,3	9,5	5,6-13,3	5,3	2,8-7,8
12 e mais	4,6	2,8-6,4	1,7	0,2-3,2	7,1	4,0-10,2
Total	7,0	4,9-9,2	9,2	5,5-13,0	5,2	2,8-7,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	32,6	22,6-42,6	12,5	2,9-22,1	51,0	37,3-64,7
25 a 34	38,5	30,4-46,7	23,6	10,2-36,9	51,4	41,2-61,7
35 a 44	35,8	29,5-42,2	10,3	5,0-15,7	57,1	48,0-66,2
45 a 54	43,6	36,9-50,2	23,8	12,3-35,3	59,5	52,1-67,0
55 a 64	31,4	24,9-37,9	16,5	7,9-25,1	42,2	33,2-51,1
65 e mais	21,7	16,3-27,1	18,4	9,6-27,2	23,8	16,9-30,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,5	34,7-46,4	20,4	12,3-28,5	57,5	50,1-64,9
9 a 11	34,5	30,7-38,3	14,8	10,7-19,0	49,8	44,3-55,3
12 e mais	15,4	12,3-18,5	8,9	5,0-12,8	21,1	16,4-25,8
Total	35,3	31,8-38,9	17,2	12,3-22,0	50,3	45,7-55,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,1	12,2-27,9	24,5	13,7-35,4	16,0	4,5-27,5
25 a 34	21,6	15,5-27,6	34,1	22,9-45,4	10,7	5,2-16,2
35 a 44	20,6	15,0-26,3	32,3	22,3-42,3	10,9	5,7-16,1
45 a 54	16,2	11,4-21,0	30,0	20,2-39,8	5,1	2,2-8,0
55 a 64	7,5	4,1-10,9	12,7	5,9-19,5	3,7	0,8-6,7
65 e mais	2,9	0,5-5,2	7,3	1,4-13,3	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,8	10,3-19,2	23,6	16,0-31,1	7,3	2,2-12,5
9 a 11	21,2	17,8-24,7	32,5	26,8-38,2	12,5	8,6-16,4
12 e mais	20,5	16,7-24,4	31,3	24,6-38,0	11,1	7,3-14,8
Total	17,5	14,8-20,3	27,3	22,6-32,0	9,5	6,3-12,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,8	0,6-8,1	7,8	1,0-16,7	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,3	0,4-2,2	2,6	0,6-4,6	0,2	0,2-0,5
35 a 44	2,1	0,5-3,8	4,2	0,8-7,7	0,4	0,4-1,2
45 a 54	2,2	0,1-4,3	4,7	0,1-9,3	0,2	0,2-0,5
55 a 64	0,4	0,1-0,9	1,0	0,2-2,1	0,0	0,0-0,0
65 e mais	1,2	0,1-2,5	3,1	0,3-6,5	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,1	0,2-4,0	4,6	0,6-8,7	0,0	0,0-0,0
9 a 11	1,5	0,7-2,4	3,4	1,4-5,3	0,1	0,1-0,2
12 e mais	3,2	1,4-4,9	5,7	2,3-9,0	1,0	0,4-2,4
Total	2,1	1,0-3,2	4,4	2,0-6,8	0,2	0,0-0,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,3	1,1-11,4	4,5	1,2-10,3	7,8	0,5-16,1
25 a 34	4,4	0,5-8,3	0,8	0,3-1,9	7,5	0,4-14,5
35 a 44	3,7	1,7-5,8	2,5	0,3-4,7	4,7	1,5-8,0
45 a 54	7,9	2,7-13,0	6,5	3,5-16,5	9,0	4,1-13,8
55 a 64	7,0	3,2-10,8	6,0	0,0-12,0	7,6	2,8-12,5
65 e mais	9,6	5,1-14,1	4,7	0,3-9,6	12,8	6,3-19,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,1	5,0-11,2	3,8	0,3-7,4	11,7	6,8-16,6
9 a 11	3,2	1,8-4,6	3,4	1,3-5,6	3,0	1,3-4,8
12 e mais	2,3	0,6-3,9	2,5	0,5-5,5	2,0	0,4-3,6
Total	5,8	4,0-7,6	3,5	1,4-5,7	7,7	4,9-10,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	91,2	86,1-96,2	74,5	66,7-82,2
55 a 59	78,7	70,1-87,4	60,2	50,4-70,1
Anos de escolaridade				
0 a 8	84,5	78,2-90,8	63,4	55,2-71,6
9 a 11	85,5	78,1-92,8	72,5	63,6-81,3
12 e mais	95,5	90,9-100,0	92,4	86,0-98,9
Total	86,1	81,4-90,8	68,7	62,5-74,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	68,2	58,8-77,7	64,4	54,6-74,1
35 a 44	84,1	76,4-91,7	81,5	73,7-89,3
45 a 54	94,9	91,7-98,2	83,5	77,7-89,3
55 a 59	93,0	86,0-100,0	78,8	67,4-90,1
Anos de escolaridade				
0 a 8	79,0	71,2-86,8	72,1	63,9-80,3
9 a 11	81,1	75,5-86,6	75,4	69,6-81,3
12 e mais	88,0	83,0-93,1	85,9	80,6-91,1
Total	81,0	76,4-85,6	75,2	70,4-80,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	38,9	29,3-48,5	19,8	11,5-28,2	56,4	43,0-69,7
25 a 34	34,5	27,5-41,5	25,9	16,1-35,7	41,9	32,3-51,6
35 a 44	42,2	35,5-48,9	25,5	17,8-33,2	56,2	47,4-65,0
45 a 54	36,9	30,6-43,2	22,6	12,2-33,1	48,4	40,8-56,0
55 a 64	27,4	21,2-33,6	17,7	7,9-27,5	34,3	26,2-42,5
65 e mais	22,9	17,0-28,9	14,6	6,9-22,4	28,2	20,1-36,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	27,5	22,1-32,9	14,0	8,0-19,9	38,9	31,1-46,7
9 a 11	42,9	38,9-46,9	30,0	24,6-35,3	52,9	47,4-58,4
12 e mais	55,2	50,6-59,9	41,3	34,3-48,3	67,4	61,7-73,2
Total	35,9	32,6-39,3	22,5	18,5-26,5	47,0	42,4-51,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,6	0,9-4,4	2,4	0,4-4,4	2,8	0,0-5,6
25 a 34	15,8	9,6-22,0	13,7	4,9-22,5	17,6	8,9-26,3
35 a 44	25,3	19,4-31,3	18,2	10,6-25,8	31,3	22,7-40,0
45 a 54	38,8	32,0-45,6	34,3	22,3-46,3	42,4	34,8-50,1
55 a 64	48,0	40,8-55,3	48,3	36,5-60,1	47,8	38,7-56,9
65 e mais	59,7	52,7-66,7	55,3	43,7-66,9	62,5	53,8-71,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	31,0	26,3-35,8	23,7	17,1-30,4	37,2	30,5-43,9
9 a 11	16,5	13,9-19,2	16,2	12,2-20,1	16,8	13,3-20,4
12 e mais	15,7	12,4-19,0	17,0	11,5-22,5	14,6	10,7-18,4
Total	24,5	21,8-27,3	20,5	16,6-24,5	27,8	24,1-31,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,6	0,9-6,2	4,3	2,9-11,4	1,2	0,3-2,7
25 a 34	0,5	0,0-0,9	0,4	0,2-1,0	0,6	0,1-1,2
35 a 44	4,9	1,7-8,1	4,7	0,1-9,5	5,1	0,8-9,4
45 a 54	11,7	7,0-16,4	11,6	3,4-19,8	11,8	6,4-17,2
55 a 64	18,1	11,8-24,4	21,4	10,3-32,6	15,7	8,7-22,8
65 e mais	21,7	15,6-27,9	16,2	8,0-24,4	25,2	16,8-33,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	9,4	6,8-12,0	8,9	4,4-13,3	9,8	6,8-12,9
9 a 11	2,7	1,6-3,8	2,3	0,7-4,0	2,9	1,4-4,4
12 e mais	5,1	3,1-7,2	6,3	2,6-9,9	4,1	2,0-6,2
Total	6,7	5,2-8,3	6,6	4,0-9,2	6,9	5,2-8,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,5	0,2-1,3	0,8	0,8-2,4	0,3	0,1-0,7
35 a 44	1,5	0,6-3,5	0,0	0,0-0,0	2,7	1,0-6,4
45 a 54	3,2	0,9-5,4	3,6	0,4-7,6	2,8	0,2-5,4
55 a 64	6,3	2,1-10,5	11,9	3,0-20,8	2,3	0,5-5,0
65 e mais	6,3	3,1-9,4	6,2	1,7-10,8	6,3	2,0-10,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,6	1,3-3,8	2,6	0,9-4,3	2,6	0,8-4,4
9 a 11	0,9	0,2-1,6	1,2	0,3-2,6	0,7	0,1-1,3
12 e mais	1,6	0,6-2,7	2,1	0,2-4,0	1,2	0,2-2,3
Total	1,9	1,2-2,7	2,1	1,0-3,2	1,8	0,8-2,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,8	2,2-11,4	6,9	0,4-14,3	6,6	0,9-12,4
25 a 34	14,4	8,5-20,3	12,4	4,4-20,4	16,1	7,6-24,6
35 a 44	19,1	14,2-24,0	16,1	9,2-23,1	21,6	14,7-28,4
45 a 54	35,9	29,7-42,1	28,8	18,9-38,8	41,7	34,1-49,2
55 a 64	42,5	35,3-49,8	34,3	22,8-45,7	48,5	39,4-57,7
65 e mais	42,4	35,1-49,6	24,3	12,8-35,7	53,9	45,0-62,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,9	19,6-28,2	15,7	9,7-21,7	30,8	24,7-37,0
9 a 11	17,2	14,4-20,0	15,3	11,3-19,3	18,6	14,8-22,5
12 e mais	20,9	17,2-24,6	24,0	18,0-30,1	18,2	13,8-22,6
Total	21,4	18,8-24,0	16,7	13,0-20,4	25,3	21,7-28,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,1	0,0	0,0-0,0	0,1	0,1-0,3
25 a 34	0,2	0,1-0,5	0,0	0,0-0,0	0,4	0,2-0,9
35 a 44	0,7	0,0-1,4	0,0	0,0-0,0	1,3	0,0-2,6
45 a 54	6,8	3,4-10,2	4,7	0,6-9,9	8,5	4,0-12,9
55 a 64	15,3	10,1-20,4	0,4	0,4-1,1	26,0	17,9-34,2
65 e mais	24,3	18,4-30,3	5,9	0,2-12,0	36,1	27,6-44,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,3	4,7-7,9	1,7	0,1-3,2	10,2	7,4-12,9
9 a 11	1,9	1,1-2,7	0,5	0,2-1,2	3,0	1,7-4,2
12 e mais	2,9	1,6-4,1	0,0	0,0-0,0	5,4	3,1-7,6
Total	4,5	3,6-5,4	1,1	0,2-2,0	7,3	5,7-8,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,9	0,1-11,8	5,6	4,9-16,2	6,2	0,5-11,9
25 a 34	4,0	1,2-6,9	2,3	0,4-4,3	5,5	0,5-10,4
35 a 44	2,4	0,2-4,6	4,1	0,4-8,6	0,9	0,5-2,4
45 a 54	2,5	0,7-4,2	1,7	0,7-4,2	3,1	0,7-5,4
55 a 64	4,0	1,1-6,9	2,4	1,8-6,6	5,1	1,1-9,1
65 e mais	3,2	0,5-5,9	2,6	0,4-5,7	3,6	0,4-7,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,1	1,3-6,9	4,0	0,8-8,9	4,1	1,1-7,2
9 a 11	3,4	1,9-4,9	3,2	1,2-5,3	3,5	1,4-5,6
12 e mais	3,5	2,0-5,1	1,6	0,2-3,0	5,2	2,6-7,8
Total	3,8	2,2-5,4	3,4	0,6-6,3	4,1	2,2-6,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,4	25,4-41,4	28,0	18,4-37,7	38,4	26,1-50,7
25 a 34	34,1	27,1-41,2	33,0	22,4-43,6	35,1	25,8-44,5
35 a 44	38,6	32,4-44,7	36,6	27,3-45,9	40,2	32,1-48,4
45 a 54	43,9	37,4-50,4	43,6	32,3-55,0	44,1	36,7-51,6
55 a 64	38,2	31,4-45,0	35,0	24,0-46,0	40,5	31,9-49,1
65 e mais	41,5	34,6-48,3	33,6	23,5-43,6	46,5	37,5-55,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,8	12,3-25,2	18,8	12,3-25,2	24,7	18,6-30,8
9 a 11	43,7	37,8-49,6	43,7	37,8-49,6	50,9	45,4-56,4
12 e mais	77,5	71,7-83,3	77,5	71,7-83,3	76,5	71,2-81,7
Total	37,3	34,1-40,4	34,3	29,6-38,9	39,7	35,5-44,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	60,4	48,3-72,5
26 a 30	58,5	43,6-73,4
31 a 35	65,1	50,3-80,0
36 a 40	78,7	69,2-88,2
41 a 45	70,4	59,5-81,3
46 a 50	60,5	49,5-71,5
Anos de escolaridade		
0 a 8	69,3	59,0-79,5
9 a 11	60,5	54,4-66,6
12 e mais	61,3	54,3-68,2
Total	64,6	57,3-71,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,6	5,0-16,2	8,2	0,5-16,0	12,7	4,7-20,7
25 a 34	13,8	9,0-18,6	14,6	6,4-22,9	13,1	7,6-18,6
35 a 44	18,7	13,4-24,0	6,7	1,4-12,0	28,8	20,6-37,0
45 a 54	17,5	11,7-23,2	15,3	4,4-26,1	19,3	13,5-25,1
55 a 64	21,5	15,2-27,7	20,6	10,3-31,0	22,1	14,3-29,9
65 e mais	18,4	12,9-23,8	8,5	2,6-14,4	24,7	16,9-32,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,3	13,4-21,2	13,3	7,4-19,2	20,6	15,3-25,9
9 a 11	12,9	10,2-15,6	7,9	4,4-11,4	16,7	12,8-20,7
12 e mais	15,6	12,3-18,9	11,8	7,2-16,4	18,9	14,2-23,6
Total	15,7	13,3-18,1	11,5	8,0-15,0	19,2	15,9-22,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	74,6	50,3-99,0	82,0	55,2-100,0	70,2	36,7-100,0
25 a 34	69,3	53,3-85,3	80,6	59,9-100,0	58,4	37,0-79,9
35 a 44	83,1	73,3-92,8	79,2	48,5-100,0	83,8	73,8-93,8
45 a 54	69,7	47,9-91,4	57,9	14,1-100,0	77,3	61,6-93,0
55 a 64	80,2	67,3-100,0	84,3	64,1-100,0	77,3	60,7-100,0
65 e mais	84,0	71,2-100,0	75,1	44,2-100,0	86,0	71,9-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	74,8	64,1-85,4	76,9	56,7-97,0	73,6	61,4-85,9
9 a 11	75,1	65,3-84,8	65,1	42,8-87,3	78,7	68,4-89,0
12 e mais	86,6	79,0-94,1	92,7	82,2-100,0	83,1	73,2-93,1
Total	76,4	69,3-83,5	76,7	62,6-90,8	76,3	68,3-84,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,6	6,8-30,4	38,1	18,3-57,9	1,4	0,0-2,8
25 a 34	8,2	3,7-12,6	9,3	2,2-16,5	7,0	1,7-12,2
35 a 44	11,4	6,7-16,1	12,4	5,9-18,9	10,3	3,6-17,0
45 a 54	18,7	11,9-25,6	22,3	11,9-32,6	14,0	6,4-21,7
55 a 64	10,6	4,0-17,3	14,1	3,3-25,0	6,0	0,4-11,6
65 e mais	10,5	2,6-18,4	13,4	0,5-27,3	7,6	0,3-15,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,2	11,0-25,3	27,0	15,4-38,6	7,4	2,9-11,9
9 a 11	7,2	5,1-9,3	8,8	5,4-12,3	5,9	3,4-8,5
12 e mais	6,6	5,0-8,3	8,8	5,9-11,6	4,7	2,8-6,5
Total	13,1	9,1-17,2	19,7	12,4-27,0	6,5	4,1-9,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,9	1,9-15,9	5,6	1,8-9,4	11,9	0,5-24,2
25 a 34	10,9	4,5-17,3	5,5	2,4-8,6	16,2	4,5-27,8
35 a 44	29,6	22,5-36,7	30,8	20,8-40,9	28,3	18,3-38,3
45 a 54	31,1	23,4-38,8	37,6	26,4-48,8	22,3	13,0-31,7
55 a 64	44,7	33,1-56,4	48,4	31,5-65,2	39,9	24,9-55,0
65 e mais	48,1	36,5-59,8	51,7	33,6-69,8	44,7	29,8-59,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,4	17,1-29,7	19,5	13,1-25,9	28,2	17,1-39,2
9 a 11	13,4	10,6-16,2	15,6	11,0-20,2	11,6	8,1-15,2
12 e mais	13,7	11,3-16,1	18,6	14,4-22,7	9,1	6,7-11,5
Total	18,9	15,4-22,5	18,3	14,3-22,3	19,6	13,8-25,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,1	2,4-10,5	7,8	5,5-21,0	0,8	0,3-1,9
25 a 34	0,8	0,1-1,5	1,0	0,2-2,1	0,7	0,2-1,5
35 a 44	5,1	1,8-8,4	4,0	0,4-7,5	6,3	0,5-12,1
45 a 54	7,0	2,1-12,0	8,6	0,8-16,4	5,0	0,1-9,8
55 a 64	0,6	0,1-1,3	1,1	0,2-2,4	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,9	0,9-2,7	0,0	0,0-0,0	1,8	1,7-5,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,2	0,4-7,9	5,4	1,1-11,8	2,7	0,2-5,2
9 a 11	2,3	1,1-3,5	3,0	1,1-4,8	1,9	0,3-3,4
12 e mais	2,0	1,1-2,9	2,5	1,1-3,8	1,5	0,4-2,7
Total	3,3	1,2-5,4	4,3	0,4-8,3	2,2	0,9-3,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	48,3	37,0-59,6	56,9	40,3-73,5	40,7	26,0-55,3
25 a 34	30,0	21,8-38,3	37,2	23,5-51,0	23,0	14,2-31,7
35 a 44	32,0	25,1-38,9	38,4	28,3-48,4	25,1	16,0-34,2
45 a 54	22,5	16,0-29,1	23,7	14,2-33,3	20,9	12,7-29,2
55 a 64	25,7	15,2-36,2	28,1	12,0-44,2	22,4	11,2-33,6
65 e mais	25,4	15,0-35,9	34,7	17,2-52,3	16,4	6,0-26,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	36,3	27,9-44,7	44,0	32,2-55,7	27,1	15,5-38,7
9 a 11	35,9	31,5-40,3	42,7	35,8-49,6	30,7	25,2-36,1
12 e mais	23,6	20,6-26,7	18,9	14,8-23,0	28,0	23,7-32,4
Total	34,6	29,7-39,5	40,7	33,3-48,0	28,5	22,4-34,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,3	7,5-21,0	20,2	7,2-33,1	8,8	4,2-13,3
25 a 34	44,9	34,9-54,9	51,8	37,1-66,5	38,0	24,9-51,2
35 a 44	48,6	41,3-55,9	59,8	49,6-70,0	35,6	25,7-45,5
45 a 54	55,5	47,2-63,8	59,2	47,9-70,5	49,5	38,1-60,8
55 a 64	59,0	47,1-71,0	62,8	46,3-79,2	53,7	36,9-70,5
65 e mais	49,6	35,9-63,3	59,5	40,6-78,5	35,6	18,0-53,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	42,7	34,1-51,4	48,0	36,2-59,8	35,5	23,3-47,6
9 a 11	32,3	28,2-36,5	39,7	33,1-46,3	26,5	21,3-31,7
12 e mais	40,0	36,4-43,5	58,7	53,5-64,0	22,3	18,4-26,1
Total	38,9	34,1-43,7	46,9	39,6-54,2	30,1	24,1-36,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,2	0,5-3,9	1,7	0,1-3,6	2,6	0,2-5,5
25 a 34	11,0	4,5-17,4	6,9	1,2-12,7	15,1	3,9-26,3
35 a 44	11,0	6,9-15,0	13,7	7,4-20,0	7,8	3,2-12,4
45 a 54	23,6	16,1-31,1	28,6	17,8-39,4	15,5	7,2-23,8
55 a 64	20,1	10,2-30,0	17,0	3,5-30,5	24,5	10,2-38,8
65 e mais	12,0	3,1-21,0	9,9	3,1-23,0	15,0	3,6-26,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,7	6,1-15,4	9,6	4,9-14,3	12,3	3,5-21,2
9 a 11	9,8	7,1-12,5	9,8	5,7-13,8	9,9	6,2-13,6
12 e mais	9,2	7,1-11,3	14,9	11,0-18,8	3,8	2,1-5,6
Total	10,2	7,6-12,9	10,3	7,2-13,4	10,2	5,8-14,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,9	15,9-31,9	22,1	9,1-35,0	25,5	15,7-35,3
25 a 34	31,8	22,8-40,8	22,4	10,7-34,1	41,0	28,4-53,7
35 a 44	32,3	26,2-38,5	26,4	18,5-34,2	38,7	29,3-48,1
45 a 54	31,3	24,1-38,4	27,1	17,5-36,7	36,9	26,2-47,5
55 a 64	23,4	15,1-31,7	13,0	3,9-22,2	37,1	23,3-50,8
65 e mais	30,6	20,7-40,4	25,3	11,0-39,7	35,7	22,4-49,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,8	16,0-29,7	19,4	10,7-28,1	27,0	16,2-37,8
9 a 11	33,0	29,0-37,1	23,6	17,9-29,3	40,3	34,6-45,9
12 e mais	46,9	43,4-50,5	42,1	36,8-47,4	51,5	46,7-56,2
Total	29,1	25,0-33,2	23,3	17,8-28,8	35,0	29,1-40,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	15,9	9,9-21,8	10,9	3,6-18,2	20,2	11,2-29,2
25 a 34	21,1	12,5-29,7	14,2	3,5-24,9	27,9	15,1-40,7
35 a 44	17,0	12,8-21,2	14,9	9,3-20,5	19,2	12,9-25,5
45 a 54	15,7	11,2-20,1	12,8	7,0-18,5	19,6	12,6-26,5
55 a 64	14,2	7,5-20,9	5,8	0,6-12,2	25,3	13,2-37,5
65 e mais	24,3	15,2-33,4	22,6	8,8-36,4	26,0	14,0-37,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,4	8,4-20,3	10,1	3,5-16,6	19,6	9,4-29,8
9 a 11	19,6	16,2-22,9	13,9	9,3-18,5	24,0	19,3-28,7
12 e mais	29,4	26,2-32,6	26,3	21,5-31,0	32,3	28,0-36,6
Total	17,9	14,4-21,4	13,1	8,8-17,3	22,8	17,4-28,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	49,3	38,0-60,5	55,5	38,4-72,6	43,8	28,8-58,8
25 a 34	42,2	32,6-51,8	52,7	37,9-67,5	31,9	19,9-43,9
35 a 44	41,7	34,6-48,8	51,5	41,3-61,7	31,3	21,9-40,7
45 a 54	33,7	26,2-41,2	38,5	27,7-49,3	27,2	17,1-37,3
55 a 64	24,1	14,4-33,7	29,1	14,9-43,4	17,3	4,7-29,9
65 e mais	24,6	13,9-35,4	39,0	20,8-57,2	10,6	2,4-18,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,7	36,2-53,3	51,4	39,8-62,9	36,7	24,0-49,5
9 a 11	38,9	34,5-43,3	48,4	41,6-55,2	31,6	26,0-37,2
12 e mais	37,5	34,0-41,0	46,0	40,6-51,3	29,6	25,2-33,9
Total	41,9	37,0-46,9	49,9	42,6-57,1	33,9	27,1-40,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	58,2	46,5-69,9	57,1	38,7-75,6	59,2	44,5-73,9
25 a 34	59,9	50,3-69,5	52,8	37,9-67,6	66,9	55,8-78,0
35 a 44	60,1	53,1-67,1	52,9	42,7-63,1	67,7	58,7-76,8
45 a 54	48,5	40,3-56,7	49,4	37,8-60,9	47,3	36,0-58,6
55 a 64	59,4	48,2-70,5	68,7	53,7-83,7	47,0	32,0-61,9
65 e mais	56,1	44,7-67,6	56,8	39,0-74,5	55,5	40,9-70,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	54,0	45,6-62,5	49,5	38,0-61,1	59,4	47,4-71,4
9 a 11	65,9	61,7-70,1	64,5	58,1-71,0	67,0	61,4-72,5
12 e mais	55,7	52,2-59,2	55,7	50,3-61,0	55,7	51,0-60,4
Total	58,1	53,2-63,1	54,5	47,2-61,9	61,8	55,4-68,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	38,5	26,8-50,2	48,6	30,7-66,5	29,5	16,8-42,3
25 a 34	34,9	24,8-45,1	42,9	27,4-58,3	27,2	15,0-39,4
35 a 44	18,0	11,9-24,0	16,4	8,9-23,8	19,7	10,2-29,3
45 a 54	14,5	8,8-20,2	15,4	7,4-23,4	13,2	5,2-21,2
55 a 64	8,1	2,8-13,4	4,0	0,5-8,5	13,6	3,3-23,9
65 e mais	7,6	0,8-14,4	11,4	0,9-23,8	3,9	1,6-9,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	33,4	24,5-42,3	39,0	26,4-51,6	26,6	15,3-38,0
9 a 11	23,5	19,8-27,3	24,2	18,6-29,8	23,0	17,9-28,1
12 e mais	18,1	15,3-20,9	20,2	16,0-24,5	16,1	12,4-19,8
Total	28,3	23,1-33,5	32,6	24,4-40,7	23,9	17,9-30,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	29,9	18,9-40,8	40,2	22,5-57,9	20,7	7,9-33,6
25 a 34	19,0	12,1-25,9	20,3	8,9-31,7	17,7	9,9-25,5
35 a 44	14,2	9,6-18,8	13,1	7,7-18,5	15,4	7,9-22,9
45 a 54	15,7	10,0-21,3	14,7	6,8-22,5	17,0	9,0-24,9
55 a 64	15,3	8,2-22,3	8,3	1,4-15,2	24,5	11,9-37,1
65 e mais	16,8	8,9-24,7	18,1	5,7-30,5	15,5	5,6-25,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,5	11,3-25,8	19,6	8,9-30,3	17,2	7,7-26,6
9 a 11	23,9	20,0-27,8	28,4	22,1-34,7	20,4	15,5-25,3
12 e mais	20,6	17,7-23,6	25,0	20,3-29,6	16,5	13,0-20,1
Total	20,6	16,4-24,8	22,8	16,2-29,4	18,3	13,2-23,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	57,3	46,9-67,7	65,9	51,5-80,2	49,7	35,5-64,0
25 a 34	50,3	40,6-60,0	57,5	42,7-72,4	43,1	30,2-56,1
35 a 44	50,9	43,7-58,0	57,4	47,6-67,3	43,9	33,8-53,9
45 a 54	50,4	42,2-58,6	57,3	46,0-68,6	41,3	29,9-52,7
55 a 64	36,1	24,6-47,6	49,6	32,8-66,4	18,2	5,4-31,1
65 e mais	21,0	10,3-31,6	39,9	21,6-58,2	2,5	1,2-6,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	57,4	49,3-65,5	66,5	55,7-77,2	46,4	33,9-58,9
9 a 11	45,9	41,5-50,4	52,9	46,1-59,6	40,6	34,7-46,5
12 e mais	36,0	32,6-39,4	34,8	29,7-40,0	37,1	32,6-41,6
Total	51,0	46,2-55,9	58,9	52,0-65,8	43,1	36,3-49,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,8	4,8-22,8	9,0	2,4-20,3	18,0	4,8-31,3
25 a 34	19,1	10,1-28,1	12,4	2,6-22,3	25,6	11,5-39,7
35 a 44	5,0	2,3-7,8	4,7	1,0-8,5	5,3	1,3-9,3
45 a 54	16,1	9,1-23,0	16,6	7,2-26,0	15,3	5,1-25,6
55 a 64	11,5	3,0-20,0	12,8	1,1-24,5	9,9	2,4-22,2
65 e mais	3,4	0,6-7,3	6,9	1,1-14,8	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,5	10,4-24,7	12,2	4,7-19,8	23,9	11,6-36,2
9 a 11	10,4	7,3-13,4	9,2	5,1-13,3	11,3	7,0-15,6
12 e mais	4,0	2,7-5,3	2,4	0,9-3,9	5,5	3,4-7,6
Total	13,5	9,4-17,6	10,2	5,6-14,9	16,9	10,2-23,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,1	17,0-33,1	8,2	1,9-14,5	39,9	26,9-53,0
25 a 34	42,8	33,3-52,4	23,2	10,6-35,8	62,1	49,8-74,3
35 a 44	37,8	30,8-44,8	12,0	5,2-18,7	65,4	56,0-74,7
45 a 54	33,5	26,0-41,0	14,4	6,4-22,4	59,1	47,7-70,5
55 a 64	30,4	20,7-40,1	8,0	0,4-15,6	60,1	45,2-74,9
65 e mais	27,9	17,8-38,0	11,5	0,8-23,8	43,8	29,3-58,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	35,5	27,9-43,1	16,0	8,1-23,9	59,1	46,5-71,7
9 a 11	38,1	33,8-42,4	13,3	8,9-17,8	57,1	51,3-63,0
12 e mais	21,7	18,9-24,4	10,2	7,3-13,2	32,5	28,2-36,8
Total	34,7	30,3-39,1	14,6	9,7-19,5	55,0	48,4-61,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	32,1	20,2-44,0	47,9	30,0-65,9	18,2	5,3-31,0
25 a 34	26,2	17,7-34,8	42,3	27,7-56,9	10,5	4,6-16,4
35 a 44	17,5	12,4-22,7	28,2	19,5-36,8	6,2	1,5-10,9
45 a 54	16,4	10,7-22,0	23,9	14,7-33,1	6,3	2,4-10,3
55 a 64	7,4	2,0-12,8	12,1	2,7-21,4	1,2	0,1-2,5
65 e mais	7,5	1,0-14,0	13,3	1,0-25,6	1,8	1,7-5,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,2	16,9-33,5	38,4	26,3-50,4	9,2	0,4-18,1
9 a 11	21,3	17,5-25,0	30,7	24,5-37,0	14,0	9,5-18,5
12 e mais	23,5	20,3-26,7	38,7	33,4-44,1	9,2	6,5-11,9
Total	23,7	18,9-28,5	36,2	28,7-43,8	11,0	6,3-15,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,2	0,2-2,1	1,9	0,2-3,7	0,5	0,3-1,3
25 a 34	3,6	0,8-6,3	6,2	0,8-11,6	1,0	0,3-2,3
35 a 44	4,8	2,1-7,4	9,1	4,0-14,3	0,1	0,0-0,2
45 a 54	2,2	0,6-3,9	3,8	0,9-6,7	0,1	0,1-0,3
55 a 64	1,9	0,6-4,3	3,3	1,1-7,6	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,7	0,7-2,2	1,5	1,4-4,4	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,9	0,2-3,7	3,6	0,4-6,8	0,0	0,0-0,0
9 a 11	3,2	1,7-4,7	5,9	3,0-8,8	1,1	0,2-2,4
12 e mais	5,7	3,8-7,6	11,1	7,4-14,8	0,6	0,1-1,2
Total	2,8	1,7-3,9	5,1	3,0-7,3	0,5	0,0-1,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,6	0,3-2,9	2,0	0,3-4,3	1,2	0,3-2,7
25 a 34	1,3	0,1-2,7	0,0	0,0-0,0	2,5	0,3-5,4
35 a 44	1,9	0,1-3,9	1,5	0,8-3,9	2,3	0,9-5,5
45 a 54	5,3	1,6-9,0	0,4	0,2-0,9	11,9	3,7-20,0
55 a 64	8,2	3,2-13,3	2,1	2,0-6,2	16,4	6,4-26,3
65 e mais	4,0	0,6-8,5	3,4	3,1-9,8	4,6	1,7-10,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,2	1,0-3,4	0,8	0,2-1,7	3,9	1,6-6,3
9 a 11	2,8	1,0-4,6	2,0	0,1-4,1	3,4	0,7-6,1
12 e mais	1,7	0,8-2,6	0,9	0,1-1,8	2,5	1,0-3,9
Total	2,3	1,4-3,2	1,1	0,3-2,0	3,6	2,0-5,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	74,0	60,8-87,2	52,3	37,6-66,9
55 a 59	81,7	68,6-94,7	45,6	29,7-61,4
Anos de escolaridade				
0 a 8	72,8	61,1-84,5	45,2	31,9-58,4
9 a 11	94,0	87,7-100,0	70,0	54,3-85,6
12 e mais	97,8	93,6-100,0	84,1	70,4-97,8
Total	76,5	66,7-86,4	50,0	38,9-61,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	93,1	89,5-96,6	89,7	84,1-95,4
35 a 44	91,8	85,1-98,4	90,2	83,3-97,1
45 a 54	99,2	98,1-100,0	92,3	86,7-97,9
55 a 59	93,9	86,6-100,0	83,4	68,8-97,9
Anos de escolaridade				
0 a 8	95,4	91,1-99,8	90,4	83,9-96,8
9 a 11	91,4	86,8-96,0	89,3	84,3-94,3
12 e mais	92,2	88,9-95,5	90,4	86,9-94,0
Total	93,6	90,8-96,4	90,0	86,3-93,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	36,1	26,3-46,0	15,1	7,8-22,4	54,7	40,2-69,1
25 a 34	48,2	38,5-57,8	28,5	15,3-41,7	67,4	56,4-78,4
35 a 44	40,0	33,3-46,7	24,2	16,3-32,2	56,8	46,4-67,2
45 a 54	33,3	25,7-40,8	18,2	9,9-26,5	53,4	42,0-64,8
55 a 64	24,5	15,6-33,5	13,0	2,8-23,2	39,9	25,5-54,2
65 e mais	16,5	9,0-24,0	8,4	0,8-16,0	24,4	12,3-36,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	31,0	23,1-38,8	15,5	7,4-23,5	49,7	37,5-61,9
9 a 11	47,2	42,7-51,7	28,0	21,9-34,1	62,0	56,3-67,8
12 e mais	56,7	53,1-60,2	35,2	30,1-40,4	76,9	72,8-81,1
Total	39,4	34,8-44,1	21,4	16,1-26,6	57,8	51,3-64,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,2	2,1-12,3	3,3	0,2-6,4	10,7	1,8-19,6
25 a 34	10,9	5,4-16,3	13,5	4,7-22,3	8,3	1,7-14,9
35 a 44	12,0	7,0-17,1	15,8	7,0-24,7	8,0	4,2-11,7
45 a 54	25,9	18,7-33,1	24,2	14,1-34,4	28,2	18,2-38,1
55 a 64	47,1	35,5-58,6	43,2	26,4-60,0	52,2	37,4-67,1
65 e mais	64,2	52,7-75,7	60,9	42,7-79,2	67,5	53,6-81,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,4	12,4-22,4	16,9	10,3-23,6	17,9	10,5-25,4
9 a 11	10,9	8,1-13,7	11,2	7,1-15,3	10,7	6,9-14,4
12 e mais	13,0	10,6-15,5	16,9	12,6-21,1	9,4	6,8-12,0
Total	14,7	11,9-17,6	15,3	11,2-19,4	14,1	10,2-18,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,1	0,1-0,2	0,1	0,1-0,3	0,0	0,0-0,0
25 a 34	2,1	0,4-4,6	2,9	1,9-7,8	1,2	0,0-2,5
35 a 44	1,4	0,2-2,5	0,6	0,0-1,3	2,1	0,2-4,5
45 a 54	2,3	0,7-3,8	1,2	0,1-2,5	3,7	0,6-6,9
55 a 64	15,0	5,5-24,5	10,4	2,4-23,1	21,2	7,2-35,2
65 e mais	18,6	10,0-27,2	22,3	8,0-36,6	14,9	5,3-24,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,0	1,2-4,9	3,0	0,0-5,9	3,1	1,3-5,0
9 a 11	1,3	0,5-2,1	1,0	0,0-1,9	1,6	0,4-2,8
12 e mais	2,4	1,3-3,5	2,6	0,9-4,4	2,2	0,9-3,5
Total	2,4	1,4-3,4	2,4	0,6-4,2	2,4	1,4-3,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,2-0,6	0,0	0,0-0,0	0,4	0,4-1,2
25 a 34	0,2	0,1-0,5	0,1	0,1-0,4	0,3	0,3-0,9
35 a 44	0,2	0,1-0,5	0,0	0,0-0,0	0,5	0,2-1,1
45 a 54	2,7	0,0-5,4	3,8	0,9-8,4	1,3	0,1-2,6
55 a 64	6,0	1,8-10,3	1,3	0,3-2,9	12,3	3,1-21,5
65 e mais	5,6	0,2-11,1	6,7	2,3-15,7	4,6	1,7-10,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,9	0,3-1,6	0,8	0,3-1,8	1,2	0,3-2,1
9 a 11	0,8	0,2-1,3	0,5	0,0-0,9	1,0	0,1-1,9
12 e mais	1,0	0,4-1,7	1,3	0,2-2,3	0,8	0,0-1,6
Total	0,9	0,5-1,3	0,7	0,1-1,4	1,1	0,5-1,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,4	1,0-3,9	0,8	0,2-1,9	3,8	1,2-6,5
25 a 34	6,1	2,4-9,8	8,1	1,0-15,1	4,2	2,0-6,4
35 a 44	15,2	10,3-20,1	16,6	9,3-23,9	13,7	7,2-20,1
45 a 54	24,4	17,7-31,1	20,5	12,3-28,7	29,6	18,8-40,3
55 a 64	40,0	28,7-51,3	27,0	10,9-43,0	57,2	42,3-72,2
65 e mais	23,7	14,6-32,8	8,1	0,7-16,9	38,9	24,8-53,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,5	8,0-15,0	10,0	4,8-15,1	13,4	8,6-18,2
9 a 11	8,1	6,0-10,2	8,2	5,1-11,4	8,0	5,2-10,8
12 e mais	15,8	13,3-18,3	18,1	14,2-22,1	13,6	10,6-16,7
Total	10,9	8,9-13,0	10,4	7,2-13,7	11,4	8,9-13,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,1	0,1-0,2	0,0	0,0-0,0	0,1	0,1-0,3
35 a 44	0,3	0,0-0,6	0,0	0,0-0,0	0,6	0,1-1,3
45 a 54	3,2	0,2-6,2	0,0	0,0-0,0	7,5	0,6-14,3
55 a 64	13,9	6,4-21,3	0,7	0,7-2,2	31,3	16,7-45,9
65 e mais	19,5	11,0-28,0	0,0	0,0-0,0	38,6	24,2-52,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,4	1,4-3,5	0,0	0,0-0,0	5,4	2,9-7,9
9 a 11	0,3	0,1-0,6	0,1	0,1-0,4	0,5	0,1-0,9
12 e mais	1,1	0,5-1,6	0,0	0,0-0,0	2,0	0,9-3,2
Total	1,6	1,0-2,1	0,0	0,0-0,1	3,1	2,0-4,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,8	0,2-7,4	1,8	0,3-3,8	5,6	0,8-12,0
25 a 34	10,6	3,1-18,1	11,2	1,9-24,3	9,9	2,5-17,3
35 a 44	3,9	1,5-6,3	3,1	0,3-6,0	4,7	0,7-8,7
45 a 54	7,2	2,8-11,6	5,3	0,4-11,0	9,6	2,8-16,5
55 a 64	0,7	0,6-1,9	0,0	0,0-0,0	1,5	1,5-4,5
65 e mais	3,5	1,3-8,4	0,6	0,6-1,9	6,4	2,8-15,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,7	2,8-12,6	6,5	0,8-13,9	9,1	2,7-15,4
9 a 11	4,4	2,7-6,2	3,9	1,5-6,4	4,8	2,3-7,4
12 e mais	4,1	2,6-5,6	2,7	0,8-4,6	5,5	3,2-7,8
Total	6,2	3,4-9,0	5,3	0,9-9,8	7,1	3,7-10,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	30,3	20,8-39,8	30,3	15,4-45,1	30,4	18,2-42,6
25 a 34	26,3	19,3-33,3	27,3	15,4-39,2	25,4	18,0-32,7
35 a 44	29,6	24,3-34,9	29,1	21,7-36,4	30,1	22,6-37,7
45 a 54	36,2	29,0-43,5	40,1	29,3-50,9	31,1	22,5-39,7
55 a 64	37,5	27,0-48,0	34,2	19,6-48,8	41,8	27,3-56,3
65 e mais	39,0	27,7-50,4	40,0	22,1-58,0	38,1	23,9-52,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,3	10,2-22,4	18,6	9,6-27,6	13,5	5,7-21,3
9 a 11	38,1	33,9-42,4	39,3	32,7-45,9	37,2	31,6-42,8
12 e mais	70,4	67,0-73,7	71,2	66,3-76,2	69,6	65,1-74,1
Total	30,1	26,2-34,0	30,7	24,7-36,7	29,4	24,5-34,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	47,7	34,2-61,2
26 a 30	84,9	77,3-92,6
31 a 35	77,7	66,5-88,9
36 a 40	63,6	50,7-76,5
41 a 45	72,1	57,2-87,1
46 a 50	59,3	45,1-73,5
Anos de escolaridade		
0 a 8	63,0	48,0-78,0
9 a 11	65,4	59,4-71,4
12 e mais	67,4	62,7-72,2
Total	79,4	75,5-83,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,3	2,6-20,1	8,2	3,1-19,4	14,1	1,2-27,0
25 a 34	10,7	5,2-16,2	1,7	0,0-3,4	19,5	9,4-29,6
35 a 44	15,4	10,6-20,2	6,8	3,0-10,6	24,6	16,0-33,1
45 a 54	18,0	11,9-24,1	8,2	2,6-13,9	31,0	20,0-42,1
55 a 64	17,6	8,9-26,3	14,4	2,5-26,2	21,8	9,3-34,4
65 e mais	17,8	8,9-26,7	15,1	1,4-28,8	20,4	8,9-31,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,1	8,3-20,0	6,2	0,7-11,8	23,7	13,2-34,2
9 a 11	11,0	8,2-13,7	5,1	2,4-7,8	15,5	11,2-19,8
12 e mais	14,5	12,1-16,9	10,0	6,9-13,1	18,8	15,2-22,3
Total	13,1	9,8-16,5	6,4	2,9-9,8	20,0	14,5-25,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,8	0,4-24,0	16,4	10,5-43,3	9,5	3,4-22,4
25 a 34	63,0	32,5-93,6	85,1	64,8-100,0	61,1	28,5-93,6
35 a 44	76,3	61,5-91,1	72,3	43,4-100,0	77,5	60,4-94,5
45 a 54	85,6	71,8-99,5	82,9	56,8-100,0	86,6	70,2-100,0
55 a 64	98,1	94,8-100,0	0,0	0,0-0,0	96,4	90,2-100,0
65 e mais	89,5	75,4-100,0	0,0	0,0-0,0	82,1	59,2-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	51,4	28,6-74,1	46,0	2,9-89,0	53,1	26,6-79,6
9 a 11	66,6	52,7-80,5	80,3	57,1-100,0	63,0	47,0-79,1
12 e mais	84,1	77,6-90,7	82,6	70,5-94,7	85,0	77,3-92,7
Total	59,9	44,3-75,5	60,6	28,3-92,9	59,6	41,9-77,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,4	5,6-21,2	17,0	4,6-29,4	9,9	0,5-19,3
25 a 34	22,6	16,8-28,4	25,8	16,9-34,7	19,6	12,2-27,0
35 a 44	21,2	16,0-26,3	19,3	11,9-26,7	22,8	15,7-29,8
45 a 54	24,2	19,4-29,0	26,8	18,9-34,6	22,2	16,3-28,0
55 a 64	24,1	17,5-30,7	24,7	14,1-35,4	23,7	15,3-32,0
65 e mais	8,7	5,0-12,4	16,5	7,8-25,2	4,4	1,8-7,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,7	17,9-27,4	26,2	18,2-34,1	19,9	14,3-25,6
9 a 11	19,5	16,0-23,0	24,4	18,6-30,2	15,4	11,2-19,6
12 e mais	13,8	11,0-16,6	12,3	8,3-16,3	15,1	11,2-19,1
Total	19,4	16,9-21,9	21,8	17,8-25,9	17,5	14,4-20,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	27,6	15,7-39,4	26,3	10,1-42,5	28,8	11,5-46,1
25 a 34	10,1	6,2-14,1	12,3	6,4-18,2	8,2	2,8-13,5
35 a 44	21,7	16,4-26,9	21,2	13,6-28,8	22,1	14,9-29,2
45 a 54	28,9	23,9-34,0	32,4	24,0-40,7	26,2	20,0-32,4
55 a 64	33,9	27,2-40,6	44,1	32,8-55,5	26,3	18,6-33,9
65 e mais	36,0	30,3-41,8	55,5	44,8-66,1	25,4	19,2-31,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,3	23,6-35,0	33,1	24,2-41,9	26,3	18,9-33,8
9 a 11	22,8	19,1-26,5	23,2	17,8-28,5	22,5	17,4-27,6
12 e mais	18,0	15,0-21,0	22,8	17,8-27,7	13,7	10,1-17,3
Total	24,5	21,5-27,5	27,5	23,0-32,0	22,1	18,1-26,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,0	0,8-8,9	3,1	0,1-6,0	5,0	3,9-14,0
25 a 34	7,3	3,6-11,0	7,7	2,5-12,8	6,9	1,7-12,2
35 a 44	9,7	5,7-13,7	6,8	1,7-11,8	12,1	6,1-18,1
45 a 54	12,4	8,6-16,3	12,2	6,3-18,1	12,6	7,5-17,6
55 a 64	11,8	6,8-16,8	15,0	6,4-23,5	9,5	3,6-15,4
65 e mais	3,8	1,5-6,1	9,5	3,4-15,7	0,6	0,1-1,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,7	7,4-14,0	10,0	5,7-14,2	11,3	6,4-16,1
9 a 11	6,5	4,3-8,7	8,2	4,7-11,8	5,1	2,4-7,9
12 e mais	5,5	3,5-7,5	5,4	2,4-8,3	5,6	2,9-8,3
Total	8,2	6,4-9,9	8,2	5,9-10,5	8,1	5,6-10,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	54,4	43,1-65,8	44,3	28,6-59,9	64,3	49,0-79,6
25 a 34	43,3	36,5-50,0	48,7	38,9-58,4	38,2	29,0-47,5
35 a 44	35,6	29,4-41,7	32,6	23,1-42,0	38,1	30,0-46,2
45 a 54	34,4	28,9-39,8	40,5	31,6-49,5	29,5	23,0-36,1
55 a 64	28,6	21,9-35,3	29,1	18,7-39,5	28,2	19,4-37,0
65 e mais	21,0	15,8-26,2	19,9	11,3-28,4	21,6	15,1-28,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,9	35,0-46,9	43,4	34,2-52,6	39,0	31,2-46,8
9 a 11	38,8	34,3-43,3	38,6	32,1-45,2	38,9	32,8-45,0
12 e mais	32,0	28,0-35,9	29,8	23,9-35,6	33,9	28,5-39,4
Total	38,0	34,8-41,2	38,3	33,5-43,1	37,7	33,4-42,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	38,3	26,2-50,4	31,1	16,9-45,3	45,7	28,0-63,4
25 a 34	39,5	32,9-46,1	52,9	42,9-62,8	26,7	18,7-34,8
35 a 44	49,3	43,0-55,7	61,3	52,0-70,5	39,1	30,9-47,3
45 a 54	57,7	52,2-63,3	64,0	55,5-72,6	52,6	45,4-59,8
55 a 64	64,0	57,3-70,8	64,1	53,0-75,1	64,0	55,7-72,3
65 e mais	56,0	49,7-62,2	60,5	49,9-71,2	53,2	45,5-60,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	56,3	50,1-62,4	55,3	45,5-65,0	57,1	49,4-64,8
9 a 11	46,0	41,4-50,5	52,6	45,9-59,3	40,4	34,3-46,4
12 e mais	39,9	35,9-44,0	53,5	47,3-59,7	27,7	23,0-32,4
Total	49,0	45,7-52,2	54,0	49,0-59,0	44,6	40,2-49,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,6	0,6-15,9	7,5	1,7-16,7	7,8	6,0-21,5
25 a 34	11,4	7,1-15,6	11,6	5,9-17,3	11,1	4,8-17,4
35 a 44	17,5	12,2-22,7	19,9	11,4-28,4	15,4	9,0-21,8
45 a 54	23,2	18,2-28,2	23,4	15,5-31,2	23,1	16,5-29,6
55 a 64	21,7	15,6-27,8	17,3	9,3-25,3	25,2	16,5-33,9
65 e mais	18,3	13,1-23,4	17,0	8,5-25,6	19,0	12,5-25,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,1	17,2-27,0	17,7	10,9-24,4	17,7	10,9-24,4
9 a 11	11,9	9,2-14,6	13,1	8,6-17,6	13,1	8,6-17,6
12 e mais	9,6	7,2-12,0	14,8	10,5-19,2	14,8	10,5-19,2
Total	15,9	13,4-18,3	15,6	12,2-19,1	16,1	12,7-19,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	26,9	17,7-36,1	31,9	17,6-46,2	22,0	10,8-33,2
25 a 34	33,4	26,9-39,8	27,9	18,9-36,9	38,4	29,2-47,6
35 a 44	36,1	30,2-42,0	29,9	21,3-38,6	41,3	33,3-49,3
45 a 54	40,5	35,2-45,9	31,9	23,9-39,8	47,3	40,3-54,3
55 a 64	53,9	46,8-61,0	45,0	33,8-56,1	60,6	52,0-69,2
65 e mais	60,0	54,0-66,0	43,7	33,3-54,1	68,9	62,1-75,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	38,4	32,9-43,8	26,5	18,2-34,7	47,7	40,3-55,1
9 a 11	34,4	30,4-38,5	31,4	25,4-37,4	36,9	31,4-42,4
12 e mais	45,9	41,8-50,0	45,0	38,9-51,1	46,7	41,2-52,2
Total	39,3	36,3-42,2	33,0	28,5-37,4	44,4	40,4-48,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	15,4	7,3-23,6	19,4	6,4-32,4	11,6	2,0-21,1
25 a 34	20,4	14,6-26,2	20,4	12,0-28,9	20,3	12,4-28,3
35 a 44	21,4	16,4-26,4	17,6	10,3-24,8	24,6	17,7-31,4
45 a 54	23,5	19,0-28,0	18,3	12,2-24,4	27,6	21,4-33,8
55 a 64	32,1	25,6-38,6	23,4	14,7-32,1	38,6	29,8-47,4
65 e mais	34,5	28,8-40,3	27,5	18,3-36,6	38,4	31,2-45,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,1	18,3-27,8	16,1	8,7-23,6	28,5	22,2-34,8
9 a 11	18,1	15,0-21,1	16,2	11,5-20,9	19,6	15,6-23,6
12 e mais	28,5	24,8-32,1	30,7	25,0-36,4	26,5	21,9-31,1
Total	23,1	20,6-25,7	20,2	16,3-24,1	25,5	22,2-28,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	38,1	26,9-49,3	41,1	25,8-56,3	35,2	18,4-52,0
25 a 34	40,4	33,6-47,1	51,5	41,8-61,2	30,1	21,2-39,0
35 a 44	35,3	29,1-41,5	43,9	34,1-53,7	27,9	20,5-35,4
45 a 54	30,3	24,9-35,6	43,7	34,8-52,6	19,6	14,0-25,3
55 a 64	32,5	25,3-39,6	43,4	31,8-55,0	24,3	15,8-32,8
65 e mais	25,8	20,3-31,3	38,8	28,4-49,2	18,7	12,6-24,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,3	34,4-46,2	51,9	42,5-61,3	31,1	23,4-38,8
9 a 11	37,3	32,9-41,7	49,3	42,7-55,9	27,5	22,0-33,1
12 e mais	22,0	18,5-25,5	27,7	22,2-33,3	16,9	12,6-21,1
Total	34,6	31,5-37,8	44,5	39,7-49,3	26,5	22,3-30,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	70,8	60,3-81,3	79,3	67,0-91,5	62,5	46,5-78,6
25 a 34	47,6	40,9-54,3	49,3	39,6-59,1	45,9	36,6-55,3
35 a 44	52,7	46,4-58,9	58,2	48,8-67,7	48,0	39,8-56,2
45 a 54	45,1	39,6-50,6	47,3	38,5-56,2	43,4	36,3-50,4
55 a 64	48,4	41,3-55,5	54,3	43,1-65,5	44,0	34,9-53,0
65 e mais	45,7	39,6-51,8	54,2	43,7-64,6	41,0	33,7-48,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	55,8	50,0-61,6	61,0	52,2-69,9	51,7	44,1-59,2
9 a 11	58,9	54,5-63,2	66,0	60,0-72,0	53,0	47,0-59,0
12 e mais	39,6	35,5-43,7	44,6	38,5-50,8	35,1	29,6-40,5
Total	52,3	49,2-55,5	57,8	53,2-62,5	47,8	43,7-52,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	46,4	35,0-57,7	59,8	44,8-74,9	33,3	19,0-47,6
25 a 34	40,2	33,4-46,9	49,8	40,0-59,5	31,2	22,5-40,0
35 a 44	28,7	22,6-34,7	36,8	27,1-46,5	21,8	14,5-29,1
45 a 54	23,7	18,8-28,6	32,1	23,7-40,5	17,1	11,7-22,5
55 a 64	17,7	12,0-23,4	18,3	9,7-27,0	17,2	9,6-24,8
65 e mais	7,7	4,9-10,5	9,7	4,2-15,2	6,6	3,5-9,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	32,3	26,4-38,1	46,0	36,5-55,6	21,4	15,0-27,8
9 a 11	36,0	31,6-40,5	43,1	36,4-49,7	30,3	24,4-36,3
12 e mais	19,2	15,9-22,6	24,2	18,7-29,6	14,8	10,7-18,9
Total	29,9	26,7-33,0	39,2	34,1-44,2	22,2	18,6-25,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,9	14,3-37,4	36,4	20,2-52,6	15,6	0,9-32,2
25 a 34	14,7	9,9-19,5	21,0	12,6-29,4	8,9	4,5-13,2
35 a 44	13,1	8,8-17,4	13,9	8,0-19,8	12,4	6,3-18,5
45 a 54	11,5	7,9-15,2	13,9	7,3-20,6	9,7	5,8-13,6
55 a 64	10,3	6,5-14,1	13,2	6,3-20,0	8,2	3,9-12,4
65 e mais	14,1	10,1-18,1	19,2	10,7-27,6	11,4	7,3-15,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,2	8,7-19,7	19,7	10,8-28,7	9,8	3,1-16,6
9 a 11	15,5	12,2-18,7	20,1	14,6-25,6	11,7	7,8-15,5
12 e mais	17,1	14,0-20,2	21,7	16,7-26,6	13,0	9,3-16,7
Total	15,3	12,5-18,1	20,4	15,9-24,9	11,2	7,7-14,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	46,2	34,9-57,5	58,1	42,5-73,7	34,7	20,3-49,1
25 a 34	54,7	48,1-61,3	68,4	60,0-76,8	42,0	32,6-51,3
35 a 44	45,4	39,2-51,7	44,8	35,2-54,3	46,0	37,8-54,2
45 a 54	43,8	38,3-49,3	54,0	45,2-62,7	35,7	29,1-42,3
55 a 64	35,3	28,3-42,2	39,4	28,3-50,6	32,2	23,3-41,0
65 e mais	11,6	7,6-15,5	23,6	14,8-32,5	4,9	1,5-8,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,0	38,1-49,9	57,5	48,4-66,7	33,3	26,3-40,4
9 a 11	45,0	40,5-49,4	54,9	48,4-61,5	36,8	30,9-42,8
12 e mais	36,3	32,4-40,3	39,4	33,4-45,4	33,6	28,3-38,8
Total	42,2	39,1-45,4	51,8	46,9-56,6	34,4	30,4-38,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,0	3,6-18,3	20,3	6,6-34,1	1,9	0,4-4,1
25 a 34	16,2	11,0-21,4	18,1	10,4-25,8	14,4	7,3-21,5
35 a 44	11,9	7,8-16,1	10,4	4,6-16,1	13,2	7,3-19,1
45 a 54	9,0	5,9-12,0	8,5	4,1-12,9	9,3	5,1-13,5
55 a 64	7,4	3,7-11,2	11,6	4,5-18,7	4,4	0,7-8,1
65 e mais	1,8	0,0-3,6	4,7	0,4-9,7	0,2	0,1-0,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,4	6,5-14,4	14,0	6,7-21,3	7,6	3,8-11,5
9 a 11	12,4	9,4-15,4	16,9	11,7-22,1	8,8	5,5-12,0
12 e mais	8,6	6,1-11,1	8,9	5,2-12,7	8,3	5,0-11,7
Total	10,5	8,4-12,6	13,4	9,7-17,1	8,1	5,9-10,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	28,6	16,6-40,6	13,5	1,6-25,3	43,3	26,1-60,6
25 a 34	37,4	30,8-43,9	20,9	13,6-28,2	52,7	43,4-61,9
35 a 44	39,7	33,6-45,9	17,7	10,0-25,4	58,4	50,4-66,4
45 a 54	44,2	38,8-49,7	13,2	8,1-18,3	68,7	62,5-74,9
55 a 64	45,9	38,9-52,9	20,8	12,0-29,6	64,6	56,3-72,9
65 e mais	30,9	25,4-36,3	14,2	7,5-20,8	40,0	32,9-47,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,5	40,6-52,4	18,1	11,1-25,2	68,8	62,4-75,3
9 a 11	38,0	33,8-42,2	18,6	13,7-23,4	53,9	47,8-60,0
12 e mais	21,7	18,4-25,0	13,0	8,8-17,2	29,5	24,7-34,4
Total	37,6	34,5-40,7	16,8	13,2-20,4	54,7	50,6-58,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	31,2	19,0-43,4	37,7	20,7-54,7	24,9	7,6-42,1
25 a 34	21,0	15,2-26,7	28,6	19,3-38,0	13,8	7,3-20,4
35 a 44	13,8	9,5-18,1	20,8	13,0-28,7	7,9	3,8-11,9
45 a 54	9,1	6,3-12,0	11,9	6,9-17,0	6,9	3,7-10,1
55 a 64	5,6	3,0-8,2	9,5	3,9-15,1	2,7	0,9-4,5
65 e mais	1,9	0,4-3,5	3,0	0,3-5,7	1,4	0,5-3,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,4	9,3-21,4	23,6	13,8-33,4	8,9	1,6-16,1
9 a 11	16,4	12,9-19,9	20,5	15,1-25,9	13,0	8,4-17,5
12 e mais	14,6	11,6-17,5	19,8	14,9-24,8	9,9	6,7-13,1
Total	15,4	12,4-18,5	21,7	16,8-26,6	10,3	6,6-14,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,2	0,1-2,5	2,1	0,5-4,7	0,4	0,3-1,1
35 a 44	1,1	0,0-2,3	2,5	0,1-5,0	0,0	0,0-0,0
45 a 54	0,9	0,2-2,0	1,8	0,7-4,2	0,1	0,1-0,4
55 a 64	0,4	0,4-1,3	1,0	1,0-3,0	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,4	0,2-1,0	0,9	0,4-2,3	0,0	0,0-0,0
9 a 11	0,4	0,1-0,8	0,8	0,3-1,9	0,0	0,0-0,0
12 e mais	1,5	0,4-2,7	2,8	0,5-5,1	0,4	0,2-1,0
Total	0,7	0,3-1,1	1,4	0,5-2,3	0,1	0,1-0,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,0	0,2-2,1	1,0	0,2-2,1	1,9	0,4-4,2
25 a 34	2,7	0,7-4,7	2,7	0,7-4,7	3,6	0,2-6,9
35 a 44	2,0	0,1-4,0	2,0	0,1-4,0	3,6	0,1-7,4
45 a 54	4,2	1,4-6,9	4,2	1,4-6,9	4,3	1,0-7,6
55 a 64	4,4	1,7-7,2	4,4	1,7-7,2	5,8	1,7-10,0
65 e mais	8,3	4,8-11,8	8,3	4,8-11,8	10,4	5,4-15,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,7	2,8-6,6	1,9	0,1-3,8	6,9	3,9-9,9
9 a 11	2,3	1,3-3,2	2,0	0,6-3,4	2,5	1,1-3,9
12 e mais	2,0	0,8-3,2	1,1	0,4-2,7	2,7	0,9-4,6
Total	3,3	2,4-4,3	1,7	0,7-2,7	4,6	3,1-6,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	91,6	86,4-96,7	79,7	73,2-86,3
55 a 59	88,7	82,1-95,3	73,5	65,0-82,1
Anos de escolaridade				
0 a 8	87,9	81,7-94,2	74,9	67,1-82,6
9 a 11	97,2	93,8-100,0	82,8	75,3-90,3
12 e mais	92,8	87,4-98,1	81,3	73,9-88,8
Total	90,6	86,5-94,7	77,6	72,4-82,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	91,6	86,6-96,6	90,6	85,5-95,7
35 a 44	95,5	92,2-98,8	91,0	85,8-96,2
45 a 54	95,4	92,4-98,3	91,0	86,9-95,0
55 a 59	100,0	0,0-100,0	88,5	81,2-95,9
Anos de escolaridade				
0 a 8	94,8	91,3-98,3	89,3	84,3-94,2
9 a 11	95,5	92,6-98,3	90,3	86,2-94,5
12 e mais	94,0	90,2-97,8	92,7	88,9-96,6
Total	94,7	92,7-96,8	90,6	88,0-93,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	34,3	23,3-45,2	20,7	7,6-33,8	47,5	31,3-63,6
25 a 34	44,1	37,6-50,7	37,6	28,7-46,6	50,1	40,8-59,5
35 a 44	40,5	34,5-46,4	30,5	22,1-38,9	48,9	40,7-57,1
45 a 54	42,6	37,2-48,0	23,0	16,5-29,4	58,1	51,1-65,1
55 a 64	34,3	28,1-40,5	23,5	14,7-32,4	42,3	33,9-50,8
65 e mais	26,4	21,3-31,5	14,2	7,0-21,5	33,1	26,4-39,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,2	19,8-30,6	15,3	8,2-22,4	33,0	25,5-40,5
9 a 11	40,3	36,0-44,7	27,6	21,7-33,5	50,7	44,7-56,8
12 e mais	58,4	54,3-62,5	44,4	38,3-50,5	70,9	65,9-76,0
Total	38,2	35,2-41,2	26,7	22,7-30,8	26,7	22,7-30,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,6	2,4-18,8	9,1	0,4-18,6	12,1	1,1-25,3
25 a 34	12,8	8,0-17,6	15,2	7,9-22,6	10,6	4,4-16,7
35 a 44	19,4	14,1-24,6	17,3	10,0-24,6	21,1	13,8-28,4
45 a 54	33,4	28,1-38,7	31,0	22,7-39,4	35,3	28,4-42,1
55 a 64	45,6	38,6-52,6	34,0	23,4-44,5	54,2	45,5-63,0
65 e mais	59,2	53,3-65,1	51,5	40,9-62,1	63,4	56,4-70,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,6	29,3-39,8	25,4	18,1-32,7	41,8	34,6-49,0
9 a 11	20,6	17,4-23,8	20,0	15,1-25,0	21,1	16,8-25,3
12 e mais	17,5	14,6-20,4	19,5	14,8-24,2	15,7	12,2-19,2
Total	26,2	23,5-28,8	22,3	18,5-26,0	29,4	25,7-33,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,4	0,3-1,1	0,7	0,7-2,2	0,0	0,0-0,0
25 a 34	2,4	0,1-4,9	4,4	0,7-9,4	0,5	0,2-1,3
35 a 44	3,8	1,6-6,0	3,2	0,1-6,5	4,4	1,4-7,4
45 a 54	5,6	2,7-8,5	5,1	0,7-9,5	6,0	2,2-9,8
55 a 64	16,2	10,9-21,5	16,2	8,2-24,3	16,2	9,1-23,2
65 e mais	20,3	15,2-25,4	27,7	17,9-37,5	16,3	10,7-21,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	9,1	6,6-11,6	8,3	4,3-12,3	9,7	6,6-12,8
9 a 11	4,5	2,9-6,0	6,3	3,3-9,2	3,0	1,6-4,4
12 e mais	3,8	2,3-5,3	5,0	2,4-7,5	2,8	1,2-4,3
Total	6,4	5,2-7,7	6,8	4,8-8,9	6,1	4,6-7,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,8	0,0-1,5	0,0	0,0-0,0	1,4	0,1-3,0
35 a 44	3,7	0,6-6,9	1,3	1,2-3,8	5,8	0,6-11,1
45 a 54	4,4	1,6-7,1	6,0	0,9-11,1	3,1	0,4-5,9
55 a 64	6,7	3,2-10,2	7,0	2,0-12,0	6,4	1,7-11,2
65 e mais	16,5	11,5-21,4	13,7	5,7-21,7	18,0	11,7-24,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,8	4,5-9,1	4,3	1,5-7,1	8,8	5,4-12,3
9 a 11	1,9	1,0-2,7	2,4	0,9-4,0	1,4	0,5-2,3
12 e mais	2,6	1,4-3,7	2,3	0,6-4,0	2,8	1,2-4,5
Total	4,3	3,2-5,5	3,2	1,8-4,6	5,2	3,6-6,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,5	1,4-12,4	1,8	0,1-3,8	9,2	3,9-22,2
25 a 34	10,3	6,3-14,3	9,1	3,1-15,2	11,4	6,1-16,7
35 a 44	14,9	10,6-19,3	15,0	8,5-21,5	14,9	9,2-20,7
45 a 54	26,9	21,9-31,9	23,6	15,9-31,2	29,5	22,9-36,1
55 a 64	28,9	22,8-35,1	17,8	10,5-25,2	37,2	28,5-45,9
65 e mais	34,6	28,8-40,3	22,5	13,7-31,2	41,2	34,0-48,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,3	17,0-25,6	12,1	7,1-17,0	28,5	22,1-34,9
9 a 11	14,3	11,5-17,0	12,6	8,6-16,6	15,6	11,8-19,5
12 e mais	16,4	13,6-19,2	16,5	12,1-20,8	16,4	12,7-20,1
Total	18,0	15,8-20,3	13,4	10,7-16,2	21,8	18,5-25,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,6	0,6-1,7	0,0	0,0-0,0	1,1	1,1-3,4
25 a 34	1,0	0,0-2,0	0,4	0,4-1,2	1,5	0,3-3,3
35 a 44	1,6	0,0-3,2	0,0	0,0-0,0	3,0	0,0-5,9
45 a 54	3,8	1,2-6,3	2,4	1,9-6,8	4,8	1,8-7,9
55 a 64	10,5	6,0-15,0	1,0	1,0-3,0	17,5	10,3-24,8
65 e mais	18,9	14,3-23,6	4,8	0,4-9,1	26,7	20,2-33,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,0	5,0-9,0	1,4	0,4-3,2	11,4	8,0-14,7
9 a 11	3,3	2,0-4,6	0,8	0,1-1,7	5,3	3,0-7,5
12 e mais	1,9	1,0-2,8	0,6	0,3-1,5	3,1	1,6-4,5
Total	4,6	3,6-5,6	1,0	0,2-1,9	7,6	5,9-9,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,3	2,6-14,0	2,4	0,1-4,8	14,0	3,3-24,6
25 a 34	8,7	5,3-12,0	5,0	1,8-8,3	12,0	6,3-17,7
35 a 44	6,3	2,7-9,9	4,8	0,8-10,4	7,6	2,9-12,3
45 a 54	6,1	3,2-8,9	4,9	0,6-9,2	7,0	3,2-10,8
55 a 64	6,6	2,8-10,4	4,0	0,2-7,9	8,5	2,6-14,4
65 e mais	6,3	3,6-9,0	3,5	0,0-7,1	7,9	4,2-11,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,6	4,5-10,6	3,3	0,3-6,3	10,9	6,1-15,7
9 a 11	7,7	5,3-10,1	4,4	1,8-6,9	10,4	6,6-14,1
12 e mais	5,9	3,9-8,0	5,5	2,4-8,6	6,3	3,6-9,0
Total	7,2	5,5-8,8	4,2	2,5-6,0	9,6	7,0-12,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	57,2	45,9-68,5	51,8	35,8-67,9	62,4	46,9-77,9
25 a 34	51,6	44,8-58,4	49,2	39,5-58,9	53,8	44,3-63,3
35 a 44	52,8	46,5-59,2	51,1	41,4-60,8	54,3	46,0-62,6
45 a 54	55,1	49,5-60,6	54,7	45,8-63,7	55,3	48,3-62,3
55 a 64	50,9	43,8-57,9	49,1	37,7-60,5	52,2	43,2-61,2
65 e mais	60,0	53,9-66,1	49,2	38,6-59,9	65,9	58,7-73,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	38,9	33,0-44,8	35,3	26,2-44,3	41,8	34,1-49,4
9 a 11	56,0	51,6-60,5	53,0	46,4-59,7	58,5	52,5-64,5
12 e mais	79,4	75,9-82,8	74,6	69,1-80,1	83,6	79,2-87,9
Total	54,3	51,2-57,5	51,0	46,2-55,9	57,1	52,9-61,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	85,0	77,9-92,1
26 a 30	88,9	82,2-95,5
31 a 35	86,4	78,0-94,9
36 a 40	78,2	66,7-89,6
41 a 45	68,6	58,3-79,0
46 a 50	61,7	52,0-71,4
Anos de escolaridade		
0 a 8	84,6	77,3-91,8
9 a 11	75,8	69,6-82,0
12 e mais	77,0	71,4-82,6
Total	72,7	67,4-78,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,9	8,3-25,5	6,7	2,1-11,3	26,9	11,8-42,0
25 a 34	19,8	14,5-25,0	12,0	6,2-17,8	27,0	18,7-35,2
35 a 44	21,9	16,7-27,2	15,5	8,5-22,5	27,3	19,9-34,8
45 a 54	22,0	17,5-26,5	14,6	8,6-20,6	27,9	21,6-34,2
55 a 64	16,1	10,9-21,3	10,2	4,0-16,5	20,5	12,9-28,1
65 e mais	18,6	13,7-23,5	10,8	3,9-17,8	22,9	16,4-29,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,4	14,8-23,9	9,3	4,9-13,7	27,3	20,3-34,2
9 a 11	18,4	14,9-22,0	9,6	5,9-13,3	25,6	20,1-31,1
12 e mais	21,2	17,8-24,5	18,2	13,3-23,1	23,8	19,1-28,5
Total	19,6	17,1-22,1	11,8	9,2-14,5	25,9	22,1-29,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	83,8	69,9-97,8	0,0	0,0-0,0	79,9	61,6-98,3
25 a 34	83,2	70,6-95,8	88,6	70,4-100,0	80,9	64,9-97,0
35 a 44	88,3	79,9-96,7	86,1	72,6-99,7	89,3	78,7-100,0
45 a 54	93,7	88,2-99,2	88,5	73,5-100,0	95,8	91,3-100,0
55 a 64	98,1	95,4-100,0	0,0	0,0-0,0	97,4	93,6-100,0
65 e mais	93,5	86,5-100,0	90,1	71,4-100,0	94,4	87,0-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	89,2	82,0-96,5	86,9	72,4-100,0	89,8	81,5-98,2
9 a 11	82,6	73,7-91,5	95,7	87,6-100,0	78,7	67,7-89,7
12 e mais	94,3	90,1-98,4	90,3	81,3-99,3	97,0	94,0-100,0
Total	89,0	84,7-93,2	90,3	83,6-97,0	88,5	83,2-93,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,8	8,3-21,4	22,9	12,0-33,7	6,9	0,5-13,4
25 a 34	23,6	16,3-30,9	31,2	19,4-43,1	16,7	8,3-25,1
35 a 44	16,8	11,7-21,9	18,0	10,6-25,4	15,6	8,7-22,5
45 a 54	18,2	13,1-23,3	16,2	9,5-23,0	20,2	12,7-27,8
55 a 64	14,8	8,7-20,8	14,7	5,1-24,4	14,8	7,5-22,0
65 e mais	8,1	2,2-13,9	7,8	2,5-18,1	8,3	2,4-14,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,3	17,4-27,1	27,3	19,9-34,7	17,0	11,1-22,9
9 a 11	12,1	9,4-14,8	14,0	9,7-18,4	10,4	7,1-13,8
12 e mais	8,8	6,0-11,6	11,3	6,6-15,9	6,2	3,4-8,9
Total	17,9	14,8-21,0	22,0	17,1-26,9	13,9	10,3-17,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,9	6,9-18,9	18,2	8,5-27,9	7,8	1,1-14,5
25 a 34	12,1	7,3-16,8	14,1	6,3-21,8	10,3	4,7-16,0
35 a 44	20,9	16,2-25,7	21,4	14,4-28,3	20,5	14,0-27,0
45 a 54	41,1	34,5-47,6	50,8	41,4-60,2	30,8	22,2-39,3
55 a 64	45,3	36,2-54,3	50,2	35,6-64,7	40,2	29,7-50,7
65 e mais	50,4	40,1-60,7	57,9	41,0-74,9	43,3	31,8-54,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,7	21,4-30,0	30,0	23,4-36,5	21,3	15,9-26,7
9 a 11	15,4	12,7-18,2	18,4	13,9-22,8	13,0	9,6-16,4
12 e mais	16,3	12,8-19,9	20,9	14,9-26,8	11,5	8,1-14,9
Total	21,7	19,0-24,4	25,8	21,5-30,1	17,7	14,4-21,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,1	0,3-10,0	6,7	0,8-14,1	3,6	2,4-9,7
25 a 34	4,0	0,0-8,0	5,3	2,2-12,7	2,9	0,4-6,2
35 a 44	6,4	3,0-9,8	6,5	1,8-11,2	6,3	1,4-11,2
45 a 54	7,1	3,5-10,7	6,9	2,1-11,7	7,4	2,0-12,7
55 a 64	4,8	1,4-8,2	5,9	0,1-11,7	3,6	0,1-7,1
65 e mais	0,8	0,2-1,8	0,7	0,4-1,8	0,9	0,9-2,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,3	4,2-10,4	8,3	3,4-13,2	6,2	2,5-9,9
9 a 11	1,7	0,7-2,7	1,5	0,4-2,6	1,8	0,2-3,5
12 e mais	2,6	0,9-4,3	3,9	0,8-6,9	1,3	0,1-2,7
Total	5,1	3,2-7,0	5,9	2,8-9,0	4,3	2,1-6,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	53,7	44,5-62,9	44,6	32,6-56,7	62,5	49,5-75,5
25 a 34	45,3	37,9-52,8	46,1	34,6-57,6	44,6	35,1-54,2
35 a 44	36,7	30,9-42,5	42,1	33,4-50,8	31,2	23,8-38,6
45 a 54	37,1	30,7-43,4	35,6	26,5-44,6	38,6	29,7-47,6
55 a 64	29,9	21,4-38,3	35,3	21,3-49,3	24,2	15,2-33,3
65 e mais	29,8	20,4-39,1	35,3	19,3-51,2	24,6	14,2-35,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,4	38,8-50,0	44,2	36,5-51,8	44,6	36,4-52,8
9 a 11	43,3	39,1-47,4	42,1	35,9-48,2	44,3	38,7-49,9
12 e mais	29,9	25,6-34,2	30,0	23,3-36,6	29,9	24,5-35,3
Total	42,8	39,1-46,4	42,3	37,2-47,4	43,3	38,1-48,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	24,9	16,7-33,0	28,3	17,1-39,4	21,3	9,3-33,3
25 a 34	38,7	31,4-46,0	43,5	32,2-54,8	34,0	24,4-43,6
35 a 44	53,3	47,0-59,5	53,0	44,2-61,8	53,5	44,9-62,1
45 a 54	66,0	59,9-72,1	67,2	58,8-75,7	64,5	55,8-73,2
55 a 64	64,7	55,2-74,3	64,2	49,9-78,5	65,5	54,3-76,6
65 e mais	49,6	36,9-62,3	50,9	32,4-69,3	47,6	32,8-62,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,5	40,6-52,5	45,3	37,5-53,1	48,1	39,0-57,2
9 a 11	38,6	34,6-42,6	45,5	39,3-51,7	32,5	27,5-37,5
12 e mais	48,7	44,1-53,4	62,1	55,1-69,2	34,5	29,1-39,9
Total	44,1	40,5-47,7	47,0	41,8-52,1	40,9	35,8-46,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,6	1,4-11,8	7,5	0,2-14,8	5,8	1,6-13,1
25 a 34	8,6	4,8-12,5	6,4	2,6-10,2	10,8	4,4-17,2
35 a 44	17,7	13,1-22,4	17,8	11,3-24,3	17,7	11,0-24,3
45 a 54	21,6	16,2-27,0	22,0	14,2-29,8	21,2	13,9-28,6
55 a 64	20,1	12,3-27,9	14,8	4,2-25,3	27,4	16,3-38,4
65 e mais	20,5	10,8-30,2	20,8	6,7-34,8	20,1	8,4-31,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,6	10,9-18,3	12,8	8,3-17,4	16,8	10,7-22,9
9 a 11	10,4	8,2-12,7	11,0	7,4-14,6	9,9	7,1-12,8
12 e mais	12,7	9,6-15,9	16,0	10,7-21,2	9,3	6,0-12,6
Total	13,0	10,8-15,3	12,6	9,6-15,6	13,5	10,1-16,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,8	15,2-30,3	19,1	9,2-29,0	26,4	15,0-37,7
25 a 34	24,1	17,9-30,4	14,4	7,8-21,0	32,9	23,4-42,4
35 a 44	27,1	22,0-32,1	16,2	11,2-21,2	38,0	29,9-46,1
45 a 54	30,7	25,1-36,4	25,6	17,9-33,4	36,1	27,9-44,3
55 a 64	31,3	22,8-39,7	28,0	14,4-41,6	34,6	24,8-44,5
65 e mais	28,1	18,9-37,2	23,7	8,2-39,1	32,2	21,9-42,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,4	18,8-28,1	15,5	10,1-20,8	31,8	24,3-39,2
9 a 11	27,5	23,9-31,1	22,0	17,0-27,0	32,1	27,0-37,1
12 e mais	36,8	32,5-41,2	30,4	24,1-36,7	43,7	37,9-49,5
Total	25,9	22,8-28,9	18,7	15,0-22,4	32,9	28,2-37,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,3	4,8-11,7	5,8	2,2-9,4	10,6	4,7-16,6
25 a 34	17,2	11,3-23,0	10,3	4,4-16,1	23,4	14,1-32,7
35 a 44	18,1	13,6-22,7	9,5	5,6-13,4	26,9	19,3-34,5
45 a 54	12,1	8,5-15,6	12,1	6,7-17,4	12,1	7,4-16,8
55 a 64	20,2	12,4-28,0	21,4	8,2-34,7	18,9	11,0-26,8
65 e mais	13,3	5,5-21,0	14,7	0,5-29,0	11,9	5,6-18,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,6	9,1-16,2	7,4	4,1-10,7	18,1	11,9-24,3
9 a 11	16,2	13,2-19,1	13,8	9,4-18,1	18,1	14,0-22,2
12 e mais	21,5	17,8-25,2	16,8	11,6-21,9	26,5	21,4-31,6
Total	14,5	12,2-16,9	10,1	7,6-12,6	18,8	14,9-22,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	46,4	37,2-55,7	46,9	34,8-59,0	46,0	32,0-60,0
25 a 34	49,1	41,6-56,6	58,6	47,6-69,7	40,5	30,8-50,1
35 a 44	39,5	33,5-45,5	54,0	45,5-62,5	24,7	17,9-31,6
45 a 54	29,8	23,9-35,7	39,7	30,6-48,8	19,4	12,3-26,4
55 a 64	26,4	18,3-34,6	33,7	20,2-47,1	18,9	10,2-27,7
65 e mais	24,3	14,7-34,0	39,7	22,5-56,9	9,8	3,3-16,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,7	39,0-50,3	53,0	45,3-60,7	36,0	27,8-44,2
9 a 11	37,0	32,9-41,0	45,2	39,0-51,4	30,1	24,9-35,4
12 e mais	33,9	29,5-38,4	42,2	35,1-49,3	25,2	20,2-30,2
Total	41,3	37,7-45,0	49,8	44,6-54,9	33,1	28,0-38,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	70,8	62,2-79,4	73,2	61,7-84,8	68,4	55,7-81,1
25 a 34	66,8	59,4-74,1	62,9	51,0-74,8	70,2	61,7-78,8
35 a 44	66,1	60,5-71,7	68,6	61,0-76,2	63,6	55,5-71,7
45 a 54	59,0	52,5-65,4	55,1	45,7-64,5	63,0	54,5-71,6
55 a 64	62,4	53,9-70,9	68,8	55,7-81,8	55,8	45,3-66,3
65 e mais	61,2	51,4-70,9	63,9	47,9-79,9	58,5	47,3-69,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	65,3	59,9-70,6	63,6	56,0-71,2	67,0	59,6-74,5
9 a 11	69,1	65,3-72,9	73,3	67,9-78,8	65,6	60,4-70,8
12 e mais	61,4	56,8-65,9	61,7	54,7-68,7	61,0	55,3-66,6
Total	66,1	62,7-69,6	66,2	61,2-71,3	66,0	61,3-70,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	47,1	37,9-56,4	53,3	41,1-65,4	41,2	27,5-54,8
25 a 34	38,4	31,2-45,7	40,6	29,2-51,9	36,5	27,3-45,6
35 a 44	32,1	26,4-37,9	32,8	24,5-41,1	31,4	23,5-39,4
45 a 54	21,6	16,5-26,7	23,5	16,2-30,8	19,6	12,4-26,7
55 a 64	12,1	6,8-17,3	11,7	4,1-19,3	12,4	5,3-19,5
65 e mais	13,5	6,7-20,2	17,0	4,9-29,0	10,2	3,7-16,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	35,1	29,6-40,6	38,3	30,6-45,9	31,8	24,0-39,6
9 a 11	35,6	31,5-39,6	37,3	31,2-43,4	34,2	28,7-39,6
12 e mais	24,5	20,5-28,6	26,0	19,7-32,3	23,0	18,0-28,0
Total	34,3	30,8-37,9	36,9	31,7-42,0	31,9	27,0-36,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,3	16,2-30,3	36,6	25,2-47,9	10,3	3,3-17,3
25 a 34	13,4	9,3-17,5	16,0	9,5-22,5	11,0	5,8-16,2
35 a 44	13,4	9,6-17,2	12,1	7,4-16,8	14,7	8,7-20,7
45 a 54	11,1	7,6-14,7	14,0	8,2-19,8	8,1	4,2-12,0
55 a 64	14,9	8,1-21,6	20,1	8,3-31,9	9,4	3,8-15,0
65 e mais	14,8	7,2-22,4	22,8	8,8-36,8	7,2	1,2-13,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,7	8,2-15,2	14,9	9,5-20,4	8,3	4,1-12,5
9 a 11	21,5	18,1-25,0	29,2	23,4-34,9	15,1	11,2-19,0
12 e mais	23,0	19,0-26,9	32,0	25,4-38,7	13,3	9,5-17,2
Total	15,7	13,3-18,1	20,6	16,7-24,5	11,0	8,2-13,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	31,1	22,7-39,4	37,5	26,0-48,9	24,8	12,8-36,8
25 a 34	53,2	45,9-60,6	70,3	61,0-79,6	37,8	28,5-47,2
35 a 44	52,0	46,1-57,9	59,4	51,1-67,7	44,5	36,3-52,7
45 a 54	51,3	44,8-57,8	61,1	52,2-69,9	40,9	32,2-49,7
55 a 64	38,2	29,1-47,3	55,2	40,7-69,6	20,6	12,3-28,8
65 e mais	13,2	4,7-21,6	22,7	6,8-38,5	4,2	0,0-8,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,3	40,7-51,8	59,0	51,5-66,6	33,0	25,4-40,5
9 a 11	41,4	37,3-45,5	50,4	44,2-56,7	33,9	28,5-39,3
12 e mais	41,6	37,0-46,2	43,7	36,6-50,8	39,4	33,7-45,1
Total	44,3	40,7-48,0	55,2	50,1-60,3	33,8	29,1-38,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,1	11,2-27,0	21,9	11,1-32,6	16,4	4,9-27,8
25 a 34	19,5	13,2-25,8	23,8	13,9-33,8	15,6	7,6-23,5
35 a 44	19,7	14,4-25,1	21,2	13,0-29,4	18,2	11,4-25,1
45 a 54	20,5	14,8-26,1	27,7	18,5-36,8	12,9	7,3-18,4
55 a 64	16,4	8,7-24,1	27,2	13,6-40,8	5,2	0,4-10,0
65 e mais	4,5	0,6-8,4	7,4	0,3-14,5	1,8	1,7-5,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,5	17,7-27,3	28,9	21,9-35,9	15,8	9,1-22,5
9 a 11	14,7	11,7-17,8	14,3	10,0-18,7	15,1	10,9-19,2
12 e mais	6,3	4,0-8,6	6,1	2,6-9,7	6,4	3,7-9,2
Total	18,7	15,6-21,8	22,7	18,1-27,2	14,8	10,6-18,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	27,7	19,4-36,0	14,0	5,5-22,6	41,1	27,5-54,6
25 a 34	40,6	33,3-47,9	15,9	7,1-24,7	62,9	53,7-72,1
35 a 44	38,8	33,2-44,5	15,1	9,5-20,8	62,9	54,6-71,1
45 a 54	35,5	29,4-41,7	14,9	8,2-21,7	57,3	48,4-66,2
55 a 64	39,7	31,2-48,2	12,8	4,0-21,5	67,6	57,8-77,5
65 e mais	23,8	16,2-31,4	8,6	0,3-16,8	38,2	27,2-49,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	36,8	31,6-42,1	14,7	9,1-20,3	59,9	51,7-68,2
9 a 11	36,1	32,2-40,0	15,4	11,0-19,8	53,3	47,7-59,0
12 e mais	24,1	20,4-27,7	11,5	7,1-15,8	37,4	31,9-43,0
Total	35,5	32,1-38,9	14,6	10,9-18,3	55,8	50,7-60,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,7	14,1-29,4	30,1	19,0-41,2	13,6	3,3-23,8
25 a 34	18,5	13,0-24,0	24,7	15,9-33,6	12,9	5,9-19,8
35 a 44	23,3	18,0-28,6	38,0	29,4-46,7	8,3	4,1-12,5
45 a 54	14,2	10,2-18,1	22,4	15,4-29,3	5,5	2,0-9,0
55 a 64	6,8	2,4-11,1	7,6	0,2-15,0	6,0	1,5-10,4
65 e mais	3,8	0,4-8,0	5,9	2,2-13,9	1,8	1,0-4,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,9	12,5-21,3	24,4	17,8-31,0	9,0	3,4-14,7
9 a 11	20,6	17,1-24,0	31,4	25,6-37,1	11,5	7,7-15,4
12 e mais	21,8	17,9-25,6	30,0	23,6-36,4	13,1	9,3-16,8
Total	18,5	15,6-21,3	26,9	22,5-31,4	10,2	6,7-13,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,3	0,2-10,8	4,0	0,4-8,4	6,6	3,3-16,5
25 a 34	2,2	0,9-3,5	4,5	1,7-7,2	0,1	0,1-0,4
35 a 44	2,5	1,1-3,9	4,7	2,0-7,4	0,2	0,2-0,6
45 a 54	1,5	0,5-2,5	2,1	0,4-3,8	0,8	0,0-1,7
55 a 64	0,9	0,5-2,3	1,8	0,9-4,6	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,3	0,3-0,8	0,5	0,5-1,6	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,4	0,0-4,8	2,1	0,2-4,1	2,7	1,7-7,1
9 a 11	2,7	1,4-3,9	5,6	2,9-8,3	0,2	0,1-0,4
12 e mais	5,9	3,7-8,1	9,1	5,3-13,0	2,5	0,6-4,3
Total	2,8	1,3-4,3	3,8	2,3-5,3	1,8	0,7-4,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,1	0,9-13,4	3,1	2,1-8,3	11,1	0,0-22,1
25 a 34	7,5	3,2-11,7	0,7	0,4-1,8	13,5	5,8-21,2
35 a 44	4,0	1,8-6,3	2,8	0,2-5,8	5,3	1,9-8,6
45 a 54	5,1	2,3-7,9	3,9	0,3-7,4	6,5	2,1-10,8
55 a 64	6,6	2,9-10,3	3,9	0,8-8,6	9,3	3,7-15,0
65 e mais	10,3	5,1-15,6	7,1	0,0-14,2	13,3	5,8-20,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	9,1	5,7-12,6	3,6	1,0-6,1	14,9	8,6-21,3
9 a 11	2,3	1,2-3,4	1,4	0,1-2,8	3,0	1,3-4,7
12 e mais	2,0	0,8-3,3	0,7	0,7-2,1	3,4	1,4-5,5
Total	6,4	4,3-8,5	2,7	1,1-4,3	10,0	6,2-13,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	84,9	77,5-92,3	72,8	64,1-81,5
55 a 59	80,3	71,3-89,3	60,1	48,4-71,7
Anos de escolaridade				
0 a 8	82,1	75,3-88,9	65,7	57,4-73,9
9 a 11	89,0	79,8-98,3	83,2	72,6-93,7
12 e mais	91,7	82,6-100,0	85,2	74,1-96,3
Total	83,4	77,7-89,2	68,7	61,8-75,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	84,8	78,0-91,7	81,6	74,4-88,8
35 a 44	96,1	93,1-99,1	90,0	85,1-95,0
45 a 54	98,0	96,3-99,7	92,5	88,5-96,5
55 a 59	87,7	76,9-98,5	70,7	57,6-83,7
Anos de escolaridade				
0 a 8	90,2	85,0-95,4	85,0	79,3-90,8
9 a 11	90,9	86,4-95,3	86,0	80,6-91,3
12 e mais	96,4	94,0-98,8	89,9	85,6-94,2
Total	91,0	87,7-94,3	85,8	82,0-89,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	37,0	28,0-46,0	23,9	13,4-34,5	49,8	35,9-63,8
25 a 34	31,6	25,0-38,3	21,3	12,2-30,5	41,0	31,7-50,2
35 a 44	38,2	32,5-43,8	19,0	12,8-25,2	57,6	49,4-65,8
45 a 54	25,7	20,4-31,0	9,1	4,5-13,8	43,2	34,5-51,9
55 a 64	17,1	11,1-23,1	5,7	0,6-10,9	28,9	19,1-38,6
65 e mais	8,8	4,6-13,1	2,0	0,8-4,9	15,3	7,9-22,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,3	20,1-30,4	13,8	7,8-19,8	37,2	29,2-45,2
9 a 11	39,8	35,7-43,9	22,8	17,4-28,1	54,1	48,5-59,6
12 e mais	48,1	43,5-52,6	31,8	25,3-38,3	65,3	59,7-70,9
Total	31,8	28,4-35,2	18,0	14,0-22,1	45,2	40,2-50,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,9	2,5-13,4	7,2	0,5-13,9	8,7	0,1-17,2
25 a 34	14,3	8,8-19,8	11,2	4,1-18,4	17,1	9,1-25,2
35 a 44	14,9	10,7-19,2	12,9	7,5-18,4	17,0	10,4-23,5
45 a 54	38,9	32,4-45,4	34,7	25,5-43,8	43,3	34,3-52,4
55 a 64	45,5	36,5-54,5	42,9	28,5-57,3	48,2	37,6-58,8
65 e mais	54,8	44,4-65,1	49,1	31,7-66,4	60,1	48,9-71,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	24,7	20,5-29,0	20,2	14,8-25,7	29,4	22,8-36,1
9 a 11	12,0	9,6-14,4	12,5	8,8-16,2	11,5	8,4-14,7
12 e mais	12,6	9,5-15,6	13,1	8,2-18,1	12,0	8,4-15,5
Total	19,7	17,0-22,3	17,4	13,8-20,9	22,0	18,0-25,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,3	0,8-3,4	2,1	2,0-6,2	0,5	0,4-1,3
25 a 34	1,8	0,1-3,6	1,5	0,3-3,3	2,0	1,1-5,0
35 a 44	3,3	0,9-5,6	1,8	0,0-3,5	4,8	0,4-9,1
45 a 54	11,7	7,3-16,2	6,8	2,7-10,9	17,0	9,3-24,7
55 a 64	16,2	9,6-22,8	16,4	5,8-27,0	16,0	8,1-23,9
65 e mais	16,9	9,3-24,5	14,6	2,9-26,4	19,1	9,4-28,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,1	4,2-8,0	3,8	1,5-6,1	8,5	5,3-11,7
9 a 11	2,8	1,6-4,0	3,9	1,7-6,1	1,8	0,6-3,0
12 e mais	3,1	1,1-5,1	5,0	1,2-8,7	1,1	0,1-2,0
Total	4,8	3,6-6,0	3,9	2,3-5,5	5,6	3,8-7,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,1
25 a 34	1,8	0,9-4,4	0,3	0,2-0,7	3,1	1,8-8,0
35 a 44	0,6	0,2-1,3	0,0	0,0-0,0	1,1	0,3-2,6
45 a 54	3,6	1,2-6,0	5,1	0,9-9,3	2,0	0,1-3,8
55 a 64	6,1	2,8-9,5	4,0	0,0-7,9	8,3	3,0-13,7
65 e mais	5,6	1,5-9,7	3,0	2,8-8,9	8,0	2,3-13,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,2	0,8-3,6	1,2	0,2-2,2	3,2	0,5-5,8
9 a 11	1,1	0,3-1,9	1,2	0,2-2,1	1,1	0,2-2,3
12 e mais	0,7	0,1-1,3	0,4	0,1-0,9	1,1	0,0-2,2
Total	1,7	0,8-2,6	1,1	0,4-1,8	2,3	0,7-3,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,7	1,7-9,7	6,5	1,5-11,4	4,9	1,4-11,2
25 a 34	11,4	7,1-15,7	9,3	2,9-15,8	13,3	7,6-19,1
35 a 44	18,4	13,6-23,2	15,0	9,3-20,6	21,9	14,3-29,4
45 a 54	28,2	22,3-34,2	24,4	16,3-32,6	32,2	23,6-40,8
55 a 64	34,9	26,5-43,4	28,7	15,4-41,9	41,5	31,1-51,8
65 e mais	28,1	19,6-36,7	14,5	3,9-25,1	41,1	29,7-52,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,2	13,7-20,7	12,3	7,9-16,6	22,2	16,7-27,8
9 a 11	12,9	10,2-15,6	13,4	9,3-17,4	12,5	9,0-16,0
12 e mais	17,5	13,9-21,0	20,0	14,3-25,7	14,8	10,8-18,8
Total	15,8	13,6-18,1	13,3	10,3-16,3	18,3	15,0-21,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,2-0,7	0,4	0,4-1,3	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,6	0,4-1,7	0,3	0,2-0,7	1,0	0,9-2,9
35 a 44	0,5	0,1-1,1	0,4	0,4-1,2	0,6	0,3-1,5
45 a 54	4,1	1,4-6,9	1,4	1,3-4,0	7,1	2,2-11,9
55 a 64	9,5	4,4-14,6	4,0	1,7-9,8	15,2	7,0-23,3
65 e mais	18,8	11,8-25,8	5,3	1,8-12,3	31,7	21,0-42,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,3	2,2-4,5	1,1	0,1-2,0	5,7	3,7-7,8
9 a 11	1,0	0,3-1,6	1,0	0,1-2,1	0,9	0,2-1,6
12 e mais	0,2	0,2-0,6	0,0	0,0-0,0	0,5	0,3-1,3
Total	2,3	1,6-3,0	0,9	0,3-1,6	3,7	2,5-4,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,4	0,8-5,5	0,3	0,3-0,9	4,4	1,7-10,6
25 a 34	6,6	3,2-10,0	3,6	0,5-6,8	9,3	3,6-14,9
35 a 44	3,4	1,4-5,5	4,1	0,8-7,3	2,8	0,3-5,3
45 a 54	2,2	0,4-3,9	1,4	0,3-3,1	3,0	0,2-6,1
55 a 64	1,4	0,3-3,2	1,1	0,5-2,8	1,7	1,4-4,8
65 e mais	5,8	1,4-10,3	5,3	1,8-12,3	6,4	0,8-11,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,9	1,8-6,0	3,9	1,8-6,0	6,0	2,1-9,9
9 a 11	4,0	2,3-5,7	4,0	2,3-5,7	4,1	1,8-6,5
12 e mais	3,9	2,0-5,7	3,9	2,0-5,7	4,8	2,3-7,3
Total	3,9	2,5-5,3	2,5	1,3-3,8	5,3	2,9-7,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	27,9	20,0-35,9	26,6	16,2-37,0	29,2	17,2-41,3
25 a 34	19,5	15,2-23,8	17,2	11,2-23,2	21,5	15,4-27,6
35 a 44	35,1	29,9-40,3	32,9	25,7-40,2	37,3	29,9-44,7
45 a 54	39,2	33,2-45,1	36,7	28,3-45,0	41,8	33,4-50,3
55 a 64	42,8	33,7-51,8	46,4	31,7-61,0	39,0	29,0-49,1
65 e mais	40,5	30,9-50,1	23,0	10,6-35,4	57,1	45,8-68,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,0	15,9-24,1	17,0	11,7-22,3	23,1	16,8-29,4
9 a 11	37,7	33,8-41,6	37,7	31,8-43,6	37,7	32,5-42,9
12 e mais	71,4	67,1-75,6	70,5	63,9-77,0	72,4	67,0-77,7
Total	30,0	27,1-32,9	27,8	23,8-31,8	32,1	27,9-36,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	72,0	60,5-83,4
26 a 30	78,3	67,6-89,0
31 a 35	75,1	62,3-87,8
36 a 40	79,0	70,4-87,6
41 a 45	64,5	50,9-78,0
46 a 50	54,3	41,3-67,3
Anos de escolaridade		
0 a 8	75,6	66,5-84,6
9 a 11	70,6	65,0-76,2
12 e mais	64,8	58,7-70,9
Total	68,9	64,0-73,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,4	4,5-16,2	9,1	1,3-16,8	11,7	3,0-20,4
25 a 34	13,7	7,9-19,4	15,0	4,7-25,3	12,5	6,8-18,2
35 a 44	11,7	7,9-15,6	5,6	1,3-10,0	17,9	11,6-24,2
45 a 54	16,1	11,1-21,0	9,4	3,7-15,1	23,1	15,2-31,0
55 a 64	17,0	9,2-24,8	20,1	6,8-33,3	13,9	6,1-21,6
65 e mais	14,3	7,7-20,9	6,5	0,8-13,9	21,7	11,6-31,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,8	10,8-18,8	12,9	6,9-18,9	16,7	11,3-22,1
9 a 11	9,6	7,3-12,0	6,3	3,3-9,3	12,4	9,0-15,8
12 e mais	12,0	9,1-15,0	7,4	3,8-11,0	17,0	12,4-21,5
Total	12,9	10,4-15,5	10,5	6,7-14,4	15,3	11,9-18,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	64,0	33,7-94,2	59,2	13,9-100,0	67,6	26,6-100,0
25 a 34	83,0	68,7-97,3	96,7	89,8-100,0	67,0	42,9-91,1
35 a 44	77,1	59,9-94,3	58,8	15,3-100,0	82,9	67,9-97,9
45 a 54	84,5	72,7-96,2	75,9	48,8-100,0	88,2	76,6-99,9
55 a 64	94,2	85,9-100,0	0,0	0,0-0,0	85,6	66,2-100,0
65 e mais	83,1	65,3-100,0	62,1	8,6-100,0	89,1	72,9-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	78,9	66,1-91,7	81,8	63,1-100,0	76,5	59,3-93,7
9 a 11	76,4	65,3-87,5	71,5	49,1-93,9	78,5	66,0-91,0
12 e mais	87,2	78,0-96,4	94,7	84,6-100,0	83,7	71,4-96,0
Total	79,0	69,8-88,2	80,8	66,0-95,6	77,7	66,2-89,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,9	4,1-13,7	9,5	2,6-16,4	8,3	1,6-15,0
25 a 34	4,2	1,3-7,1	6,5	0,5-12,4	2,2	0,5-4,0
35 a 44	14,6	9,1-20,1	13,5	4,3-22,8	15,5	9,0-22,0
45 a 54	17,2	11,8-22,6	21,4	10,8-32,0	14,0	9,2-18,8
55 a 64	14,3	9,5-19,1	20,0	11,1-28,8	10,4	5,3-15,5
65 e mais	7,0	3,4-10,6	7,6	0,7-14,6	6,7	2,5-10,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,8	8,5-15,2	13,5	7,5-19,5	10,5	6,8-14,2
9 a 11	8,9	6,6-11,2	10,5	6,8-14,2	7,7	4,7-10,6
12 e mais	8,4	6,1-10,8	9,3	5,7-13,0	7,7	4,6-10,8
Total	10,4	8,4-12,4	12,0	8,4-15,5	9,2	7,0-11,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,9	1,9-5,9	4,1	1,3-6,9	3,8	0,9-6,6
25 a 34	14,5	7,8-21,2	21,5	9,2-33,8	8,4	2,5-14,4
35 a 44	20,4	14,6-26,3	24,1	13,9-34,3	17,3	10,8-23,9
45 a 54	31,9	25,8-38,1	32,7	22,1-43,4	31,4	24,2-38,5
55 a 64	34,6	27,8-41,3	42,9	32,5-53,4	28,9	20,1-37,6
65 e mais	39,5	32,5-46,6	60,6	47,7-73,6	27,7	20,3-35,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	24,0	19,5-28,5	27,4	19,5-35,3	21,2	16,4-26,0
9 a 11	15,4	12,6-18,2	20,9	15,8-26,0	11,2	8,2-14,1
12 e mais	16,5	13,4-19,7	20,9	15,5-26,2	13,0	9,4-16,6
Total	20,3	17,7-22,9	24,5	19,8-29,2	16,9	14,2-19,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,3	0,9-3,4	0,1	0,1-0,3	2,4	1,7-6,5
25 a 34	1,2	0,3-2,1	2,3	0,3-4,3	0,2	0,1-0,4
35 a 44	5,2	1,1-9,4	5,8	2,4-14,1	4,7	1,4-8,1
45 a 54	10,0	5,2-14,8	14,0	4,3-23,7	7,0	3,4-10,6
55 a 64	4,5	1,7-7,2	6,6	0,9-12,3	3,0	0,5-5,5
65 e mais	1,3	0,1-2,6	2,3	0,9-5,6	0,7	0,0-1,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,5	2,2-6,7	5,3	1,1-9,6	3,7	1,6-5,8
9 a 11	2,3	1,2-3,4	3,3	1,2-5,3	1,6	0,5-2,6
12 e mais	3,3	1,7-4,8	4,1	1,5-6,7	2,6	0,8-4,3
Total	3,6	2,4-4,9	4,6	2,1-7,0	2,9	1,7-4,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	56,6	48,0-65,1	53,5	40,7-66,2	59,5	48,0-70,9
25 a 34	41,6	32,8-50,4	53,2	39,2-67,3	31,5	21,8-41,3
35 a 44	37,2	30,2-44,1	43,1	31,1-55,1	32,2	24,6-39,9
45 a 54	35,6	29,4-41,9	38,5	27,7-49,3	33,5	26,1-40,8
55 a 64	34,3	27,3-41,4	37,6	27,0-48,1	32,1	22,6-41,6
65 e mais	25,4	18,9-31,9	31,1	18,4-43,7	22,2	15,0-29,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	45,6	39,8-51,5	52,2	42,6-61,8	40,3	33,3-47,2
9 a 11	37,4	33,3-41,6	42,0	35,4-48,5	33,9	28,6-39,2
12 e mais	30,1	26,0-34,2	32,6	26,2-39,1	28,1	22,9-33,4
Total	40,7	37,2-44,2	46,0	40,2-51,8	36,4	32,2-40,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,1	16,9-33,2	27,6	15,6-39,7	22,5	11,5-33,5
25 a 34	46,2	36,6-55,7	59,5	46,0-72,9	30,7	18,9-42,4
35 a 44	56,2	49,0-63,3	62,1	50,5-73,7	50,6	42,0-59,2
45 a 54	53,2	46,4-60,0	54,3	42,5-66,1	52,4	44,5-60,3
55 a 64	58,0	51,0-64,9	60,8	50,4-71,2	55,7	46,4-64,9
65 e mais	48,7	40,9-56,5	43,0	29,4-56,6	52,8	43,4-62,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	52,8	46,4-59,2	53,4	43,6-63,2	52,2	44,1-60,2
9 a 11	39,2	35,0-43,4	45,8	39,2-52,3	33,8	28,4-39,1
12 e mais	41,5	37,2-45,8	55,5	48,9-62,1	30,1	24,9-35,3
Total	46,6	43,0-50,2	51,6	45,8-57,4	41,9	37,5-46,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,5	4,1-18,8	12,9	1,5-24,3	10,0	0,9-19,0
25 a 34	12,7	5,5-19,9	19,6	7,0-32,2	4,7	2,0-7,4
35 a 44	13,1	8,9-17,4	12,8	6,8-18,9	13,4	7,5-19,3
45 a 54	17,4	12,7-22,2	14,5	7,1-21,9	19,8	13,7-25,9
55 a 64	18,2	12,6-23,7	18,4	9,7-27,1	18,0	10,8-25,2
65 e mais	15,1	9,1-21,1	13,3	2,2-24,4	16,4	9,7-23,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,6	12,7-22,5	17,8	9,7-25,9	17,3	12,1-22,5
9 a 11	9,6	7,3-12,0	10,8	6,8-14,8	8,6	5,9-11,4
12 e mais	11,1	8,3-13,9	15,3	10,4-20,3	7,7	4,7-10,7
Total	14,0	11,3-16,6	15,4	10,7-20,1	12,6	9,9-15,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	34,7	26,0-43,5	26,2	15,4-37,1	42,8	30,3-55,3
25 a 34	30,4	22,8-37,9	27,4	15,9-38,9	33,0	23,2-42,7
35 a 44	40,0	33,3-46,7	34,5	23,9-45,1	44,5	36,4-52,7
45 a 54	41,9	35,6-48,3	40,9	29,8-52,0	42,7	35,4-50,0
55 a 64	43,9	37,1-50,7	42,5	31,9-53,0	45,0	36,0-53,9
65 e mais	49,8	42,7-56,9	49,8	36,5-63,0	49,8	41,6-58,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,9	29,5-40,3	28,3	20,1-36,4	40,4	33,5-47,3
9 a 11	36,7	32,6-40,7	34,6	28,5-40,6	38,3	32,9-43,7
12 e mais	50,5	46,2-54,8	48,8	42,2-55,5	51,8	46,2-57,5
Total	38,1	34,8-41,3	33,5	28,4-38,5	41,8	37,6-45,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,7	13,7-29,7	17,7	7,9-27,5	25,5	13,3-37,7
25 a 34	18,1	11,8-24,5	12,4	4,9-19,8	23,1	13,6-32,6
35 a 44	20,2	14,7-25,7	21,9	12,5-31,4	18,8	12,5-25,0
45 a 54	18,7	14,1-23,4	12,1	5,8-18,4	23,8	17,5-30,1
55 a 64	24,5	18,9-30,1	23,4	14,2-32,7	25,2	18,2-32,2
65 e mais	21,3	15,9-26,6	21,4	11,9-30,9	21,2	14,8-27,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,7	14,1-23,2	13,9	7,6-20,1	22,6	16,2-29,0
9 a 11	21,3	17,9-24,8	19,8	14,8-24,8	22,5	17,9-27,2
12 e mais	23,7	20,0-27,3	23,8	17,9-29,7	23,6	19,1-28,1
Total	20,3	17,5-23,0	17,2	13,3-21,1	22,7	18,9-26,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	35,2	26,9-43,4	44,5	31,9-57,0	26,4	15,7-37,1
25 a 34	36,6	27,6-45,6	55,1	41,4-68,9	20,5	11,4-29,5
35 a 44	34,7	27,8-41,6	44,1	32,4-55,9	26,9	19,1-34,7
45 a 54	21,7	16,1-27,3	26,7	16,3-37,1	18,0	12,3-23,8
55 a 64	19,8	14,4-25,2	34,9	24,6-45,2	9,5	4,9-14,1
65 e mais	14,5	9,3-19,7	20,5	9,6-31,4	11,2	6,0-16,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	31,7	25,9-37,4	43,8	34,1-53,6	21,7	15,6-27,8
9 a 11	30,8	26,8-34,8	42,7	36,2-49,2	21,5	16,8-26,2
12 e mais	23,9	20,1-27,7	35,1	28,6-41,7	14,9	10,9-18,9
Total	30,1	26,7-33,5	42,0	36,2-47,9	20,5	16,8-24,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	59,6	50,9-68,3	54,8	41,9-67,7	64,1	52,7-75,4
25 a 34	53,6	44,8-62,5	48,1	34,0-62,1	58,5	48,1-68,8
35 a 44	49,6	42,6-56,6	47,6	35,9-59,4	51,2	43,1-59,4
45 a 54	48,2	41,7-54,7	51,2	39,8-62,7	46,0	38,6-53,4
55 a 64	39,5	32,6-46,4	42,3	31,9-52,8	37,6	28,4-46,8
65 e mais	37,0	30,2-43,7	31,9	20,0-43,8	39,8	31,8-47,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	47,8	42,1-53,6	41,6	32,3-51,0	52,9	46,1-59,8
9 a 11	56,6	52,4-60,9	57,0	50,6-63,5	56,3	50,8-61,9
12 e mais	48,0	43,7-52,4	55,3	48,7-61,9	42,2	36,6-47,9
Total	50,4	46,9-53,8	48,2	42,5-53,9	52,1	47,9-56,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	28,0	20,5-35,5	34,7	23,0-46,3	21,7	12,3-31,0
25 a 34	15,6	9,7-21,6	19,7	9,2-30,2	12,1	5,9-18,3
35 a 44	13,6	8,8-18,3	19,2	10,3-28,2	8,8	4,5-13,2
45 a 54	9,5	5,7-13,2	11,7	4,7-18,8	7,7	4,0-11,5
55 a 64	10,8	5,7-15,9	13,8	6,4-21,1	8,8	1,8-15,7
65 e mais	2,3	0,4-4,2	2,9	1,4-7,2	2,0	0,2-3,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,9	9,9-18,0	18,7	11,4-26,0	10,0	5,7-14,3
9 a 11	18,8	15,4-22,3	25,7	19,8-31,6	13,5	9,5-17,4
12 e mais	12,9	9,8-16,0	15,2	10,4-20,1	11,0	7,1-15,0
Total	15,1	12,6-17,6	20,1	15,6-24,5	11,2	8,5-13,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,1	13,9-26,3	29,8	18,7-40,9	10,9	6,2-15,7
25 a 34	19,1	11,8-26,4	27,8	14,2-41,5	11,4	6,2-16,7
35 a 44	12,9	9,2-16,5	11,1	6,2-16,0	14,4	9,2-19,6
45 a 54	14,4	10,2-18,6	15,4	7,9-22,8	13,7	8,8-18,5
55 a 64	14,8	10,2-19,3	17,1	9,5-24,7	13,2	7,6-18,7
65 e mais	20,2	14,4-25,9	26,5	15,1-38,0	16,6	10,4-22,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,2	9,0-17,3	19,0	10,9-27,2	8,3	5,3-11,4
9 a 11	20,1	16,8-23,4	23,7	18,2-29,2	17,3	13,3-21,3
12 e mais	24,4	20,6-28,2	28,7	22,5-35,0	20,9	16,3-25,4
Total	17,0	14,5-19,6	22,0	17,1-26,8	13,0	10,8-15,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	35,6	26,9-44,3	55,2	42,8-67,6	17,2	9,2-25,2
25 a 34	50,1	41,4-58,8	63,1	51,0-75,3	38,7	28,2-49,2
35 a 44	44,6	37,6-51,6	51,1	39,3-62,9	39,2	31,1-47,2
45 a 54	38,0	31,5-44,4	46,8	35,2-58,3	31,4	24,9-37,8
55 a 64	24,2	17,9-30,5	36,3	25,8-46,7	16,0	8,3-23,6
65 e mais	11,5	6,5-16,4	23,1	11,3-34,9	5,0	1,8-8,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,6	35,7-47,5	60,6	51,7-69,5	26,0	19,7-32,3
9 a 11	37,0	32,9-41,2	46,4	39,9-52,9	29,7	24,6-34,9
12 e mais	28,7	24,7-32,6	28,2	22,1-34,3	29,0	23,8-34,2
Total	38,1	34,6-41,7	51,2	45,5-56,9	27,6	23,8-31,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,7	8,8-24,5	25,2	11,8-38,6	8,6	1,6-15,7
25 a 34	16,9	9,5-24,2	24,7	11,4-38,0	10,0	3,6-16,5
35 a 44	11,7	7,1-16,2	15,6	7,5-23,7	8,4	3,5-13,3
45 a 54	12,3	6,9-17,6	19,5	8,4-30,5	6,9	3,6-10,2
55 a 64	5,4	1,9-8,8	10,5	3,1-17,9	1,9	0,8-4,5
65 e mais	1,6	0,2-3,4	3,4	1,3-8,2	0,5	0,2-1,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,1	12,3-22,0	27,6	18,5-36,6	8,5	4,4-12,6
9 a 11	8,8	6,4-11,2	10,9	6,9-15,0	7,2	4,3-10,1
12 e mais	4,2	2,4-5,9	6,2	2,8-9,6	2,5	0,9-4,2
Total	12,6	9,8-15,4	19,3	14,0-24,7	7,1	4,7-9,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,9	12,4-27,4	4,8	2,3-11,8	34,1	22,3-46,0
25 a 34	37,5	29,0-46,1	17,5	4,7-30,2	55,0	44,7-65,4
35 a 44	40,6	33,9-47,3	17,0	7,8-26,2	60,2	52,2-68,2
45 a 54	36,5	30,6-42,4	14,8	7,2-22,4	52,8	45,3-60,3
55 a 64	39,0	32,2-45,8	14,4	6,7-22,0	55,8	46,6-64,9
65 e mais	26,8	20,9-32,7	13,6	5,1-22,1	34,2	26,6-41,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	38,6	33,1-44,2	17,0	9,3-24,8	56,4	49,4-63,3
9 a 11	34,6	30,6-38,5	10,2	6,7-13,7	53,6	48,0-59,2
12 e mais	14,9	12,0-17,8	7,8	4,4-11,2	20,6	16,2-25,0
Total	33,5	30,2-36,7	13,6	9,1-18,1	49,5	45,3-53,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,4	13,7-27,2	29,8	18,1-41,4	11,6	5,4-17,8
25 a 34	20,1	13,3-26,9	28,5	15,8-41,3	12,8	7,4-18,2
35 a 44	26,7	20,2-33,3	38,2	26,5-49,8	17,2	10,8-23,5
45 a 54	18,1	13,3-22,9	27,2	17,7-36,6	11,3	6,9-15,7
55 a 64	13,6	9,2-18,0	26,0	17,1-34,8	5,2	1,5-9,0
65 e mais	4,9	1,4-8,4	11,8	2,8-20,8	1,1	0,3-2,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,1	12,5-21,7	27,4	18,6-36,2	8,6	5,1-12,1
9 a 11	20,6	17,1-24,1	30,3	24,3-36,2	13,1	9,2-17,0
12 e mais	23,9	20,1-27,6	33,2	27,0-39,5	16,3	12,0-20,6
Total	19,2	16,5-22,0	29,2	24,0-34,4	11,2	8,9-13,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,2	0,2-2,2	2,6	0,5-4,7	0,0	0,0-0,0
25 a 34	2,3	1,1-5,7	4,9	2,4-12,1	0,1	0,1-0,2
35 a 44	2,3	0,1-4,5	5,0	0,3-9,8	0,0	0,0-0,0
45 a 54	2,2	0,4-4,0	4,8	0,7-8,9	0,3	0,3-1,0
55 a 64	0,6	0,4-1,6	1,5	1,0-4,0	0,0	0,0-0,0
65 e mais	1,2	0,3-2,7	3,3	0,9-7,6	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,4	0,3-3,2	3,2	0,7-7,1	0,0	0,0-0,0
9 a 11	1,6	0,6-2,6	3,7	1,3-6,0	0,0	0,0-0,0
12 e mais	3,4	1,7-5,0	7,1	3,5-10,7	0,4	0,2-1,0
Total	1,8	0,8-2,9	4,0	1,7-6,3	0,1	0,0-0,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,4	0,2-6,9	0,3	0,2-0,9	6,2	0,6-13,0
25 a 34	5,5	0,9-10,0	1,3	0,4-3,1	9,0	0,9-17,2
35 a 44	3,9	0,7-7,1	2,2	2,0-6,4	5,3	0,6-10,0
45 a 54	3,2	1,4-5,0	0,1	0,1-0,4	5,6	2,5-8,7
55 a 64	4,8	2,1-7,5	3,0	0,0-6,1	6,0	2,0-10,0
65 e mais	12,1	7,3-17,0	11,2	2,4-19,9	12,7	6,9-18,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,7	3,9-9,6	2,7	0,6-4,9	10,0	5,3-14,8
9 a 11	3,0	1,4-4,6	1,0	0,4-2,4	4,6	2,0-7,1
12 e mais	2,4	1,1-3,7	1,4	0,1-2,8	3,3	1,3-5,2
Total	4,9	3,3-6,6	2,0	0,7-3,3	7,3	4,6-10,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	83,6	76,4-90,7	76,4	68,9-83,9
55 a 59	87,0	80,7-93,4	71,6	62,6-80,5
Anos de escolaridade				
0 a 8	79,2	71,7-86,7	67,7	59,4-76,1
9 a 11	93,9	89,0-98,7	83,7	76,9-90,5
12 e mais	97,2	94,1-100,0	91,2	85,3-97,1
Total	84,9	79,8-90,0	74,5	68,8-80,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	76,8	67,4-86,1	71,4	61,0-81,8
35 a 44	90,1	85,5-94,7	86,7	81,0-92,3
45 a 54	86,5	79,9-93,2	78,3	71,0-85,7
55 a 59	94,7	89,5-99,8	91,5	85,4-97,7
Anos de escolaridade				
0 a 8	81,4	74,2-88,6	73,9	65,7-82,2
9 a 11	85,8	80,5-91,0	83,7	78,3-89,2
12 e mais	92,5	89,0-96,0	88,8	84,6-92,9
Total	84,8	80,7-89,0	79,6	74,9-84,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,4	25,0-41,9	20,7	10,2-31,1	45,5	33,3-57,6
25 a 34	31,2	24,2-38,3	19,9	11,2-28,6	41,1	31,1-51,0
35 a 44	33,6	27,5-39,7	22,5	13,8-31,1	42,8	34,9-50,8
45 a 54	33,2	27,7-38,8	19,8	12,6-27,1	43,3	36,0-50,6
55 a 64	27,5	21,2-33,7	8,7	3,9-13,6	40,3	31,2-49,3
65 e mais	19,1	13,9-24,3	10,3	2,6-18,0	24,0	17,3-30,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,7	16,9-26,4	11,2	5,2-17,2	30,3	23,6-37,0
9 a 11	36,4	32,3-40,5	22,4	17,1-27,8	47,3	41,7-52,9
12 e mais	51,9	47,6-56,2	38,7	32,2-45,2	62,4	56,9-67,9
Total	31,0	28,0-34,0	19,0	15,0-22,9	40,6	36,5-44,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,9	3,6-14,2	7,7	0,8-14,5	10,0	2,0-18,0
25 a 34	13,8	7,7-19,9	5,9	2,3-9,5	20,7	10,5-30,8
35 a 44	26,1	19,6-32,6	27,1	16,1-38,2	25,2	17,9-32,6
45 a 54	34,4	28,4-40,5	29,0	18,8-39,2	38,5	31,4-45,7
55 a 64	51,4	44,5-58,4	45,0	34,5-55,5	55,8	46,6-64,9
65 e mais	63,7	57,1-70,4	61,9	49,7-74,2	64,7	57,0-72,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	32,6	27,7-37,5	23,0	16,2-29,8	40,5	34,0-47,1
9 a 11	20,0	16,7-23,2	19,7	14,6-24,8	20,2	16,0-24,3
12 e mais	17,9	14,8-21,1	20,3	15,1-25,4	16,1	12,1-20,0
Total	26,6	23,7-29,4	21,6	17,5-25,7	30,5	26,7-34,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,0	0,2-2,1	0,7	0,7-2,1	1,2	0,6-3,1
25 a 34	1,1	0,7-2,8	2,0	1,7-5,7	0,3	0,3-0,8
35 a 44	4,6	1,6-7,6	6,0	0,3-11,8	3,3	0,7-6,0
45 a 54	6,5	3,6-9,4	2,3	0,2-4,8	9,7	5,0-14,4
55 a 64	11,6	7,3-16,0	12,5	5,8-19,2	11,0	5,3-16,8
65 e mais	18,4	13,0-23,8	21,0	10,6-31,4	16,9	10,9-23,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,7	4,7-8,6	6,0	2,7-9,4	7,2	4,8-9,5
9 a 11	3,5	2,2-4,9	3,3	1,5-5,1	3,7	1,8-5,6
12 e mais	3,2	1,9-4,6	4,0	1,5-6,5	2,6	1,1-4,1
Total	5,2	4,0-6,4	4,9	3,0-6,9	5,4	4,0-6,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,1	0,1-0,3	0,2	0,2-0,7	0,0	0,0-0,0
35 a 44	1,3	0,2-2,9	1,8	1,1-4,7	1,0	0,4-2,3
45 a 54	3,3	1,2-5,4	2,0	0,5-4,6	4,3	1,2-7,4
55 a 64	5,5	2,2-8,8	4,2	0,1-8,3	6,4	1,7-11,2
65 e mais	10,6	5,8-15,4	17,9	7,2-28,5	6,5	2,1-10,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,1	1,9-4,4	3,0	0,9-5,1	3,2	1,7-4,8
9 a 11	1,6	0,8-2,4	2,4	1,0-3,8	0,9	0,0-1,9
12 e mais	0,9	0,1-1,6	0,8	0,2-1,8	0,9	0,2-2,0
Total	2,3	1,6-3,0	2,5	1,2-3,7	2,2	1,3-3,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,5	2,4-12,7	2,6	0,4-4,9	12,2	2,8-21,5
25 a 34	7,6	3,8-11,3	7,7	2,8-12,7	7,4	1,8-13,0
35 a 44	21,2	15,5-26,8	19,3	9,8-28,7	22,7	16,0-29,5
45 a 54	23,1	18,4-27,7	15,2	8,7-21,6	29,0	22,7-35,3
55 a 64	34,1	27,7-40,6	27,4	18,2-36,7	38,7	30,0-47,4
65 e mais	38,5	31,6-45,5	30,7	17,7-43,7	42,9	34,8-51,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,1	15,3-22,9	12,3	7,2-17,3	24,7	19,3-30,0
9 a 11	14,7	12,1-17,3	14,0	9,9-18,1	15,2	11,8-18,6
12 e mais	20,4	17,1-23,7	16,8	12,3-21,2	23,3	18,7-28,0
Total	18,1	15,8-20,3	13,5	10,4-16,6	21,7	18,6-24,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,7	0,4-1,8	0,0	0,0-0,0	1,3	0,7-3,3
35 a 44	1,8	0,4-3,1	0,4	0,3-1,1	2,9	0,5-5,4
45 a 54	5,5	2,9-8,2	0,9	0,5-2,2	9,1	4,7-13,5
55 a 64	13,7	9,0-18,5	3,6	0,2-6,9	20,7	13,2-28,1
65 e mais	27,9	21,7-34,2	7,0	1,5-12,6	39,6	31,4-47,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,3	5,5-9,1	1,0	0,2-1,7	12,5	9,4-15,7
9 a 11	2,6	1,7-3,6	1,0	0,1-2,0	3,9	2,4-5,4
12 e mais	3,1	1,8-4,3	1,3	0,2-2,9	4,4	2,5-6,4
Total	5,3	4,3-6,3	1,0	0,5-1,6	8,7	6,9-10,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,0	1,5-6,6	1,1	0,2-2,5	6,8	2,0-11,6
25 a 34	4,7	1,9-7,5	1,8	0,3-3,2	7,3	2,4-12,2
35 a 44	3,6	1,0-6,1	4,9	0,2-10,1	2,5	0,6-4,3
45 a 54	1,9	0,5-3,2	0,4	0,4-1,1	3,0	0,7-5,3
55 a 64	3,0	1,1-4,9	1,3	0,3-2,9	4,1	1,2-7,1
65 e mais	2,9	1,0-4,8	2,2	0,9-5,3	3,3	0,9-5,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,4	0,9-4,0	1,7	0,4-3,7	3,1	0,8-5,3
9 a 11	5,3	3,2-7,4	2,1	0,6-3,6	7,8	4,3-11,2
12 e mais	4,5	2,8-6,2	3,5	1,1-5,9	5,3	2,9-7,8
Total	3,6	2,5-4,7	2,1	0,8-3,4	4,8	3,2-6,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	37,2	29,4-45,0	35,9	24,5-47,3	38,4	27,6-49,1
25 a 34	29,2	22,6-35,8	33,0	21,2-44,8	25,9	19,1-32,8
35 a 44	42,3	35,8-48,9	37,6	27,2-48,1	46,2	38,2-54,2
45 a 54	44,4	38,1-50,7	45,4	34,3-56,5	43,6	36,5-50,8
55 a 64	45,9	39,1-52,7	47,2	36,7-57,8	44,9	36,1-53,8
65 e mais	45,2	38,3-52,1	39,5	27,1-51,8	48,4	40,2-56,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,1	15,9-24,2	20,1	15,9-24,2	20,4	15,8-25,0
9 a 11	46,8	42,6-51,1	46,8	42,6-51,1	48,0	42,4-53,6
12 e mais	86,1	83,0-89,1	86,1	83,0-89,1	86,4	82,4-90,4
Total	38,9	35,8-42,0	38,1	33,0-43,2	39,5	35,8-43,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	64,5	53,9-75,0
26 a 30	78,4	67,9-88,9
31 a 35	71,3	56,9-85,7
36 a 40	65,8	54,9-76,7
41 a 45	68,3	56,1-80,4
46 a 50	63,1	52,9-73,3
Anos de escolaridade		
0 a 8	74,9	66,1-83,7
9 a 11	61,7	55,3-68,0
12 e mais	66,7	60,4-73,0
Total	72,3	64,9-79,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,7	5,5-16,0	6,3	0,9-13,5	14,9	7,2-22,5
25 a 34	14,5	8,7-20,4	1,9	0,3-4,1	25,5	15,8-35,1
35 a 44	13,0	8,8-17,2	7,8	1,1-14,5	17,3	11,9-22,7
45 a 54	17,5	13,0-22,0	8,8	2,1-15,6	24,1	18,2-30,0
55 a 64	16,4	11,4-21,5	7,4	2,0-12,7	22,6	15,1-30,1
65 e mais	14,9	10,0-19,7	12,1	3,9-20,3	16,4	10,4-22,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,5	10,8-18,2	6,6	2,3-10,9	20,9	15,4-26,4
9 a 11	12,8	10,1-15,5	6,6	3,3-9,9	17,5	13,5-21,5
12 e mais	14,9	11,9-17,9	5,1	2,6-7,7	22,7	17,9-27,5
Total	14,1	11,8-16,3	6,4	3,8-9,0	20,2	16,9-23,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	69,2	43,8-94,5	93,3	78,5-100,0	59,3	29,6-88,9
25 a 34	66,4	45,4-87,3	68,9	17,2-100,0	66,2	44,2-88,2
35 a 44	66,7	48,3-85,0	62,6	12,5-100,0	68,2	52,2-84,2
45 a 54	92,3	85,6-98,9	95,7	88,7-100,0	91,3	83,2-99,4
55 a 64	88,0	74,6-100,0	0,0	0,0-0,0	85,3	69,3-100,0
65 e mais	81,4	66,0-100,0	72,3	35,9-100,0	85,2	70,3-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	69,3	55,7-82,8	77,3	47,2-100,0	67,2	52,2-82,2
9 a 11	79,0	70,1-87,9	80,7	61,5-99,9	78,5	68,4-88,6
12 e mais	89,7	83,2-96,1	0,0	0,0-0,0	87,8	80,3-95,3
Total	75,4	67,1-83,7	81,3	62,8-99,9	73,9	64,7-83,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,3	7,8-32,7	14,7	2,0-27,5	25,2	4,7-45,6
25 a 34	16,6	7,5-25,6	21,2	5,0-37,4	12,3	3,7-21,0
35 a 44	17,2	11,9-22,4	18,9	10,5-27,3	15,5	9,0-22,0
45 a 54	19,9	14,5-25,4	21,2	12,7-29,7	18,8	11,9-25,7
55 a 64	20,9	13,3-28,5	22,3	9,8-34,8	19,6	10,7-28,5
65 e mais	11,5	5,8-17,2	10,9	3,0-18,9	12,1	4,0-20,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,8	16,2-29,4	21,6	12,8-30,4	24,0	14,2-33,7
9 a 11	8,9	6,8-10,9	11,8	8,0-15,6	6,5	4,3-8,7
12 e mais	8,7	6,2-11,3	11,1	6,6-15,7	6,6	4,0-9,2
Total	18,0	13,6-22,5	18,4	12,3-24,5	17,7	11,3-24,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,8	5,4-20,3	21,6	7,8-35,3	5,0	1,4-8,7
25 a 34	15,1	8,5-21,6	10,9	1,1-20,6	18,9	10,5-27,4
35 a 44	28,2	22,3-34,1	27,5	18,9-36,0	28,8	20,6-37,0
45 a 54	38,4	31,5-45,4	37,4	26,8-48,1	39,3	30,3-48,3
55 a 64	53,4	44,7-62,1	55,1	41,3-69,0	51,7	41,0-62,5
65 e mais	64,2	55,7-72,7	74,7	62,8-86,6	53,9	42,9-64,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,1	23,5-34,8	30,5	22,1-38,9	27,7	20,2-35,3
9 a 11	19,4	16,3-22,5	20,6	15,7-25,5	18,5	14,6-22,4
12 e mais	16,5	13,3-19,7	21,2	15,7-26,7	12,3	8,9-15,8
Total	25,5	21,9-29,2	27,4	21,7-33,1	23,8	19,2-28,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,3	1,8-14,5	5,6	3,4-14,5	7,0	6,2-20,2
25 a 34	2,4	0,2-4,7	1,1	0,1-2,3	3,7	0,4-7,7
35 a 44	4,6	1,6-7,5	6,6	1,4-11,8	2,7	0,4-5,8
45 a 54	7,5	3,8-11,1	9,0	3,0-14,9	6,1	1,6-10,5
55 a 64	3,8	0,4-8,1	7,4	1,0-15,8	0,5	0,5-1,4
65 e mais	2,1	0,3-3,8	1,8	0,3-3,8	2,4	0,4-5,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,9	2,3-9,6	5,3	1,3-9,4	6,5	0,5-12,6
9 a 11	1,8	0,8-2,7	3,4	1,3-5,4	0,5	0,0-1,0
12 e mais	2,6	1,0-4,2	4,5	1,6-7,4	0,9	0,4-2,2
Total	4,6	2,2-7,0	4,8	2,0-7,6	4,4	0,5-8,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	57,8	43,7-71,8	47,5	30,6-64,4	66,9	48,0-85,7
25 a 34	46,0	35,7-56,4	48,0	29,9-66,2	44,2	33,5-54,9
35 a 44	38,7	32,5-44,9	33,1	23,9-42,2	43,9	35,7-52,1
45 a 54	35,5	28,9-42,2	30,9	21,4-40,5	39,9	30,8-48,9
55 a 64	35,1	26,7-43,5	35,0	21,7-48,2	35,2	24,8-45,7
65 e mais	28,1	19,8-36,4	31,4	17,6-45,2	25,0	15,7-34,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,2	38,2-54,2	40,5	30,0-51,0	51,8	40,5-63,1
9 a 11	43,6	39,5-47,7	44,6	38,4-50,8	42,8	37,4-48,2
12 e mais	36,0	31,8-40,2	34,6	27,8-41,4	37,2	32,0-42,5
Total	44,6	39,2-50,0	40,8	33,5-48,1	48,0	40,3-55,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,2	12,7-37,7	43,6	25,2-62,0	7,5	2,4-12,6
25 a 34	49,4	38,6-60,2	50,8	32,3-69,3	47,9	37,0-58,8
35 a 44	60,6	54,1-67,0	67,9	58,8-77,0	52,3	43,4-61,2
45 a 54	69,6	63,3-76,0	76,7	68,3-85,0	62,2	52,9-71,6
55 a 64	61,9	52,5-71,3	64,1	50,0-78,2	59,3	47,4-71,2
65 e mais	50,1	38,8-61,4	47,5	31,2-63,7	54,1	39,5-68,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	52,2	43,1-61,4	57,9	46,5-69,2	45,3	31,6-58,9
9 a 11	39,5	35,5-43,5	47,2	40,9-53,5	33,2	28,2-38,2
12 e mais	50,4	46,0-54,8	68,1	61,4-74,7	34,6	29,4-39,8
Total	48,6	43,0-54,2	56,4	48,7-64,1	40,3	32,8-47,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,4	2,3-15,1	10,5	6,3-27,3	2,5	0,2-4,7
25 a 34	14,1	6,5-21,7	11,3	0,2-22,5	17,1	7,1-27,0
35 a 44	23,3	17,3-29,3	23,4	14,6-32,3	23,2	15,3-31,1
45 a 54	22,7	16,3-29,2	20,8	11,8-29,9	24,7	15,6-33,8
55 a 64	18,7	11,5-26,0	15,2	5,7-24,8	22,9	12,2-33,5
65 e mais	9,3	3,6-15,0	3,9	2,0-9,8	17,5	6,9-28,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,4	11,6-23,2	15,7	7,2-24,3	19,5	11,5-27,4
9 a 11	10,2	8,0-12,5	9,9	6,5-13,2	10,5	7,4-13,6
12 e mais	13,7	10,7-16,7	18,2	13,1-23,3	9,6	6,1-13,1
Total	15,0	11,4-18,7	14,6	8,8-20,4	15,5	11,2-19,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	13,5	5,5-21,5	13,8	1,6-26,0	13,3	2,7-23,8
25 a 34	23,4	14,1-32,8	16,8	0,2-33,7	29,5	19,9-39,2
35 a 44	20,3	15,7-24,9	21,2	13,5-29,0	19,5	14,2-24,7
45 a 54	23,6	18,3-29,0	20,9	13,0-28,7	26,2	18,9-33,5
55 a 64	26,6	18,9-34,3	27,4	15,0-39,8	25,9	16,6-35,1
65 e mais	23,6	16,2-31,0	17,9	6,9-29,0	29,1	19,4-38,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,7	12,1-23,2	16,4	7,5-25,3	18,9	12,1-25,8
9 a 11	22,1	18,8-25,3	18,2	13,6-22,8	25,1	20,6-29,6
12 e mais	34,6	30,6-38,7	30,5	24,3-36,8	38,3	33,1-43,6
Total	20,4	16,6-24,2	18,1	12,0-24,3	22,4	17,7-27,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,0	3,2-18,7	12,7	0,4-24,9	9,4	0,2-19,1
25 a 34	13,4	4,4-22,5	12,0	5,3-29,4	14,7	7,2-22,2
35 a 44	10,3	6,7-13,9	9,5	3,5-15,5	11,0	6,9-15,1
45 a 54	12,4	8,3-16,4	10,1	4,6-15,6	14,5	8,6-20,4
55 a 64	13,3	7,5-19,0	17,8	7,3-28,2	9,0	4,3-13,7
65 e mais	16,3	9,9-22,8	13,9	3,8-24,0	18,8	10,6-27,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,6	6,4-16,8	12,8	3,9-21,6	10,5	5,0-15,9
9 a 11	11,0	8,6-13,4	8,5	5,3-11,7	13,0	9,6-16,4
12 e mais	19,1	15,9-22,3	14,0	9,4-18,6	23,7	19,3-28,2
Total	12,2	8,7-15,7	11,9	5,8-18,0	12,4	8,7-16,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	55,3	41,0-69,5	50,9	33,9-67,9	59,1	38,1-80,2
25 a 34	40,1	29,7-50,6	45,2	27,0-63,4	35,5	24,6-46,5
35 a 44	29,9	24,2-35,7	40,7	31,1-50,3	20,0	13,8-26,1
45 a 54	30,5	23,9-37,1	48,1	37,4-58,9	14,0	7,3-20,7
55 a 64	22,2	14,7-29,6	31,5	18,6-44,4	13,3	6,2-20,3
65 e mais	21,2	13,4-29,0	30,1	16,8-43,3	12,6	4,2-21,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,8	32,5-49,1	43,3	32,7-53,8	38,4	25,2-51,5
9 a 11	35,5	31,5-39,5	49,1	42,8-55,3	25,0	20,0-29,9
12 e mais	31,7	27,6-35,9	40,2	33,3-47,1	24,0	19,4-28,6
Total	38,6	32,9-44,3	44,3	36,9-51,6	33,5	24,4-42,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	65,4	51,6-79,3	62,2	44,4-80,0	68,3	48,1-88,5
25 a 34	73,9	65,5-82,2	75,7	61,7-89,7	72,2	62,6-81,7
35 a 44	59,6	53,2-66,0	47,8	38,1-57,5	70,6	63,2-78,0
45 a 54	63,9	57,3-70,5	64,4	54,2-74,6	63,4	54,8-72,0
55 a 64	49,3	40,6-58,1	48,4	34,5-62,3	50,2	39,5-61,0
65 e mais	47,1	37,9-56,4	48,1	33,2-62,9	46,2	35,2-57,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	62,0	54,8-69,2	57,4	47,2-67,6	66,5	56,5-76,5
9 a 11	71,3	67,6-75,0	72,8	67,4-78,2	70,2	65,2-75,2
12 e mais	61,9	57,7-66,1	64,9	58,5-71,4	59,2	53,8-64,5
Total	64,3	59,4-69,1	61,6	54,5-68,6	66,8	60,2-73,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	41,7	27,4-56,0	41,7	24,6-58,9	41,7	19,4-64,0
25 a 34	31,4	22,7-40,1	27,1	12,7-41,5	35,4	25,6-45,2
35 a 44	29,2	23,1-35,2	36,5	26,7-46,3	22,4	15,5-29,3
45 a 54	18,5	13,2-23,8	19,3	11,3-27,3	17,8	10,8-24,8
55 a 64	15,9	9,6-22,1	12,5	3,9-21,1	19,1	10,3-28,0
65 e mais	5,9	2,0-9,8	6,7	0,2-13,2	5,2	0,8-9,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	28,7	21,7-35,7	28,7	19,0-38,5	28,7	18,7-38,7
9 a 11	33,3	29,3-37,2	32,6	26,7-38,4	33,9	28,5-39,2
12 e mais	25,6	21,7-29,5	28,4	21,9-35,0	23,0	18,5-27,5
Total	29,5	24,8-34,3	29,6	22,8-36,4	29,5	22,9-36,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,1	8,2-28,0	28,4	12,5-44,3	9,0	0,6-18,5
25 a 34	16,1	8,9-23,3	21,5	7,7-35,3	11,2	5,7-16,6
35 a 44	11,5	7,6-15,4	13,1	6,3-19,9	10,0	5,9-14,0
45 a 54	14,7	9,3-20,0	18,9	9,5-28,4	10,6	5,5-15,8
55 a 64	13,8	7,4-20,1	17,6	6,7-28,5	10,1	3,6-16,5
65 e mais	4,7	1,7-7,8	7,1	1,3-12,8	2,5	0,0-4,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,1	7,0-17,2	16,7	7,9-25,6	7,6	2,8-12,3
9 a 11	20,1	16,8-23,3	28,6	22,8-34,3	13,4	10,0-16,9
12 e mais	18,4	15,0-21,8	24,3	18,4-30,1	13,1	9,6-16,7
Total	14,6	11,2-18,1	20,1	14,0-26,2	9,6	6,4-12,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	56,5	42,5-70,6	55,9	39,3-72,4	57,1	35,2-79,0
25 a 34	33,7	24,8-42,6	32,6	17,3-48,0	34,6	25,0-44,3
35 a 44	47,9	41,5-54,3	58,6	49,2-68,1	38,0	30,2-45,8
45 a 54	42,4	35,5-49,2	51,4	40,6-62,1	34,0	25,7-42,2
55 a 64	32,9	24,6-41,2	42,4	28,7-56,1	23,8	14,4-33,2
65 e mais	20,7	12,5-29,0	36,7	22,1-51,3	5,2	0,7-9,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	42,9	34,9-51,0	48,2	37,7-58,6	37,8	24,8-50,7
9 a 11	43,8	39,8-47,9	47,1	40,8-53,3	41,3	36,0-46,7
12 e mais	39,5	35,3-43,8	40,3	33,4-47,2	38,8	33,6-44,1
Total	42,8	37,4-48,2	47,2	39,9-54,4	38,8	30,5-47,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	34,0	17,0-51,0	21,3	8,6-33,9	45,3	19,8-70,8
25 a 34	15,2	7,9-22,5	17,8	3,9-31,7	12,8	7,2-18,3
35 a 44	18,7	13,4-23,9	23,0	14,2-31,8	14,7	9,0-20,3
45 a 54	10,7	6,5-14,9	14,8	7,1-22,5	6,9	3,3-10,4
55 a 64	10,4	4,5-16,3	13,0	3,4-22,6	7,9	0,9-15,0
65 e mais	6,5	1,2-11,7	13,1	2,8-23,4	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,3	13,8-30,8	19,6	11,6-27,6	24,9	10,5-39,4
9 a 11	16,3	13,2-19,3	19,9	14,7-25,0	13,5	9,9-17,0
12 e mais	8,6	5,8-11,3	10,3	5,4-15,1	7,0	4,2-9,8
Total	19,5	13,7-25,3	18,8	13,2-24,4	20,2	10,4-30,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	29,3	16,6-41,9	9,1	1,7-16,5	47,1	23,7-70,6
25 a 34	41,3	31,8-50,9	7,7	2,7-12,7	72,0	63,8-80,1
35 a 44	42,7	36,4-49,0	12,5	6,1-18,9	70,7	63,8-77,6
45 a 54	39,3	32,5-46,1	13,6	5,8-21,4	63,5	54,7-72,2
55 a 64	34,7	26,6-42,8	17,2	6,5-27,9	51,4	40,7-62,1
65 e mais	17,6	11,8-23,5	6,2	1,2-11,3	28,7	19,2-38,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	37,3	30,3-44,2	9,0	4,8-13,2	64,8	52,2-77,5
9 a 11	39,1	35,2-43,1	15,1	10,8-19,4	57,9	52,4-63,3
12 e mais	21,1	17,8-24,4	7,8	4,4-11,2	33,1	28,1-38,2
Total	36,2	31,5-40,8	10,3	7,2-13,3	59,9	52,0-67,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,0	9,9-34,0	27,4	10,3-44,6	17,1	1,2-33,0
25 a 34	16,4	9,3-23,6	26,6	12,3-40,9	7,2	2,5-11,8
35 a 44	19,5	14,2-24,8	29,6	20,3-38,9	10,1	5,5-14,8
45 a 54	13,1	8,6-17,6	21,8	13,5-30,1	5,0	1,3-8,6
55 a 64	4,3	1,0-7,6	8,1	1,6-14,7	0,6	0,3-1,6
65 e mais	3,4	0,1-7,0	7,0	0,2-14,2	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,1	10,1-22,1	23,8	14,5-33,2	8,5	1,4-15,6
9 a 11	16,6	13,5-19,8	23,9	18,6-29,2	11,0	7,3-14,7
12 e mais	19,1	15,6-22,6	28,7	22,5-35,0	10,4	7,2-13,5
Total	16,5	12,5-20,5	24,3	17,8-30,8	9,3	4,7-14,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,6	0,0-1,3	1,4	0,1-2,7	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,4	0,5-2,4	2,6	0,6-4,6	0,4	0,1-0,8
35 a 44	1,4	0,3-2,5	2,1	0,4-3,9	0,7	0,6-2,0
45 a 54	1,6	0,2-2,9	3,1	0,3-5,9	0,2	0,2-0,5
55 a 64	1,2	1,2-3,7	2,6	2,4-7,5	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,3	0,3-0,8	0,5	0,5-1,6	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,3	0,0-0,7	0,4	0,2-1,0	0,2	0,2-0,7
9 a 11	2,2	0,9-3,5	5,0	2,1-7,9	0,0	0,0-0,0
12 e mais	4,0	2,3-5,8	7,3	3,9-10,7	1,0	0,1-2,2
Total	1,1	0,7-1,6	2,1	1,2-3,0	0,3	0,0-0,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,2	0,2-2,1	0,8	0,3-2,0	1,5	0,1-3,0
25 a 34	2,3	0,2-4,3	0,8	0,8-2,5	3,6	0,0-7,2
35 a 44	5,8	2,4-9,3	1,4	0,0-2,8	9,9	3,7-16,2
45 a 54	9,8	5,4-14,2	7,5	2,3-12,8	11,9	5,0-18,7
55 a 64	14,0	7,1-20,9	18,9	6,5-31,3	9,3	3,5-15,0
65 e mais	12,1	6,6-17,7	9,4	1,1-17,8	14,7	7,4-22,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,0	4,0-7,9	4,0	2,0-6,0	7,9	4,6-11,3
9 a 11	3,3	1,8-4,8	2,7	0,2-5,3	3,7	1,9-5,6
12 e mais	2,3	0,8-3,8	1,9	0,3-4,2	2,6	0,7-4,5
Total	5,0	3,7-6,3	3,5	2,0-5,0	6,3	4,2-8,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	67,5	57,5-77,5	53,2	43,4-63,1
55 a 59	64,4	52,4-76,5	46,7	34,5-59,0
Anos de escolaridade				
0 a 8	59,8	50,4-69,3	45,6	36,2-54,9
9 a 11	86,7	78,7-94,7	63,9	52,2-75,7
12 e mais	95,7	89,7-100,0	80,9	67,4-94,5
Total	66,4	58,7-74,1	50,9	43,2-58,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	78,3	67,9-88,7	75,2	64,7-85,8
35 a 44	95,6	92,3-98,9	86,9	80,6-93,2
45 a 54	94,8	90,9-98,7	82,9	75,8-90,0
55 a 59	90,5	79,1-100,0	70,3	55,3-85,3
Anos de escolaridade				
0 a 8	84,7	76,7-92,7	76,1	67,7-84,5
9 a 11	91,3	87,7-94,9	85,1	80,8-89,4
12 e mais	93,5	90,4-96,6	90,2	86,5-93,8
Total	87,5	82,3-92,6	80,1	74,6-85,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	24,9	14,3-35,5	30,1	13,1-47,1	20,3	9,6-31,0
25 a 34	34,6	25,4-43,8	24,1	8,6-39,6	44,2	33,9-54,4
35 a 44	32,3	26,6-38,0	24,6	15,8-33,5	39,4	31,8-47,0
45 a 54	25,2	19,7-30,7	11,9	5,7-18,1	37,7	29,2-46,2
55 a 64	20,7	14,4-27,0	4,9	1,6-8,1	35,8	25,5-46,1
65 e mais	9,7	5,1-14,4	1,2	0,5-3,0	18,0	9,5-26,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,8	15,9-27,7	20,9	11,1-30,6	22,7	15,8-29,5
9 a 11	38,0	34,0-42,0	22,0	16,9-27,2	50,4	45,0-55,9
12 e mais	44,1	39,8-48,3	24,7	19,0-30,4	61,6	56,2-66,9
Total	27,9	23,7-32,1	21,5	14,7-28,2	33,8	28,1-39,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,5	0,9-15,9	1,3	0,1-2,4	13,1	2,5-28,6
25 a 34	14,1	7,3-20,8	10,4	0,7-20,1	17,4	8,4-26,4
35 a 44	23,4	17,8-29,1	24,4	15,1-33,6	22,6	15,9-29,2
45 a 54	37,7	31,0-44,5	28,8	19,7-37,9	46,1	37,0-55,3
55 a 64	49,0	40,3-57,7	38,4	25,1-51,8	59,1	48,7-69,6
65 e mais	62,5	53,5-71,4	58,3	43,7-72,9	66,5	56,2-76,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	26,7	21,1-32,4	20,1	13,8-26,4	33,2	23,9-42,6
9 a 11	12,6	10,3-14,9	11,4	7,9-14,8	13,6	10,5-16,7
12 e mais	17,6	14,4-20,9	19,4	14,2-24,6	16,1	12,0-20,2
Total	22,4	18,8-26,0	18,1	13,8-22,4	26,4	20,7-32,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,4	0,2-0,9	0,0	0,0-0,0	0,7	0,3-1,7
25 a 34	0,7	0,5-2,0	0,0	0,0-0,0	1,4	1,0-3,8
35 a 44	4,9	1,8-8,0	4,4	0,5-9,3	5,3	1,4-9,2
45 a 54	10,0	5,5-14,6	7,8	2,0-13,6	12,1	5,3-19,0
55 a 64	12,3	5,9-18,8	16,6	5,7-27,5	8,2	1,5-15,0
65 e mais	16,6	9,7-23,5	15,9	4,8-26,9	17,3	8,9-25,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,4	3,6-7,2	5,0	2,4-7,5	5,9	3,2-8,5
9 a 11	2,2	1,3-3,2	1,0	0,1-1,9	3,2	1,6-4,7
12 e mais	2,5	1,2-3,8	3,9	1,4-6,4	1,3	0,2-2,3
Total	4,4	3,2-5,6	4,0	2,3-5,7	4,7	3,0-6,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,0	3,1-11,1	0,6	0,6-1,8	7,0	6,2-20,2
25 a 34	3,1	1,2-7,4	4,5	3,5-12,6	1,8	1,7-5,4
35 a 44	1,1	0,0-2,3	0,0	0,0-0,0	2,2	0,1-4,4
45 a 54	2,8	0,3-5,2	1,4	1,3-4,2	4,0	0,1-7,9
55 a 64	6,4	1,7-11,1	10,4	1,4-19,3	2,6	0,2-5,3
65 e mais	10,8	4,9-16,7	9,1	0,9-17,4	12,4	4,1-20,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,1	1,5-8,6	3,7	0,1-7,3	6,4	0,4-12,4
9 a 11	1,0	0,2-1,8	1,5	0,2-3,1	0,7	0,0-1,3
12 e mais	0,3	0,1-0,8	0,5	0,5-1,4	0,2	0,2-0,6
Total	3,6	1,3-6,0	2,9	0,4-5,4	4,3	0,4-8,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,3	1,8-12,5	1,5	0,3-2,8	8,7	4,5-21,9
25 a 34	8,8	2,9-14,8	11,4	0,2-22,6	6,5	1,6-11,5
35 a 44	17,4	12,6-22,2	13,9	7,7-20,1	20,7	13,6-27,8
45 a 54	31,1	24,7-37,6	23,6	14,7-32,6	38,2	29,2-47,1
55 a 64	35,7	27,5-43,9	21,8	10,9-32,7	49,0	38,2-59,7
65 e mais	30,4	22,5-38,3	15,6	5,5-25,8	44,8	34,0-55,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,0	12,4-21,6	11,0	5,6-16,5	22,8	15,3-30,4
9 a 11	10,8	8,6-13,1	11,5	7,7-15,4	10,3	7,6-13,0
12 e mais	16,3	13,2-19,4	17,5	12,5-22,5	15,2	11,3-19,1
Total	15,4	12,4-18,5	11,8	7,9-15,6	18,8	14,1-23,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,2-0,6	0,0	0,0-0,0	0,4	0,4-1,1
25 a 34	0,1	0,1-0,3	0,0	0,0-0,0	0,2	0,2-0,5
35 a 44	2,6	0,5-4,6	2,7	0,3-5,7	2,5	0,3-5,4
45 a 54	4,1	1,8-6,4	4,1	0,2-8,0	4,1	1,5-6,6
55 a 64	14,2	9,0-19,4	2,6	0,5-5,7	25,4	16,3-34,4
65 e mais	22,6	15,6-29,6	0,0	0,0-0,0	44,6	33,7-55,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,3	3,0-5,6	1,2	0,1-2,3	7,3	4,8-9,8
9 a 11	1,9	1,0-2,8	1,5	0,1-2,8	2,2	1,0-3,4
12 e mais	1,8	0,7-3,0	0,9	0,3-2,0	2,7	0,8-4,6
Total	3,5	2,6-4,3	1,2	0,4-2,0	5,5	4,0-7,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,4	0,8-24,0	0,8	0,2-1,8	22,6	1,9-43,4
25 a 34	2,1	0,1-4,1	0,5	0,2-1,2	3,5	0,2-7,2
35 a 44	1,6	0,7-2,5	0,7	0,1-1,5	2,4	0,8-3,9
45 a 54	2,3	0,7-3,9	0,4	0,4-1,2	4,1	1,1-7,1
55 a 64	2,1	0,5-4,8	3,2	1,9-8,3	1,1	0,7-3,0
65 e mais	8,2	3,0-13,3	11,4	2,0-20,8	5,0	0,7-9,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,2	1,2-11,1	1,4	0,3-2,5	10,8	1,3-20,2
9 a 11	3,2	1,8-4,6	1,9	0,3-3,4	4,3	2,1-6,4
12 e mais	3,4	1,9-5,0	1,5	0,1-2,9	5,2	2,5-7,8
Total	5,2	1,8-8,5	1,5	0,7-2,4	8,5	2,4-14,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,1	11,2-28,9	23,4	10,5-36,4	17,1	5,6-28,5
25 a 34	19,7	13,1-26,4	18,7	7,4-30,1	20,7	13,5-27,8
35 a 44	26,6	21,6-31,5	25,0	17,5-32,5	28,1	21,6-34,6
45 a 54	35,0	28,7-41,4	30,7	21,6-39,9	39,1	30,4-47,8
55 a 64	32,9	25,1-40,7	28,2	16,5-40,0	37,3	27,3-47,4
65 e mais	37,6	28,9-46,2	20,7	9,1-32,4	53,9	43,0-64,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,6	12,0-21,3	15,2	8,1-22,3	18,0	11,8-24,3
9 a 11	31,9	28,2-35,6	32,7	26,9-38,5	31,2	26,4-36,0
12 e mais	65,2	61,0-69,4	60,3	53,5-67,2	69,6	64,5-74,6
Total	25,0	21,5-28,6	23,4	18,2-28,7	26,5	21,6-31,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	70,0	52,2-87,9
26 a 30	72,8	56,8-88,7
31 a 35	78,2	67,2-89,1
36 a 40	68,6	58,6-78,5
41 a 45	73,2	61,7-84,7
46 a 50	74,4	63,9-84,9
Anos de escolaridade		
0 a 8	74,6	62,8-86,3
9 a 11	69,1	63,5-74,7
12 e mais	67,9	62,3-73,5
Total	67,1	62,0-72,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,7	0,5-13,9	1,9	0,1-3,6	10,9	2,5-24,3
25 a 34	14,3	8,5-20,1	3,5	1,2-5,9	24,1	14,5-33,7
35 a 44	18,3	13,4-23,3	12,7	6,2-19,2	23,5	16,3-30,7
45 a 54	18,0	12,6-23,4	12,8	5,9-19,6	23,0	14,9-31,0
55 a 64	13,6	7,6-19,5	9,2	0,8-19,2	17,7	10,8-24,7
65 e mais	9,5	4,8-14,1	3,4	1,8-8,7	15,4	8,0-22,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,9	9,6-18,2	5,6	2,9-8,3	22,0	14,0-30,0
9 a 11	10,7	8,3-13,1	7,6	4,3-10,9	13,2	9,7-16,6
12 e mais	14,4	11,3-17,4	9,9	5,5-14,2	18,4	14,3-22,6
Total	13,1	10,2-16,0	6,4	4,4-8,5	19,3	14,2-24,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,9	5,4-57,1	51,5	7,5-95,5	22,0	8,8-52,7
25 a 34	81,1	65,8-96,4	79,4	57,7-100,0	81,3	64,3-98,4
35 a 44	90,7	81,5-100,0	0,0	0,0-0,0	86,1	72,6-99,5
45 a 54	89,8	81,2-98,5	88,7	72,8-100,0	90,4	80,2-100,0
55 a 64	73,8	49,9-100,0	58,3	0,9-100,0	81,5	65,9-100,0
65 e mais	86,3	73,1-100,0	0,0	0,0-0,0	83,3	67,7-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	76,6	58,2-95,1	90,4	76,8-100,0	73,2	51,2-95,3
9 a 11	76,2	65,2-87,2	82,4	66,3-98,5	73,4	59,5-87,3
12 e mais	85,5	76,6-94,5	78,1	56,4-99,8	89,1	81,5-96,7
Total	77,5	64,3-90,6	86,5	76,8-96,2	74,7	58,3-91,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Rio de Janeiro

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,5	7,6-25,5	21,1	6,8-35,3	12,1	1,4-22,8
25 a 34	20,8	12,7-28,9	25,5	11,2-39,8	16,4	8,9-24,0
35 a 44	15,4	11,2-19,6	16,2	9,7-22,6	14,7	9,2-20,2
45 a 54	19,0	14,6-23,4	15,3	8,8-21,8	22,0	16,1-27,9
55 a 64	18,2	13,2-23,2	21,0	12,4-29,5	16,1	10,2-22,0
65 e mais	7,3	3,8-10,7	11,1	3,8-18,3	5,0	1,7-8,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,7	14,7-24,6	23,8	14,8-32,9	16,4	11,4-21,4
9 a 11	14,0	11,1-16,9	13,4	9,1-17,6	14,5	10,6-18,4
12 e mais	12,9	9,9-15,9	16,0	10,8-21,3	10,0	6,8-13,2
Total	16,6	13,9-19,4	19,0	14,2-23,9	14,6	11,7-17,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,5	1,1-10,0	8,8	0,2-17,3	2,4	0,2-4,7
25 a 34	8,8	4,0-13,6	11,0	2,0-20,1	6,7	2,9-10,6
35 a 44	17,0	12,6-21,4	16,0	9,2-22,7	18,0	12,2-23,7
45 a 54	36,3	30,5-42,0	42,6	33,1-52,1	31,1	24,4-37,8
55 a 64	36,4	29,7-43,1	51,1	40,0-62,3	25,1	17,5-32,7
65 e mais	37,4	31,5-43,3	58,8	48,0-69,5	24,4	18,4-30,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,6	19,6-27,7	31,2	23,5-38,9	17,6	13,6-21,6
9 a 11	16,4	13,6-19,2	17,7	13,3-22,2	15,3	11,7-18,8
12 e mais	21,8	18,2-25,4	25,4	19,5-31,3	18,5	14,2-22,7
Total	21,1	18,8-23,4	25,9	21,8-30,1	17,1	14,7-19,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,6	1,2-16,0	12,1	0,8-25,1	5,2	1,8-12,1
25 a 34	4,8	1,7-7,9	5,3	0,2-10,3	4,4	0,7-8,1
35 a 44	4,9	2,3-7,5	6,1	2,0-10,3	3,9	0,6-7,2
45 a 54	6,2	3,5-8,9	4,8	1,4-8,2	7,3	3,3-11,3
55 a 64	7,3	3,9-10,7	12,2	5,4-19,1	3,5	0,7-6,3
65 e mais	4,6	1,6-7,6	8,2	1,4-14,9	2,4	0,1-4,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,2	5,0-11,4	11,6	5,6-17,7	5,5	2,4-8,5
9 a 11	3,6	2,1-5,1	3,5	1,3-5,6	3,7	1,6-5,7
12 e mais	4,0	2,4-5,6	4,6	2,0-7,1	3,4	1,4-5,4
Total	6,0	4,3-7,7	7,7	4,6-10,8	4,5	2,8-6,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	49,9	39,5-60,3	51,2	35,8-66,6	48,7	34,6-62,7
25 a 34	50,0	41,9-58,0	55,0	42,4-67,5	45,4	35,7-55,0
35 a 44	36,8	31,1-42,5	35,6	26,5-44,6	37,8	30,7-45,0
45 a 54	38,8	32,9-44,7	50,5	40,9-60,0	29,3	22,8-35,8
55 a 64	29,0	22,4-35,5	31,3	20,3-42,2	27,2	19,2-35,1
65 e mais	20,2	15,5-25,0	18,5	10,0-27,0	21,3	15,6-26,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	39,6	34,0-45,1	45,8	36,4-55,2	34,6	28,2-41,0
9 a 11	41,7	37,5-45,9	45,4	38,7-52,0	38,6	33,2-44,0
12 e mais	35,1	30,7-39,5	34,0	27,1-40,8	36,2	30,6-41,8
Total	39,3	36,1-42,5	43,1	37,9-48,4	36,1	32,3-39,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	24,5	15,8-33,2	19,2	10,8-27,6	30,5	15,6-45,3
25 a 34	39,5	31,7-47,3	40,7	28,2-53,2	38,2	28,9-47,5
35 a 44	46,6	40,4-52,8	55,8	45,8-65,8	37,8	30,3-45,2
45 a 54	51,5	45,4-57,5	60,7	51,3-70,1	43,8	36,4-51,3
55 a 64	58,1	51,0-65,2	56,0	44,7-67,3	59,9	51,0-68,8
65 e mais	50,5	44,2-56,8	46,7	35,5-57,9	53,0	45,7-60,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	43,6	37,9-49,3	37,8	29,1-46,4	49,1	41,9-56,3
9 a 11	43,2	39,0-47,5	48,7	42,0-55,3	38,5	33,1-43,9
12 e mais	44,7	40,2-49,3	56,9	49,9-63,8	33,1	27,7-38,5
Total	43,8	40,6-46,9	45,2	40,2-50,3	42,4	38,4-46,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,9	0,8-5,0	3,0	0,0-6,0	2,8	0,1-5,7
25 a 34	10,4	5,2-15,7	10,2	1,1-19,2	10,7	5,3-16,1
35 a 44	13,0	8,7-17,4	14,0	7,0-21,0	12,1	6,8-17,4
45 a 54	16,8	12,1-21,5	20,5	12,4-28,6	13,7	8,4-19,1
55 a 64	21,2	15,4-27,1	17,1	8,3-26,0	24,7	17,0-32,5
65 e mais	17,6	12,5-22,8	13,6	4,6-22,7	20,4	14,3-26,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,0	11,4-18,7	13,8	7,7-19,9	16,2	11,9-20,4
9 a 11	11,2	8,6-13,8	10,9	7,1-14,8	11,4	7,9-14,8
12 e mais	10,1	7,5-12,7	11,0	6,8-15,2	9,2	6,1-12,3
Total	12,8	10,8-14,8	12,3	9,1-15,6	13,2	10,9-15,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,5	10,9-28,2	9,2	4,0-14,4	29,5	14,9-44,1
25 a 34	27,4	20,7-34,2	20,7	11,3-30,1	33,6	24,4-42,8
35 a 44	30,0	24,6-35,4	23,2	14,9-31,5	35,9	29,0-42,9
45 a 54	34,3	28,8-39,7	28,0	19,6-36,3	39,4	32,3-46,4
55 a 64	31,4	25,3-37,5	17,5	10,0-25,0	42,0	33,5-50,5
65 e mais	44,5	38,8-50,3	34,1	24,3-43,8	50,9	44,1-57,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	27,4	22,8-32,1	16,9	10,9-22,9	35,8	29,5-42,2
9 a 11	29,0	25,3-32,7	20,4	15,4-25,3	36,2	31,0-41,5
12 e mais	39,4	35,1-43,8	32,8	26,3-39,3	45,6	40,0-51,3
Total	30,3	27,6-33,1	21,3	17,7-25,0	37,8	34,1-41,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,3	7,7-24,9	6,3	2,0-10,5	26,1	11,3-40,8
25 a 34	20,7	14,4-27,0	17,6	8,5-26,7	23,5	14,9-32,1
35 a 44	20,4	15,8-25,1	16,2	9,3-23,0	24,1	17,9-30,3
45 a 54	19,6	15,3-24,0	15,5	8,9-22,2	23,0	17,2-28,8
55 a 64	17,0	12,4-21,6	7,6	2,7-12,5	24,2	17,3-31,1
65 e mais	26,3	21,3-31,3	23,5	14,8-32,3	28,0	22,0-33,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,9	13,6-22,2	12,1	6,9-17,3	22,4	16,2-28,7
9 a 11	20,5	17,1-23,8	15,8	11,2-20,4	24,4	19,7-29,1
12 e mais	24,7	20,9-28,4	17,7	12,3-23,1	31,2	26,1-36,2
Total	20,0	17,5-22,5	14,4	11,3-17,6	24,7	21,1-28,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	39,5	29,2-49,9	50,9	35,5-66,2	28,6	15,5-41,7
25 a 34	34,6	26,5-42,7	39,8	26,4-53,1	29,8	20,6-38,9
35 a 44	27,1	21,7-32,5	38,5	29,2-47,8	17,3	11,6-23,0
45 a 54	27,4	22,0-32,9	37,0	27,7-46,3	19,6	13,5-25,7
55 a 64	27,9	21,4-34,5	32,4	21,4-43,3	24,5	16,6-32,5
65 e mais	15,9	11,2-20,7	24,8	14,7-34,9	10,6	6,3-14,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	32,6	27,1-38,0	43,2	33,8-52,5	24,2	18,2-30,1
9 a 11	28,6	24,7-32,5	36,0	29,7-42,4	22,3	17,6-27,1
12 e mais	23,7	19,7-27,7	32,7	25,9-39,5	15,4	11,4-19,4
Total	29,6	26,5-32,7	38,8	33,6-44,0	21,9	18,5-25,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	62,3	52,4-72,3	77,6	67,1-88,2	47,5	33,6-61,5
25 a 34	59,8	52,1-67,6	64,2	52,1-76,2	55,9	46,3-65,5
35 a 44	47,9	41,9-54,0	50,7	41,0-60,4	45,6	38,2-52,9
45 a 54	42,0	36,1-47,9	43,9	34,3-53,4	40,5	33,2-47,7
55 a 64	48,3	41,4-55,2	48,4	37,3-59,5	48,2	39,5-57,0
65 e mais	42,8	36,9-48,6	46,8	35,9-57,8	40,3	33,7-47,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	53,3	47,9-58,7	60,6	52,0-69,2	47,5	41,1-54,0
9 a 11	57,1	52,9-61,2	59,8	53,4-66,3	54,7	49,3-60,2
12 e mais	38,4	33,9-42,8	45,0	38,0-52,0	32,1	26,7-37,6
Total	51,4	48,3-54,6	57,0	52,1-62,0	46,7	42,9-50,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	46,1	35,6-56,6	51,4	36,1-66,7	41,0	27,0-54,9
25 a 34	34,9	26,9-42,9	41,7	28,4-54,9	28,6	19,8-37,5
35 a 44	21,3	16,5-26,1	24,5	16,6-32,4	18,6	12,8-24,3
45 a 54	24,7	19,4-30,1	27,9	19,2-36,6	22,1	15,6-28,7
55 a 64	17,6	12,0-23,2	17,0	8,5-25,4	18,2	10,7-25,6
65 e mais	12,2	8,5-15,9	13,1	6,0-20,2	11,7	7,5-15,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,1	23,6-34,6	32,7	23,1-42,2	26,3	20,1-32,4
9 a 11	28,5	24,5-32,5	33,0	26,7-39,2	24,7	19,7-29,8
12 e mais	22,3	18,4-26,3	29,2	22,6-35,9	15,9	11,7-20,2
Total	27,6	24,4-30,7	32,0	26,8-37,3	23,8	20,2-27,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,0	10,7-25,4	28,5	15,2-41,8	7,9	3,2-12,7
25 a 34	16,9	10,9-22,9	23,0	11,9-34,0	11,2	6,3-16,2
35 a 44	14,8	10,5-19,0	14,2	7,2-21,2	15,3	10,2-20,5
45 a 54	12,9	9,4-16,4	10,7	5,6-15,8	14,7	10,0-19,4
55 a 64	19,1	13,4-24,7	20,0	10,2-29,7	18,4	11,8-25,0
65 e mais	12,1	8,3-16,0	17,7	9,5-26,0	8,7	5,3-12,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,8	9,1-16,6	17,2	9,6-24,7	9,4	6,5-12,3
9 a 11	17,8	14,5-21,0	20,1	14,7-25,4	15,8	11,8-19,8
12 e mais	19,3	15,8-22,8	22,9	17,1-28,6	16,0	12,0-20,0
Total	15,6	13,4-17,9	19,3	15,1-23,4	12,6	10,5-14,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	42,9	32,4-53,4	47,4	32,0-62,8	38,6	24,0-53,1
25 a 34	49,1	41,0-57,1	58,3	45,8-70,8	40,5	31,0-50,1
35 a 44	48,4	42,4-54,5	63,4	54,5-72,3	35,5	28,5-42,5
45 a 54	46,9	41,0-52,9	55,6	46,2-65,0	39,9	32,6-47,1
55 a 64	36,3	29,4-43,1	47,9	36,7-59,2	27,4	19,5-35,2
65 e mais	12,3	8,5-16,2	21,3	12,9-29,7	6,9	3,6-10,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	43,1	37,5-48,7	55,7	46,6-64,8	33,2	26,6-39,7
9 a 11	42,1	37,9-46,3	56,1	49,6-62,6	30,2	25,2-35,3
12 e mais	36,6	32,2-41,0	37,8	31,0-44,7	35,5	29,9-41,1
Total	41,5	38,3-44,7	52,0	46,9-57,1	32,7	28,9-36,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,8	5,6-20,0	16,1	4,9-27,3	9,6	0,6-18,6
25 a 34	12,6	5,7-19,5	14,8	2,1-27,6	10,6	5,0-16,2
35 a 44	10,5	6,9-14,1	12,1	5,9-18,3	9,1	5,2-13,0
45 a 54	11,2	7,7-14,7	11,3	5,6-16,9	11,1	6,7-15,6
55 a 64	8,6	4,0-13,2	14,3	5,0-23,7	4,2	1,0-7,4
65 e mais	2,6	1,0-4,1	3,0	0,1-6,2	2,3	0,6-4,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,4	6,4-14,5	14,2	6,5-21,9	7,4	3,7-11,1
9 a 11	11,3	8,7-14,0	12,3	8,0-16,6	10,6	7,3-13,8
12 e mais	8,3	5,6-11,0	9,5	5,1-13,9	7,2	3,9-10,4
Total	10,3	8,0-12,5	12,6	8,5-16,7	8,3	6,1-10,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	31,7	21,4-42,0	15,0	2,6-27,5	47,8	33,6-62,1
25 a 34	36,3	28,9-43,6	12,6	5,0-20,2	58,0	48,5-67,6
35 a 44	42,2	36,4-48,0	9,0	3,9-14,1	70,9	64,5-77,2
45 a 54	42,2	36,4-48,0	13,2	7,4-19,0	65,7	59,0-72,4
55 a 64	43,1	36,3-49,9	19,3	11,3-27,4	61,2	52,9-69,6
65 e mais	30,9	25,7-36,1	16,6	9,1-24,1	39,6	33,0-46,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,2	40,8-51,6	16,7	10,2-23,2	69,6	63,6-75,7
9 a 11	36,4	32,5-40,3	12,0	8,2-15,8	57,0	51,4-62,6
12 e mais	18,9	15,6-22,2	8,3	4,8-11,7	28,8	23,6-33,9
Total	37,8	34,7-40,8	13,5	10,0-16,9	58,0	54,3-61,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	27,7	17,7-37,7	25,1	12,1-38,2	30,3	15,4-45,1
25 a 34	25,9	17,8-34,0	40,0	26,4-53,7	12,9	6,7-19,2
35 a 44	21,2	16,3-26,0	33,0	24,2-41,8	11,0	6,4-15,5
45 a 54	22,3	17,5-27,1	32,8	24,1-41,6	13,7	8,9-18,5
55 a 64	11,3	7,2-15,4	13,2	6,1-20,2	9,8	5,0-14,6
65 e mais	5,6	2,7-8,5	9,3	2,5-16,0	3,4	1,2-5,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,4	15,2-25,7	27,0	18,0-36,0	15,2	9,3-21,2
9 a 11	19,5	16,1-22,9	28,7	22,8-34,7	11,7	8,1-15,3
12 e mais	22,1	18,2-26,0	31,9	25,3-38,5	12,9	9,0-16,9
Total	20,5	17,6-23,4	28,6	23,6-33,5	13,7	10,4-17,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,9	0,2-2,0	1,9	0,4-4,2	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,4	0,3-2,5	2,9	0,6-5,3	0,0	0,0-0,0
35 a 44	2,4	0,6-4,1	4,7	1,0-8,4	0,3	0,3-1,0
45 a 54	1,3	0,0-2,7	2,8	0,2-5,8	0,1	0,1-0,3
55 a 64	0,6	0,3-1,5	1,0	1,0-3,0	0,3	0,3-1,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,8	0,1-1,5	1,5	0,0-3,1	0,1	0,1-0,4
9 a 11	1,2	0,3-2,1	2,6	0,6-4,6	0,0	0,0-0,0
12 e mais	2,5	1,1-4,0	5,0	2,0-8,0	0,3	0,1-0,7
Total	1,3	0,7-1,8	2,6	1,4-3,8	0,1	0,0-0,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,9	0,8-10,7	2,9	0,9-6,6	6,9	3,7-17,5
25 a 34	3,1	0,1-6,3	2,2	1,3-5,6	3,9	1,3-9,1
35 a 44	2,1	0,5-3,7	1,1	0,4-2,5	3,0	0,3-5,6
45 a 54	6,0	2,9-9,2	3,0	0,8-6,8	8,5	3,7-13,2
55 a 64	3,5	1,1-5,8	2,6	0,0-5,2	4,1	0,5-7,8
65 e mais	7,2	4,3-10,1	2,8	0,1-5,7	9,9	5,7-14,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,6	3,0-8,2	1,6	0,4-3,6	8,8	4,4-13,2
9 a 11	2,8	1,2-4,4	2,6	0,1-5,1	2,9	0,9-5,0
12 e mais	3,0	1,5-4,5	3,6	1,1-6,1	2,5	0,8-4,1
Total	4,2	2,8-5,7	2,3	1,0-3,6	5,8	3,5-8,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	75,7	68,6-82,9	63,9	56,2-71,5
55 a 59	87,1	81,4-92,7	66,6	58,0-75,2
Anos de escolaridade				
0 a 8	75,5	68,3-82,6	59,3	51,3-67,3
9 a 11	82,1	74,2-89,9	66,6	57,0-76,2
12 e mais	97,1	93,5-100,0	86,8	79,8-93,8
Total	80,0	75,0-85,1	64,9	59,1-70,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	76,7	68,0-85,3	75,1	66,3-83,8
35 a 44	86,6	80,8-92,4	84,6	78,6-90,6
45 a 54	88,6	83,2-93,9	81,6	75,3-87,9
55 a 59	89,1	82,3-95,9	76,3	66,1-86,4
Anos de escolaridade				
0 a 8	80,7	74,0-87,5	75,8	68,7-82,9
9 a 11	84,7	79,5-89,8	79,0	73,4-84,7
12 e mais	90,7	86,5-95,0	89,7	85,4-94,1
Total	84,2	80,5-87,9	79,9	76,0-83,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,7	13,1-24,3	12,2	5,6-18,9	25,0	16,0-34,0
25 a 34	27,8	21,4-34,2	19,1	10,7-27,5	35,9	26,9-44,8
35 a 44	34,0	28,8-39,3	18,9	12,4-25,5	47,1	39,8-54,4
45 a 54	30,9	25,7-36,1	24,9	16,8-32,9	35,8	29,1-42,6
55 a 64	24,0	18,5-29,5	16,5	8,5-24,4	29,7	22,2-37,2
65 e mais	20,0	15,8-24,2	11,0	5,7-16,3	25,4	19,7-31,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,6	11,3-17,9	7,6	3,4-11,8	20,1	15,4-24,8
9 a 11	30,6	26,8-34,4	19,2	14,1-24,3	40,2	34,8-45,6
12 e mais	50,8	46,3-55,3	38,0	31,2-44,9	62,8	57,1-68,4
Total	26,7	24,3-29,1	17,6	14,4-20,8	34,2	30,9-37,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,5	1,5-13,5	2,1	0,1-4,2	12,7	1,6-23,8
25 a 34	14,6	6,8-22,5	14,1	0,0-28,1	15,1	7,4-22,9
35 a 44	23,6	18,5-28,7	18,9	11,8-26,1	27,6	20,6-34,6
45 a 54	37,9	32,2-43,7	34,2	25,3-43,2	41,0	33,7-48,3
55 a 64	54,3	47,4-61,2	44,7	33,6-55,7	61,7	53,4-70,0
65 e mais	62,6	56,9-68,3	52,9	41,9-63,8	68,5	62,3-74,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	38,5	33,4-43,5	26,0	18,0-34,1	48,3	41,9-54,8
9 a 11	21,2	18,1-24,3	20,7	16,0-25,3	21,6	17,4-25,7
12 e mais	19,5	16,1-22,9	21,1	15,5-26,6	18,1	14,0-22,1
Total	29,5	26,7-32,3	23,4	19,0-27,7	34,6	31,0-38,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,0	0,2-2,1	1,2	0,6-2,9	0,8	0,7-2,3
25 a 34	0,9	0,2-2,0	0,0	0,0-0,0	1,8	0,4-3,9
35 a 44	2,8	0,9-4,7	0,7	0,3-1,8	4,6	1,3-7,9
45 a 54	9,2	5,5-12,8	8,4	2,6-14,2	9,8	5,2-14,3
55 a 64	14,2	9,6-18,8	13,9	6,8-21,0	14,4	8,4-20,4
65 e mais	21,2	16,0-26,4	18,1	8,1-28,1	23,1	17,3-29,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,6	6,4-10,8	6,1	2,8-9,4	10,5	7,6-13,5
9 a 11	5,4	3,9-6,9	4,4	2,4-6,4	6,2	4,0-8,4
12 e mais	3,9	2,3-5,5	3,6	1,3-5,9	4,2	2,0-6,4
Total	6,7	5,5-7,9	5,1	3,3-6,8	8,0	6,4-9,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,6	0,3-1,4	1,2	0,6-2,9	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,8	0,8-4,4	0,0	0,0-0,0	3,4	1,5-8,3
35 a 44	0,5	0,1-1,0	0,3	0,3-0,9	0,6	0,3-1,6
45 a 54	5,1	2,0-8,2	7,5	1,6-13,5	3,1	0,5-5,7
55 a 64	10,7	5,9-15,5	13,1	4,6-21,7	8,8	3,5-14,1
65 e mais	13,4	9,1-17,8	14,6	5,9-23,2	12,7	8,2-17,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,3	4,2-8,4	6,1	2,8-9,5	6,5	3,7-9,2
9 a 11	2,4	1,4-3,3	2,9	1,3-4,6	1,9	0,7-3,0
12 e mais	2,0	0,8-3,3	2,4	0,4-4,5	1,7	0,2-3,1
Total	4,3	3,2-5,4	4,4	2,6-6,1	4,2	2,7-5,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,1	0,6-3,7	1,4	0,4-3,2	2,8	0,3-5,4
25 a 34	6,1	1,7-10,5	7,8	0,7-16,3	4,6	1,7-7,4
35 a 44	13,1	9,5-16,7	14,0	8,2-19,9	12,3	7,9-16,7
45 a 54	23,1	18,1-28,1	24,3	16,2-32,5	22,1	16,0-28,2
55 a 64	36,3	29,8-42,8	32,2	22,2-42,1	39,4	31,0-47,9
65 e mais	41,8	36,0-47,6	24,1	14,7-33,6	52,4	45,7-59,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,1	14,8-21,4	12,3	7,0-17,6	22,6	18,4-26,9
9 a 11	13,4	10,9-15,9	11,2	7,7-14,8	15,2	11,7-18,7
12 e mais	21,9	18,1-25,7	25,6	19,2-32,0	18,5	14,3-22,7
Total	17,5	15,5-19,4	14,9	11,7-18,0	19,6	17,2-22,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,2-0,6	0,4	0,4-1,1	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,1	0,1-0,4	0,0	0,0-0,0	0,3	0,3-0,8
35 a 44	1,1	0,2-2,4	1,1	0,4-2,5	1,2	0,9-3,2
45 a 54	7,4	4,1-10,6	3,7	0,2-7,5	10,4	5,4-15,3
55 a 64	11,7	7,5-15,9	2,9	1,6-7,4	18,5	12,0-24,9
65 e mais	24,3	19,1-29,5	10,2	2,4-18,1	32,8	26,3-39,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,9	6,8-11,0	2,9	0,6-5,2	13,7	10,5-17,0
9 a 11	2,1	1,2-3,0	1,4	0,1-2,7	2,7	1,4-4,0
12 e mais	3,7	2,3-5,2	2,1	0,4-3,8	5,3	3,0-7,5
Total	5,8	4,8-6,9	2,3	1,0-3,5	8,8	7,1-10,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,9	5,4-20,5	3,8	0,5-7,2	21,7	8,3-35,1
25 a 34	6,4	2,5-10,2	4,6	0,7-9,8	8,0	2,5-13,6
35 a 44	5,4	1,4-9,4	7,7	0,2-15,6	3,4	1,0-5,8
45 a 54	4,5	1,7-7,2	3,3	0,6-7,2	5,4	1,5-9,3
55 a 64	5,4	1,6-9,2	10,6	2,3-18,9	1,4	0,1-2,7
65 e mais	5,3	2,9-7,6	5,0	1,3-8,8	5,4	2,4-8,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,9	3,4-10,3	5,2	0,7-9,7	8,3	3,3-13,3
9 a 11	7,0	4,6-9,3	5,0	2,2-7,9	8,6	5,1-12,1
12 e mais	6,0	3,8-8,2	7,2	3,4-11,0	4,9	2,5-7,2
Total	6,7	4,8-8,6	5,6	3,1-8,1	7,7	4,9-10,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	36,9	28,0-45,8	35,6	22,1-49,0	38,2	26,4-50,0
25 a 34	47,2	39,3-55,1	38,9	27,6-50,1	54,9	45,2-64,5
35 a 44	44,2	38,3-50,0	48,3	38,5-58,1	40,6	33,7-47,6
45 a 54	46,5	40,7-52,4	43,9	34,5-53,2	48,7	41,4-56,1
55 a 64	44,5	37,7-51,3	45,2	34,1-56,2	44,0	35,5-52,5
65 e mais	56,2	50,3-62,1	57,5	46,5-68,5	55,4	48,7-62,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	27,7	23,2-32,1	24,6	17,5-31,8	30,1	24,5-35,7
9 a 11	51,4	47,1-55,6	50,1	43,5-56,7	52,4	46,9-57,9
12 e mais	81,3	77,6-85,0	78,5	72,5-84,4	83,9	79,5-88,3
Total	45,5	42,5-48,6	43,7	38,8-48,6	47,1	43,2-50,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	64,5	52,5-76,5
26 a 30	68,5	55,9-81,1
31 a 35	80,4	70,4-90,4
36 a 40	74,3	65,3-83,4
41 a 45	62,8	51,1-74,5
46 a 50	57,1	46,5-67,6
Anos de escolaridade		
0 a 8	65,2	54,9-75,4
9 a 11	66,5	60,1-72,9
12 e mais	71,7	65,6-77,8
Total	68,2	63,2-73,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,2	4,7-17,6	6,1	4,0-16,3	16,0	7,6-24,4
25 a 34	12,8	8,6-17,0	9,6	4,7-14,4	15,8	9,2-22,3
35 a 44	13,6	9,7-17,6	7,0	2,6-11,3	19,5	13,3-25,6
45 a 54	17,2	12,7-21,6	10,9	4,9-17,0	22,2	16,0-28,4
55 a 64	12,4	8,4-16,4	5,5	1,8-9,2	17,7	11,4-23,9
65 e mais	13,5	9,6-17,4	8,4	2,2-14,6	16,5	11,5-21,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,3	9,1-15,5	6,7	2,0-11,4	16,8	12,3-21,2
9 a 11	13,6	10,8-16,4	8,2	4,9-11,5	18,2	14,0-22,4
12 e mais	16,1	12,8-19,4	10,9	6,6-15,3	20,9	16,1-25,7
Total	13,5	11,5-15,4	8,0	5,4-10,7	18,0	15,2-20,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	79,8	62,6-97,0	87,7	57,5-100,0	76,9	58,1-95,7
25 a 34	66,8	48,5-85,1	84,9	67,8-100,0	56,7	32,9-80,4
35 a 44	68,6	53,9-83,3	54,4	21,8-87,1	73,0	57,2-88,8
45 a 54	82,2	71,0-93,4	0,0	0,0-0,0	75,1	60,3-89,8
55 a 64	80,6	67,5-100,0	79,6	45,6-100,0	80,8	66,8-100,0
65 e mais	81,8	69,2-100,0	81,6	56,3-100,0	81,9	67,4-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	72,8	60,8-84,7	83,4	63,3-100,0	69,4	55,8-83,1
9 a 11	75,8	66,3-85,4	82,9	66,6-99,3	73,1	61,5-84,6
12 e mais	80,6	70,6-90,6	80,0	62,0-98,0	80,9	69,0-92,9
Total	75,6	69,0-82,2	82,3	71,3-93,2	73,1	65,2-81,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,8	3,3-12,4	7,8	2,4-13,2	7,8	0,7-14,9
25 a 34	9,9	4,9-14,8	14,8	5,5-24,1	5,6	1,4-9,7
35 a 44	10,2	6,1-14,3	14,4	6,8-21,9	6,6	2,9-10,3
45 a 54	14,7	10,2-19,2	15,7	9,0-22,5	13,8	7,9-19,8
55 a 64	10,4	5,8-15,1	11,4	4,3-18,5	9,7	3,6-15,8
65 e mais	8,0	3,7-12,4	5,9	0,3-12,0	9,3	3,4-15,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,1	9,4-16,8	15,9	9,8-22,0	10,7	6,3-15,0
9 a 11	5,9	4,1-7,8	7,2	4,2-10,1	5,0	2,7-7,3
12 e mais	8,7	5,9-11,5	11,4	6,4-16,5	6,4	3,6-9,2
Total	10,0	7,9-12,1	12,4	8,9-15,9	8,1	5,7-10,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	9,8	4,2-15,4	11,8	3,8-19,9	7,9	0,1-15,8
25 a 34	14,3	9,2-19,3	16,6	8,4-24,8	12,2	6,0-18,5
35 a 44	17,6	13,2-22,1	18,9	12,0-25,8	16,5	10,7-22,3
45 a 54	33,2	27,0-39,5	38,4	28,2-48,7	28,8	21,6-36,1
55 a 64	35,3	27,9-42,7	52,4	40,5-64,2	23,0	14,9-31,0
65 e mais	39,0	31,2-46,9	56,5	42,1-70,9	29,3	20,7-37,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	24,0	19,6-28,4	27,7	20,9-34,5	20,7	15,1-26,4
9 a 11	15,0	12,5-17,6	17,5	13,3-21,7	13,2	10,1-16,3
12 e mais	14,9	11,4-18,5	21,3	14,8-27,8	9,6	6,3-13,0
Total	19,7	17,2-22,2	23,5	19,5-27,5	16,6	13,5-19,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,2	0,8-3,2	0,4	0,4-1,2	1,9	1,8-5,7
25 a 34	1,0	0,3-2,3	0,8	0,8-2,3	1,3	0,8-3,3
35 a 44	4,3	0,9-7,6	7,6	0,8-14,4	1,4	0,3-3,1
45 a 54	2,8	0,8-4,7	3,2	0,4-5,9	2,5	0,3-5,2
55 a 64	2,1	0,3-3,8	3,3	0,3-6,9	1,1	0,5-2,7
65 e mais	1,3	0,4-3,0	2,8	1,8-7,4	0,4	0,3-1,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,0	1,2-4,8	3,7	0,8-6,7	2,4	0,2-4,6
9 a 11	0,9	0,2-1,6	1,8	0,2-3,4	0,3	0,0-0,5
12 e mais	1,7	0,5-2,8	1,4	0,2-3,0	1,9	0,3-3,5
Total	2,1	1,1-3,1	2,8	1,1-4,5	1,5	0,4-2,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	42,7	33,8-51,5	46,9	35,0-58,8	38,8	26,4-51,2
25 a 34	36,9	30,2-43,6	41,7	30,6-52,7	32,7	25,0-40,5
35 a 44	33,0	27,3-38,6	41,6	32,3-50,9	25,6	19,2-32,0
45 a 54	28,0	22,0-33,9	27,0	17,1-36,8	28,8	21,5-36,1
55 a 64	27,3	20,5-34,1	26,0	15,8-36,2	28,2	19,1-37,2
65 e mais	16,9	10,8-22,9	11,9	2,1-21,7	19,6	11,9-27,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	36,1	30,6-41,6	44,8	36,4-53,1	28,5	21,8-35,1
9 a 11	33,6	29,9-37,3	33,6	28,0-39,2	33,6	28,7-38,5
12 e mais	27,2	22,8-31,5	22,5	15,9-29,0	31,1	25,4-36,8
Total	34,2	31,0-37,4	38,3	33,2-43,4	30,7	26,8-34,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,4	12,7-26,2	22,0	12,5-31,6	16,9	7,3-26,4
25 a 34	44,7	37,6-51,9	44,7	33,5-55,8	44,8	35,8-53,9
35 a 44	42,9	37,0-48,9	45,4	36,2-54,6	40,5	32,8-48,2
45 a 54	52,1	45,4-58,7	47,8	37,7-58,0	56,2	47,7-64,7
55 a 64	52,8	44,7-60,9	58,1	46,3-69,9	47,8	36,9-58,7
65 e mais	57,4	48,6-66,2	53,3	38,7-67,9	60,5	49,5-71,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	43,2	37,3-49,2	36,1	28,1-44,0	51,5	42,6-60,5
9 a 11	39,3	35,6-43,1	46,3	40,5-52,2	33,6	28,8-38,4
12 e mais	38,3	33,4-43,1	50,1	42,1-58,2	28,1	22,8-33,5
Total	41,0	37,8-44,2	41,5	36,7-46,3	40,5	36,2-44,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,4	0,5-7,2	1,0	0,2-2,3	5,7	1,7-13,1
25 a 34	11,7	6,8-16,7	9,4	2,5-16,3	14,0	7,0-21,0
35 a 44	13,1	9,1-17,0	12,4	6,9-18,0	13,7	8,2-19,2
45 a 54	18,7	13,6-23,9	13,3	6,6-20,1	24,0	16,5-31,5
55 a 64	19,4	13,1-25,8	13,1	5,7-20,5	25,4	15,6-35,3
65 e mais	18,8	12,2-25,3	12,5	3,9-21,1	23,6	14,3-32,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,7	9,9-17,6	6,7	2,6-10,8	21,8	15,2-28,5
9 a 11	11,7	9,2-14,1	13,5	9,5-17,5	10,2	7,2-13,1
12 e mais	8,0	5,5-10,5	7,0	3,3-10,7	8,8	5,4-12,1
Total	12,1	10,1-14,2	9,2	6,5-11,8	15,0	11,8-18,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,6	13,3-27,9	22,4	12,6-32,1	19,0	8,3-29,7
25 a 34	28,1	22,2-34,0	21,3	13,0-29,6	34,0	26,0-42,0
35 a 44	26,9	22,2-31,6	23,9	16,9-30,8	29,5	23,2-35,7
45 a 54	36,1	30,3-42,0	33,6	24,5-42,7	38,2	30,7-45,7
55 a 64	30,7	24,2-37,2	25,8	16,5-35,1	34,2	25,3-43,1
65 e mais	35,4	27,8-42,9	23,6	12,0-35,2	42,0	32,6-51,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,1	18,5-27,6	19,0	12,9-25,1	26,7	20,0-33,3
9 a 11	27,9	24,5-31,3	25,6	20,3-31,0	29,6	25,1-34,1
12 e mais	48,1	43,2-53,0	43,8	35,9-51,8	51,7	45,7-57,7
Total	27,8	25,0-30,6	24,3	20,3-28,2	30,8	26,9-34,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,8	5,2-16,4	10,4	4,5-16,2	11,2	1,9-20,5
25 a 34	15,1	10,4-19,8	11,9	5,8-18,1	17,8	11,0-24,6
35 a 44	15,3	11,6-19,1	16,8	10,8-22,7	14,1	9,4-18,8
45 a 54	19,4	14,8-24,0	16,5	9,7-23,3	21,9	15,6-28,2
55 a 64	20,0	14,3-25,6	19,0	10,6-27,4	20,7	13,1-28,2
65 e mais	23,7	16,9-30,5	13,4	4,2-22,6	29,5	20,6-38,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,5	9,9-17,1	10,6	6,5-14,8	16,1	10,4-21,7
9 a 11	15,1	12,3-17,9	14,6	10,3-18,9	15,5	11,9-19,2
12 e mais	26,4	22,0-30,8	25,6	18,6-32,7	27,1	21,6-32,5
Total	15,6	13,4-17,8	13,8	10,9-16,6	17,2	13,9-20,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,9	24,9-42,9	36,9	26,2-47,7	31,2	16,9-45,5
25 a 34	25,5	19,6-31,4	37,3	26,8-47,7	15,3	9,5-21,1
35 a 44	28,0	22,2-33,8	43,2	33,7-52,8	15,0	9,4-20,6
45 a 54	20,9	15,5-26,2	26,7	17,7-35,8	15,9	9,9-22,0
55 a 64	11,9	7,0-16,7	18,5	9,3-27,8	7,0	2,2-11,9
65 e mais	10,5	5,6-15,4	19,0	8,0-30,0	5,7	1,5-10,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	27,8	22,3-33,3	37,1	29,2-45,0	19,6	11,8-27,3
9 a 11	24,2	20,8-27,5	32,9	27,3-38,5	17,5	13,5-21,6
12 e mais	19,0	15,1-22,8	30,0	22,8-37,1	9,7	6,2-13,1
Total	25,4	22,3-28,6	34,8	30,1-39,6	17,6	13,4-21,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	68,1	59,3-77,0	78,9	69,6-88,3	58,4	44,5-72,2
25 a 34	58,5	51,6-65,5	55,6	44,5-66,8	61,0	52,4-69,7
35 a 44	66,3	60,8-71,8	65,6	56,7-74,6	66,9	60,1-73,6
45 a 54	55,8	49,4-62,2	54,5	44,3-64,8	56,9	48,8-64,9
55 a 64	46,6	38,9-54,3	41,7	29,8-53,7	50,1	40,1-60,2
65 e mais	42,9	35,0-50,8	50,5	36,1-65,0	38,6	29,5-47,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	57,5	51,8-63,2	58,8	50,7-67,0	56,3	48,4-64,2
9 a 11	67,2	63,7-70,8	71,0	65,8-76,2	64,4	59,6-69,2
12 e mais	51,3	46,4-56,2	53,8	45,9-61,7	49,2	43,2-55,2
Total	60,2	56,9-63,5	62,3	57,5-67,2	58,5	54,0-62,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	24,5	17,0-31,9	30,2	18,9-41,5	19,3	10,0-28,5
25 a 34	17,7	12,8-22,6	19,6	11,4-27,7	16,1	10,3-21,9
35 a 44	13,8	9,2-18,3	17,4	9,3-25,4	10,7	6,0-15,3
45 a 54	11,9	7,8-16,0	14,7	7,7-21,8	9,5	4,9-14,1
55 a 64	10,3	5,1-15,5	12,1	3,0-21,3	9,0	3,0-15,0
65 e mais	2,9	0,4-5,4	5,5	0,8-11,8	1,4	0,0-2,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,7	11,5-20,0	22,3	15,2-29,4	9,9	5,2-14,5
9 a 11	18,3	15,1-21,4	17,9	13,1-22,8	18,5	14,3-22,7
12 e mais	11,7	8,5-14,8	14,1	8,6-19,6	9,6	6,2-13,0
Total	16,1	13,6-18,7	19,8	15,6-24,1	13,1	10,2-16,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,9	15,3-30,4	34,3	22,9-45,7	12,5	3,3-21,8
25 a 34	13,0	8,7-17,3	12,7	6,4-19,1	13,2	7,3-19,1
35 a 44	10,5	7,4-13,5	10,9	6,4-15,5	10,1	6,0-14,3
45 a 54	11,8	8,2-15,4	14,2	8,5-19,9	9,8	5,2-14,3
55 a 64	11,1	6,9-15,3	18,7	10,0-27,4	5,6	2,6-8,6
65 e mais	12,1	7,1-17,1	15,2	5,5-24,9	10,3	4,7-15,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,0	7,0-15,1	12,3	6,0-18,7	9,9	4,7-15,1
9 a 11	16,0	13,3-18,7	21,9	17,2-26,6	11,6	8,5-14,6
12 e mais	24,7	20,3-29,1	36,6	28,8-44,3	14,7	10,3-19,0
Total	14,5	12,1-16,9	18,5	14,6-22,4	11,1	8,2-14,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	40,9	31,6-50,2	45,7	33,9-57,4	36,5	22,0-51,0
25 a 34	51,7	44,8-58,5	59,8	48,9-70,6	44,6	36,1-53,2
35 a 44	55,6	49,9-61,3	67,1	59,0-75,3	45,8	38,5-53,1
45 a 54	41,8	35,5-48,1	51,4	41,3-61,5	33,7	26,3-41,1
55 a 64	30,6	23,6-37,7	35,6	23,9-47,4	27,0	18,6-35,4
65 e mais	10,6	5,8-15,4	18,7	7,8-29,6	6,1	2,0-10,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	45,1	39,4-50,9	55,5	47,2-63,7	35,9	27,7-44,0
9 a 11	45,1	41,3-48,9	55,2	49,3-61,1	37,5	32,5-42,4
12 e mais	38,0	33,2-42,8	34,6	26,8-42,4	40,9	34,9-46,8
Total	44,3	40,9-47,6	52,9	47,9-57,8	37,1	32,5-41,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,3	7,3-17,2	16,0	8,0-24,0	8,9	3,0-14,7
25 a 34	13,1	7,9-18,4	9,6	1,5-17,7	16,2	9,4-23,0
35 a 44	17,1	11,8-22,3	20,2	11,2-29,3	14,4	8,5-20,2
45 a 54	12,6	8,3-16,9	18,4	10,7-26,0	7,7	3,2-12,3
55 a 64	8,0	4,0-12,1	7,0	1,4-12,6	8,7	3,1-14,4
65 e mais	1,4	0,4-3,1	3,0	1,6-7,7	0,4	0,2-1,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,5	11,6-19,5	18,5	12,0-24,9	12,9	8,2-17,7
9 a 11	10,6	8,1-13,1	11,0	7,2-14,9	10,3	7,0-13,6
12 e mais	5,2	3,0-7,3	4,3	0,9-7,7	5,9	3,1-8,6
Total	12,5	10,3-14,8	14,2	10,5-18,0	11,1	8,4-13,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	38,2	28,5-47,9	10,1	3,3-16,9	63,6	52,2-74,9
25 a 34	44,5	37,8-51,1	16,8	9,7-23,9	68,5	60,6-76,3
35 a 44	42,8	37,1-48,5	15,9	9,5-22,4	65,8	59,1-72,4
45 a 54	38,4	32,2-44,5	19,1	11,3-26,9	54,7	46,6-62,8
55 a 64	38,7	31,2-46,2	17,3	9,1-25,6	54,2	44,2-64,1
65 e mais	19,4	13,4-25,4	13,7	4,2-23,3	22,6	15,0-30,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,5	38,8-50,2	15,6	10,4-20,8	70,2	63,9-76,5
9 a 11	39,9	36,2-43,6	16,0	11,7-20,3	57,9	52,9-63,0
12 e mais	17,9	14,2-21,6	10,2	5,0-15,4	24,3	19,2-29,4
Total	39,6	36,3-43,0	15,1	11,9-18,3	60,1	56,0-64,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	26,0	18,3-33,8	31,8	21,1-42,6	20,8	9,8-31,8
25 a 34	31,5	24,7-38,2	46,0	35,0-57,1	18,8	12,1-25,5
35 a 44	28,2	22,6-33,7	36,4	27,0-45,7	21,1	15,0-27,3
45 a 54	18,3	13,7-23,0	28,8	20,3-37,3	9,5	5,1-13,8
55 a 64	16,4	10,6-22,2	33,4	21,8-45,0	4,1	1,4-6,8
65 e mais	6,6	2,6-10,7	16,8	6,2-27,4	0,9	0,2-2,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	24,9	19,7-30,1	36,7	28,5-44,9	14,3	8,2-20,4
9 a 11	24,8	21,5-28,1	33,5	28,0-39,0	18,2	14,3-22,1
12 e mais	25,1	20,8-29,5	36,1	28,4-43,7	15,9	11,6-20,1
Total	24,9	21,9-27,9	35,6	30,7-40,5	15,9	12,5-19,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,7	0,0-1,5	1,3	0,2-2,9	0,2	0,2-0,6
25 a 34	2,9	0,0-5,9	5,5	0,6-11,6	0,7	0,0-1,5
35 a 44	1,5	0,1-2,9	2,9	0,1-5,8	0,3	0,1-0,8
45 a 54	0,9	0,3-2,1	2,0	0,6-4,7	0,0	0,0-0,0
55 a 64	1,5	0,2-2,7	3,5	0,5-6,5	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,3	0,2-2,9	2,8	0,5-6,0	0,0	0,0-0,0
9 a 11	1,2	0,5-1,9	2,3	0,7-3,8	0,3	0,1-0,8
12 e mais	3,5	1,7-5,3	5,8	2,2-9,3	1,5	0,2-2,9
Total	1,5	0,6-2,4	3,0	1,1-4,9	0,3	0,1-0,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,4	0,7-10,1	1,9	1,2-5,1	8,5	0,2-16,9
25 a 34	3,3	0,6-6,0	1,3	0,3-2,8	5,1	0,4-9,9
35 a 44	3,5	1,6-5,4	0,9	0,9-2,6	5,7	2,5-8,9
45 a 54	7,1	3,7-10,5	4,8	0,1-9,5	9,1	4,3-13,9
55 a 64	10,1	5,4-14,8	6,9	0,5-13,4	12,4	5,7-19,0
65 e mais	10,4	5,2-15,7	4,6	4,1-13,3	13,7	7,1-20,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,4	4,6-10,2	3,1	0,8-5,4	11,3	6,4-16,1
9 a 11	3,4	2,1-4,8	1,9	0,4-3,4	4,7	2,6-6,7
12 e mais	2,0	0,8-3,3	0,7	0,7-2,1	3,1	1,2-5,1
Total	5,4	3,8-6,9	2,4	1,0-3,7	7,8	5,2-10,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	89,3	83,1-95,5	79,2	71,3-87,0
55 a 59	93,3	88,6-98,1	78,8	70,0-87,6
Anos de escolaridade				
0 a 8	88,5	82,3-94,7	73,6	65,2-82,1
9 a 11	94,7	90,1-99,3	88,0	81,6-94,4
12 e mais	96,5	91,7-100,0	93,0	86,8-99,3
Total	90,8	86,4-95,1	79,0	73,1-84,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	78,2	70,6-85,8	74,1	66,2-82,1
35 a 44	87,5	82,3-92,6	84,7	79,3-90,2
45 a 54	91,7	86,0-97,4	83,5	76,7-90,3
55 a 59	93,0	86,7-99,3	79,5	68,3-90,6
Anos de escolaridade				
0 a 8	83,7	76,9-90,5	77,1	69,9-84,2
9 a 11	84,8	80,6-89,1	81,3	76,7-85,9
12 e mais	90,8	86,5-95,0	86,3	81,4-91,1
Total	85,1	81,3-88,8	79,9	75,9-83,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	27,5	19,5-35,5	20,4	12,2-28,5	34,0	21,0-47,0
25 a 34	34,2	28,1-40,4	20,3	12,8-27,8	46,3	37,8-54,8
35 a 44	34,8	29,6-40,1	22,2	15,7-28,7	45,6	38,4-52,9
45 a 54	32,9	27,3-38,5	20,7	13,2-28,1	43,3	35,4-51,2
55 a 64	21,2	15,8-26,6	16,9	8,5-25,2	24,4	17,2-31,5
65 e mais	16,0	10,7-21,4	15,9	6,0-25,8	16,1	9,9-22,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,6	15,8-25,4	10,7	6,0-15,4	29,4	21,9-36,9
9 a 11	36,6	33,0-40,3	26,9	21,7-32,1	44,0	39,0-49,0
12 e mais	54,3	49,4-59,2	45,0	37,1-52,9	62,1	56,2-68,0
Total	30,4	27,5-33,3	20,3	16,9-23,8	38,8	34,5-43,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,0	2,9-17,0	6,9	1,1-12,7	12,7	0,6-24,8
25 a 34	14,8	9,4-20,2	14,9	6,4-23,3	14,8	7,8-21,7
35 a 44	23,0	18,0-28,0	22,2	14,2-30,3	23,6	17,4-29,8
45 a 54	32,6	26,6-38,7	33,2	23,8-42,6	32,2	24,3-40,0
55 a 64	50,6	42,9-58,3	44,9	33,0-56,8	54,6	44,6-64,7
65 e mais	62,3	54,6-70,1	55,9	41,6-70,3	65,9	57,0-74,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,6	24,7-34,5	23,5	17,1-29,8	35,1	27,8-42,3
9 a 11	17,8	15,1-20,5	19,9	15,3-24,6	16,1	13,0-19,3
12 e mais	15,4	11,9-18,8	14,9	8,9-20,9	15,8	11,8-19,7
Total	23,7	20,9-26,4	21,2	17,4-25,1	25,7	21,8-29,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,2-0,5	0,3	0,3-1,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,3	0,1-0,8	0,3	0,3-0,9	0,4	0,4-1,1
35 a 44	4,1	0,6-7,5	6,0	0,6-12,6	2,4	0,3-5,2
45 a 54	9,0	5,2-12,9	7,6	2,0-13,1	10,3	5,1-15,5
55 a 64	13,8	8,6-19,1	15,7	6,5-24,9	12,5	6,3-18,7
65 e mais	21,2	14,6-27,9	14,8	3,5-26,1	24,8	16,6-33,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,9	4,8-9,0	6,0	2,6-9,5	7,7	5,1-10,3
9 a 11	2,4	1,5-3,3	2,4	0,9-3,9	2,3	1,2-3,5
12 e mais	2,0	0,6-3,3	2,6	0,2-5,0	1,5	0,1-2,8
Total	4,7	3,5-5,8	4,4	2,4-6,3	5,0	3,6-6,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,1	1,0-3,2	0,0	0,0-0,0	2,0	1,9-5,9
35 a 44	1,7	0,1-3,2	0,4	0,4-1,1	2,8	0,0-5,5
45 a 54	3,5	1,2-5,9	3,9	0,4-7,4	3,2	0,0-6,4
55 a 64	8,5	3,9-13,2	6,7	0,1-13,3	9,8	3,4-16,2
65 e mais	8,5	4,0-13,1	8,8	1,0-16,6	8,4	2,8-14,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,6	2,0-5,2	2,1	0,7-3,6	4,8	2,1-7,6
9 a 11	0,9	0,4-1,4	0,9	0,1-1,8	0,8	0,3-1,4
12 e mais	1,2	0,2-2,2	0,5	0,5-1,6	1,7	0,1-3,4
Total	2,3	1,5-3,2	1,5	0,7-2,4	3,0	1,5-4,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,8	2,5-9,0	3,7	0,1-7,3	7,6	2,2-12,9
25 a 34	11,0	6,0-15,9	13,8	5,2-22,4	8,5	3,2-13,8
35 a 44	17,7	13,4-22,0	17,2	10,8-23,6	18,2	12,5-23,9
45 a 54	33,8	27,7-39,8	30,4	21,4-39,5	36,6	28,6-44,6
55 a 64	39,6	32,1-47,1	30,2	19,1-41,2	46,4	36,5-56,4
65 e mais	43,3	35,4-51,2	32,3	18,4-46,1	49,5	40,0-58,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,9	17,0-24,8	17,2	11,5-22,9	24,2	18,7-29,6
9 a 11	14,6	12,1-17,2	13,4	9,8-17,1	15,6	12,1-19,0
12 e mais	20,2	16,2-24,1	21,2	14,7-27,7	19,3	14,6-24,0
Total	18,6	16,3-20,8	16,4	13,0-19,8	20,4	17,4-23,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,6	0,1-1,4	0,0	0,0-0,0	1,2	0,2-2,7
25 a 34	1,1	1,0-3,2	0,0	0,0-0,0	2,0	1,9-5,9
35 a 44	0,4	0,2-0,9	0,0	0,0-0,0	0,7	0,3-1,7
45 a 54	3,9	1,7-6,2	0,7	0,3-1,7	6,7	2,8-10,7
55 a 64	10,7	6,1-15,2	4,4	0,2-8,9	15,2	8,2-22,3
65 e mais	13,8	8,9-18,8	7,5	0,4-14,6	17,4	10,8-24,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,7	2,2-5,2	0,9	0,1-1,8	6,1	3,4-8,8
9 a 11	1,7	1,0-2,5	0,4	0,0-0,9	2,7	1,4-4,1
12 e mais	1,9	0,7-3,1	1,1	0,4-2,7	2,6	0,8-4,3
Total	2,8	1,9-3,6	0,8	0,3-1,3	4,4	3,0-5,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,2	0,2-4,2	1,8	1,3-5,0	2,6	0,0-5,1
25 a 34	2,5	0,5-4,5	1,6	0,2-3,0	3,3	0,3-6,8
35 a 44	1,1	0,2-2,1	1,1	0,5-2,7	1,1	0,1-2,2
45 a 54	2,0	0,3-3,7	0,0	0,0-0,0	3,6	0,5-6,7
55 a 64	1,4	0,1-2,8	1,9	0,7-4,5	1,0	0,7-2,6
65 e mais	6,5	1,8-11,2	11,1	0,0-22,1	3,9	0,2-7,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,3	0,9-3,7	2,1	0,2-4,0	2,4	0,3-4,4
9 a 11	2,2	1,1-3,3	1,4	0,3-2,6	2,7	1,0-4,5
12 e mais	2,4	0,8-4,1	1,8	0,8-4,4	3,0	1,0-5,1
Total	2,2	1,4-3,1	1,9	0,7-3,0	2,6	1,3-3,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,8	17,7-29,9	28,5	19,0-38,1	19,5	12,2-26,7
25 a 34	29,4	23,8-35,0	29,5	20,5-38,4	29,3	22,4-36,2
35 a 44	34,1	28,9-39,3	39,6	30,9-48,3	29,3	23,2-35,5
45 a 54	34,4	28,8-40,1	31,6	23,0-40,2	36,8	29,5-44,2
55 a 64	41,5	34,1-48,9	37,7	26,6-48,8	44,3	34,4-54,1
65 e mais	49,0	41,1-57,0	53,5	38,9-68,0	46,5	37,1-55,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,0	13,3-20,7	18,1	12,0-24,2	16,1	11,7-20,4
9 a 11	37,9	34,2-41,6	41,6	35,8-47,3	35,1	30,3-39,9
12 e mais	79,1	75,0-83,2	80,6	74,0-87,2	77,9	72,8-83,0
Total	31,9	29,2-34,7	33,6	29,3-37,9	30,6	27,1-34,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	69,9	59,4-80,3
26 a 30	64,9	51,7-78,2
31 a 35	73,4	62,5-84,4
36 a 40	70,3	60,9-79,8
41 a 45	61,3	50,2-72,5
46 a 50	65,8	55,4-76,2
Anos de escolaridade		
0 a 8	69,2	59,6-78,8
9 a 11	66,0	60,5-71,5
12 e mais	71,9	65,6-78,2
Total	67,8	63,0-72,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,1	3,9-12,2	4,8	0,5-9,2	11,0	4,2-17,9
25 a 34	8,9	5,4-12,3	6,3	2,2-10,4	11,1	5,7-16,4
35 a 44	11,3	8,2-14,4	7,6	3,8-11,4	14,5	9,9-19,1
45 a 54	9,3	5,8-12,7	6,1	1,6-10,6	11,9	6,8-17,0
55 a 64	12,3	7,3-17,3	13,3	4,7-21,9	11,6	5,6-17,5
65 e mais	19,3	13,0-25,7	12,2	1,5-22,9	23,4	15,4-31,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,7	6,0-11,3	6,2	3,3-9,2	10,8	6,6-15,1
9 a 11	11,5	9,0-13,9	7,5	4,1-10,9	14,5	11,0-17,9
12 e mais	13,2	10,0-16,5	8,7	4,1-13,4	17,0	12,5-21,5
Total	10,2	8,5-11,9	7,0	4,9-9,0	12,9	10,3-15,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	79,4	61,0-97,8	66,2	21,1-100,0	84,5	68,6-100,0
25 a 34	73,8	58,8-88,9	77,4	51,6-100,0	71,8	53,0-90,5
35 a 44	71,4	58,0-84,9	78,6	59,1-98,0	68,2	51,2-85,3
45 a 54	69,6	51,3-87,9	93,8	81,4-100,0	59,1	36,1-82,2
55 a 64	69,9	50,2-100,0	81,3	54,6-100,0	60,4	33,7-100,0
65 e mais	71,8	53,7-100,0	36,8	7,2-80,9	82,0	66,9-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	70,4	57,8-83,0	78,2	60,5-96,0	66,1	48,8-83,3
9 a 11	70,1	59,5-80,8	61,3	36,7-85,8	73,6	63,0-84,2
12 e mais	88,5	80,6-96,3	93,9	82,2-100,0	86,1	76,3-96,0
Total	73,2	66,1-80,2	74,4	61,0-87,8	72,6	64,3-80,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,5	4,0-13,0	17,2	8,0-26,3	1,2	0,2-2,6
25 a 34	12,7	7,1-18,4	20,3	9,5-31,2	6,5	2,3-10,7
35 a 44	9,3	5,7-13,0	15,2	8,2-22,1	4,4	1,4-7,4
45 a 54	12,3	7,8-16,7	15,2	8,1-22,4	9,7	4,0-15,3
55 a 64	9,3	4,3-14,3	16,3	6,2-26,4	3,4	0,6-6,3
65 e mais	7,0	1,6-12,4	12,4	0,0-24,7	3,4	0,4-6,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,3	8,2-16,4	21,2	13,4-29,0	4,3	2,0-6,7
9 a 11	8,4	6,2-10,6	13,1	9,3-17,0	4,9	2,4-7,4
12 e mais	7,5	4,5-10,6	10,6	5,2-16,1	4,7	1,8-7,7
Total	10,3	8,0-12,5	17,1	12,7-21,5	4,6	3,0-6,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	15,8	9,2-22,4	18,1	8,0-28,2	13,9	5,3-22,5
25 a 34	17,8	12,4-23,2	18,2	11,0-25,5	17,5	9,7-25,3
35 a 44	22,6	17,3-27,9	29,9	20,8-39,1	16,4	10,7-22,0
45 a 54	31,0	24,9-37,2	39,6	29,3-49,9	23,7	16,8-30,5
55 a 64	27,2	19,9-34,4	32,4	20,7-44,2	22,8	13,9-31,6
65 e mais	38,2	29,7-46,7	56,8	41,3-72,4	26,0	16,9-35,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	26,1	21,0-31,1	29,1	21,5-36,7	23,4	16,6-30,1
9 a 11	17,4	14,9-20,0	22,9	18,6-27,3	13,4	10,3-16,5
12 e mais	17,1	13,2-21,1	24,3	17,4-31,2	10,7	6,8-14,7
Total	21,7	19,0-24,5	26,3	21,9-30,6	18,0	14,4-21,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,9	1,0-4,7	4,1	2,1-10,3	0,0	0,0-0,0
25 a 34	4,6	0,7-8,6	8,3	0,1-16,5	1,6	0,6-3,8
35 a 44	1,4	0,2-2,6	3,1	0,4-5,7	0,0	0,0-0,0
45 a 54	2,9	0,5-5,3	3,9	0,3-8,0	2,1	0,5-4,8
55 a 64	2,7	0,5-4,9	5,1	0,4-9,7	0,7	0,5-1,8
65 e mais	1,9	1,7-5,5	4,9	4,0-13,8	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,0	1,2-6,7	7,6	2,0-13,1	0,7	0,3-1,8
9 a 11	1,3	0,4-2,3	2,3	0,7-3,9	0,6	0,5-1,7
12 e mais	2,3	0,6-4,0	3,5	0,3-6,7	1,3	0,1-2,7
Total	2,7	1,3-4,2	5,1	2,1-8,2	0,7	0,0-1,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	44,0	36,0-52,0	52,1	40,8-63,4	37,2	26,4-47,9
25 a 34	49,4	42,5-56,3	53,6	42,9-64,4	46,0	37,2-54,7
35 a 44	40,9	34,9-46,8	46,0	36,5-55,6	36,5	29,2-43,9
45 a 54	28,7	22,8-34,6	33,0	23,3-42,7	25,0	18,0-32,1
55 a 64	25,0	17,1-32,9	32,0	19,2-44,7	19,2	9,6-28,8
65 e mais	17,7	10,7-24,8	21,9	8,2-35,5	15,0	7,6-22,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,7	34,7-46,7	51,0	42,3-59,8	31,5	23,9-39,1
9 a 11	41,8	38,1-45,4	43,6	38,1-49,1	40,4	35,5-45,3
12 e mais	29,9	25,3-34,6	27,7	20,6-34,7	32,0	25,9-38,0
Total	40,1	36,8-43,5	45,9	40,8-51,1	35,4	31,1-39,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,0	13,6-26,4	27,2	17,1-37,3	12,9	5,2-20,6
25 a 34	36,9	30,2-43,6	45,8	34,9-56,7	28,5	20,5-36,5
35 a 44	50,9	44,7-57,2	61,6	52,0-71,2	39,9	32,0-47,8
45 a 54	55,9	49,0-62,9	60,1	49,5-70,7	52,0	42,9-61,0
55 a 64	52,5	43,2-61,7	56,3	42,9-69,7	48,4	35,6-61,1
65 e mais	35,9	26,7-45,1	35,5	20,5-50,5	36,3	25,4-47,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,4	35,1-47,6	44,3	35,5-53,1	37,7	28,9-46,4
9 a 11	35,8	32,3-39,3	47,5	42,0-53,1	26,8	22,5-31,0
12 e mais	39,3	34,3-44,4	50,2	42,2-58,2	29,4	23,4-35,3
Total	38,7	35,4-41,9	46,1	41,1-51,2	31,3	27,3-35,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,2	1,4-8,9	2,9	0,6-5,1	7,4	0,5-14,4
25 a 34	7,9	4,3-11,5	4,0	0,0-7,9	11,7	5,9-17,5
35 a 44	13,3	9,2-17,4	13,9	7,8-20,0	12,7	7,2-18,2
45 a 54	17,8	12,4-23,3	16,5	7,9-25,1	19,1	12,3-25,9
55 a 64	8,6	3,9-13,4	13,2	4,6-21,8	3,7	0,5-6,9
65 e mais	9,6	4,3-14,8	4,8	2,1-11,7	14,1	6,3-21,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	11,5	7,8-15,1	7,6	3,9-11,4	16,3	9,7-22,9
9 a 11	7,9	6,0-9,7	7,7	4,8-10,6	8,0	5,5-10,4
12 e mais	9,7	6,7-12,8	11,3	6,3-16,3	8,3	4,6-12,0
Total	9,7	7,8-11,6	8,0	5,8-10,3	11,3	8,4-14,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,7	15,5-27,8	21,9	13,2-30,6	21,4	12,8-30,1
25 a 34	18,0	12,9-23,0	15,4	7,8-23,0	20,1	13,4-26,8
35 a 44	27,0	21,8-32,3	29,9	21,3-38,5	24,6	18,3-30,9
45 a 54	27,5	21,6-33,4	23,9	14,5-33,2	30,6	23,1-38,1
55 a 64	30,6	22,7-38,5	26,7	15,3-38,1	33,8	23,0-44,7
65 e mais	21,5	14,9-28,0	23,0	10,7-35,3	20,5	13,3-27,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,9	15,4-24,4	19,1	12,5-25,7	20,6	14,4-26,8
9 a 11	22,8	19,9-25,8	22,5	17,8-27,2	23,1	19,3-26,9
12 e mais	40,6	35,6-45,5	39,5	31,7-47,3	41,5	35,2-47,8
Total	23,0	20,4-25,6	22,4	18,4-26,3	23,5	20,1-27,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,2	11,4-22,9	16,2	8,5-23,9	18,0	9,6-26,4
25 a 34	10,5	6,6-14,4	6,1	2,6-9,6	14,1	7,9-20,4
35 a 44	18,8	14,3-23,4	18,8	11,6-26,0	18,9	13,1-24,6
45 a 54	16,2	11,4-21,0	12,9	5,0-20,8	19,0	13,1-24,9
55 a 64	21,9	14,8-29,0	18,8	8,7-28,9	24,5	14,6-34,4
65 e mais	11,5	6,1-16,9	17,3	5,6-29,0	7,7	3,5-11,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,9	10,0-17,9	12,1	7,1-17,1	15,6	9,7-21,4
9 a 11	15,6	13,0-18,2	14,6	10,6-18,6	16,4	13,0-19,8
12 e mais	23,3	19,0-27,5	19,1	13,1-25,2	27,0	21,1-32,8
Total	15,5	13,2-17,8	13,7	10,6-16,9	16,9	13,7-20,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	39,4	31,2-47,7	43,2	32,2-54,2	36,3	23,9-48,6
25 a 34	36,8	30,0-43,7	50,5	39,5-61,6	25,5	17,7-33,4
35 a 44	30,4	24,7-36,2	45,5	35,8-55,1	17,7	12,1-23,4
45 a 54	20,0	14,5-25,5	29,9	20,1-39,7	11,5	6,0-16,9
55 a 64	14,2	8,9-19,5	20,7	11,2-30,2	8,7	3,2-14,3
65 e mais	15,1	8,8-21,5	29,7	15,8-43,5	5,6	1,4-9,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	31,7	25,6-37,7	41,9	33,1-50,6	22,6	14,1-31,1
9 a 11	31,1	27,7-34,6	42,8	37,3-48,2	22,6	18,4-26,8
12 e mais	30,3	25,6-34,9	37,7	30,0-45,5	23,5	18,2-28,9
Total	31,3	28,0-34,7	41,8	36,7-46,9	22,7	18,2-27,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	71,1	64,1-78,1	71,2	61,5-80,9	71,0	61,1-81,0
25 a 34	62,5	55,7-69,3	60,4	49,6-71,1	64,2	55,5-73,0
35 a 44	63,9	58,0-69,9	60,0	50,4-69,6	67,3	59,9-74,7
45 a 54	58,0	51,5-64,5	59,9	49,8-70,1	56,4	48,0-64,7
55 a 64	57,8	49,3-66,4	58,4	45,4-71,3	57,4	46,1-68,8
65 e mais	52,5	43,9-61,1	63,0	48,2-77,9	45,6	35,3-55,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	61,2	55,5-66,9	62,2	53,8-70,5	60,3	52,6-68,1
9 a 11	67,7	64,4-71,1	66,5	61,3-71,7	68,6	64,3-73,0
12 e mais	58,8	53,8-63,8	55,6	47,7-63,6	61,7	55,5-67,8
Total	63,6	60,4-66,8	63,2	58,4-68,0	64,0	59,8-68,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	30,9	23,0-38,7	39,0	27,9-50,0	24,1	13,0-35,2
25 a 34	24,0	17,6-30,5	26,4	15,8-37,0	22,1	14,3-29,9
35 a 44	16,9	12,5-21,3	17,4	10,4-24,4	16,4	10,9-22,0
45 a 54	14,0	9,0-18,9	20,5	11,9-29,0	8,3	2,9-13,8
55 a 64	7,4	3,1-11,8	11,8	4,3-19,3	3,8	1,2-8,7
65 e mais	6,5	2,7-10,3	3,3	1,0-7,7	8,5	3,0-14,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,7	16,1-27,3	26,5	18,2-34,8	17,4	9,8-25,0
9 a 11	21,3	18,3-24,3	24,8	20,1-29,6	18,6	14,8-22,5
12 e mais	16,2	12,4-20,0	17,5	11,1-23,9	15,1	10,6-19,5
Total	21,0	17,9-24,1	25,0	20,2-29,7	17,7	13,7-21,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	15,6	10,3-21,0	29,6	19,4-39,8	3,9	0,8-6,9
25 a 34	16,6	11,2-22,0	21,6	12,1-31,1	12,4	6,6-18,2
35 a 44	14,3	9,8-18,9	18,0	10,1-26,0	11,2	6,4-16,0
45 a 54	16,7	11,6-21,8	16,8	9,3-24,3	16,6	9,6-23,5
55 a 64	11,6	6,3-16,8	17,5	7,3-27,8	6,6	2,8-10,4
65 e mais	11,2	5,8-16,5	15,8	4,5-27,2	8,1	3,6-12,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,4	9,2-17,6	19,8	12,2-27,3	7,7	3,8-11,6
9 a 11	17,0	14,2-19,7	24,8	20,0-29,5	11,2	8,2-14,2
12 e mais	17,4	13,5-21,2	21,6	15,1-28,1	13,5	9,1-18,0
Total	15,2	12,8-17,6	21,9	17,5-26,2	9,7	7,4-12,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	41,7	33,6-49,7	47,9	36,6-59,2	36,4	25,1-47,7
25 a 34	46,5	39,6-53,5	52,0	40,9-63,1	42,0	33,2-50,9
35 a 44	56,2	50,3-62,1	66,5	57,6-75,4	47,4	39,9-55,0
45 a 54	41,7	35,1-48,3	53,2	42,7-63,8	31,7	24,2-39,2
55 a 64	34,2	25,8-42,7	59,8	47,0-72,5	12,8	5,3-20,3
65 e mais	14,8	8,3-21,4	22,9	10,2-35,6	9,5	2,7-16,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,0	40,0-51,9	58,1	49,3-66,9	35,1	27,0-43,1
9 a 11	43,4	39,8-47,0	51,1	45,6-56,6	37,6	32,9-42,4
12 e mais	34,1	29,3-38,9	32,5	25,2-39,9	35,5	29,3-41,7
Total	43,8	40,4-47,2	53,0	47,9-58,1	36,2	31,8-40,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	9,8	5,0-14,5	10,2	4,0-16,5	9,4	2,4-16,4
25 a 34	10,2	6,3-14,1	13,9	6,9-20,9	7,1	3,0-11,2
35 a 44	16,7	12,1-21,4	15,9	8,6-23,2	17,4	11,4-23,4
45 a 54	13,3	8,6-18,1	17,7	8,8-26,5	9,6	5,6-13,6
55 a 64	12,9	6,4-19,4	19,5	8,0-31,0	7,4	0,8-14,0
65 e mais	4,1	0,2-8,0	3,1	1,2-7,5	4,8	1,0-10,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,3	9,6-17,0	16,8	11,0-22,6	10,2	5,4-15,0
9 a 11	10,8	8,6-13,0	11,4	7,8-14,9	10,4	7,5-13,3
12 e mais	5,7	3,3-8,1	5,1	1,5-8,7	6,2	2,9-9,4
Total	11,6	9,5-13,7	13,6	10,3-16,9	9,9	7,3-12,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,7	16,2-29,3	8,8	2,9-14,7	34,5	23,9-45,1
25 a 34	36,0	29,6-42,4	10,3	4,9-15,8	57,1	48,5-65,6
35 a 44	39,0	33,2-44,8	15,7	8,8-22,5	58,8	51,3-66,2
45 a 54	34,4	28,2-40,6	14,8	6,7-22,8	51,4	42,9-59,8
55 a 64	35,1	26,8-43,4	20,1	10,2-30,0	47,7	36,1-59,3
65 e mais	19,8	13,7-25,8	4,7	0,3-9,0	29,7	20,8-38,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,9	29,6-40,3	12,9	8,0-17,9	54,5	46,3-62,7
9 a 11	31,4	28,1-34,6	11,8	8,4-15,3	45,8	41,0-50,6
12 e mais	16,9	13,5-20,3	6,7	3,4-10,0	26,1	20,7-31,5
Total	31,8	28,8-34,8	11,9	9,0-14,8	48,2	43,8-52,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	21,3	15,0-27,6	34,0	23,0-45,0	10,6	5,4-15,9
25 a 34	28,1	21,6-34,5	39,3	28,6-49,9	18,9	10,9-26,8
35 a 44	17,7	13,3-22,2	32,2	23,5-40,9	5,5	2,9-8,1
45 a 54	14,8	10,4-19,3	29,0	20,1-37,9	2,6	0,9-4,4
55 a 64	9,0	4,1-13,8	16,7	6,9-26,5	2,5	0,3-4,7
65 e mais	4,8	0,5-9,1	11,6	1,2-22,0	0,4	0,2-0,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,0	13,1-22,8	29,4	21,2-37,7	7,8	2,8-12,7
9 a 11	21,9	18,8-25,0	35,5	30,1-40,8	11,9	8,5-15,3
12 e mais	20,9	16,6-25,2	33,1	25,5-40,7	10,0	6,3-13,8
Total	19,8	17,1-22,6	32,1	27,3-36,9	9,7	6,9-12,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,5	0,1-1,2	1,2	0,2-2,5	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,2	0,2-2,3	2,7	0,4-5,0	0,0	0,0-0,1
35 a 44	2,1	0,4-3,8	4,4	0,7-8,0	0,2	0,2-0,6
45 a 54	1,7	0,3-3,1	3,5	0,5-6,6	0,1	0,1-0,3
55 a 64	0,9	0,0-1,7	1,9	0,1-3,8	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,4	0,2-1,0	0,9	0,4-2,2	0,0	0,0-0,0
9 a 11	1,7	0,8-2,6	3,9	1,7-6,0	0,1	0,1-0,3
12 e mais	3,0	1,2-4,8	6,1	2,3-9,8	0,3	0,1-0,6
Total	1,2	0,7-1,7	2,5	1,4-3,7	0,1	0,0-0,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,9	0,4-2,1	0,2	0,2-0,7	1,5	0,8-3,7
25 a 34	1,5	0,1-3,2	0,6	0,1-1,3	2,3	0,7-5,3
35 a 44	3,7	1,5-5,9	1,6	0,8-3,9	5,5	1,9-9,1
45 a 54	11,5	6,9-16,1	8,1	1,9-14,3	14,4	7,8-21,1
55 a 64	6,5	2,6-10,4	2,8	0,1-5,8	9,5	2,9-16,2
65 e mais	8,5	4,2-12,8	3,1	1,2-7,5	12,0	5,6-18,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,8	3,8-7,7	2,2	0,5-3,9	8,9	5,6-12,3
9 a 11	1,8	1,1-2,6	1,7	0,6-2,8	1,9	0,9-2,9
12 e mais	1,6	0,3-3,0	1,1	0,4-2,7	2,1	0,1-4,3
Total	3,8	2,7-4,8	1,9	0,9-2,9	5,3	3,7-7,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	88,8	82,4-95,2	78,5	70,3-86,6
55 a 59	80,9	70,9-90,8	61,2	49,4-73,1
Anos de escolaridade				
0 a 8	81,6	73,7-89,5	64,9	55,1-74,6
9 a 11	93,3	87,6-98,9	84,2	76,4-92,0
12 e mais	97,1	93,5-100,0	91,8	84,6-99,0
Total	85,8	80,2-91,3	71,8	64,9-78,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	80,3	73,6-87,1	76,1	68,1-84,2
35 a 44	90,6	85,7-95,5	86,1	80,4-91,9
45 a 54	93,7	89,3-98,0	88,8	83,4-94,3
55 a 59	91,5	80,8-100,0	81,4	68,0-94,9
Anos de escolaridade				
0 a 8	87,4	81,1-93,8	80,8	72,8-88,9
9 a 11	84,9	80,4-89,4	81,5	76,8-86,3
12 e mais	90,7	86,4-94,9	88,3	83,8-92,9
Total	86,7	83,1-90,2	81,9	77,6-86,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,4	12,0-20,8	19,5	12,1-27,0	13,8	8,8-18,8
25 a 34	19,2	14,2-24,2	24,8	15,3-34,2	14,6	10,2-19,0
35 a 44	26,8	22,0-31,6	29,3	21,3-37,2	24,7	19,0-30,4
45 a 54	32,4	26,6-38,1	31,6	22,3-40,8	33,0	25,8-40,2
55 a 64	30,0	22,7-37,2	30,0	19,1-41,0	29,9	20,3-39,6
65 e mais	39,2	30,7-47,7	43,9	28,5-59,4	36,0	26,4-45,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,6	9,0-16,1	16,4	9,9-22,9	9,2	6,1-12,2
9 a 11	27,4	24,3-30,5	30,7	25,7-35,6	25,0	21,1-28,9
12 e mais	65,5	60,7-70,3	64,3	56,7-71,9	66,6	60,6-72,6
Total	23,5	21,1-25,9	26,5	22,4-30,6	21,1	18,4-23,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,4	1,0-3,8	2,1	0,4-3,9	2,6	0,4-4,8
25 a 34	13,1	7,7-18,5	11,3	2,7-19,8	14,6	7,7-21,5
35 a 44	13,4	9,4-17,4	12,3	6,2-18,3	14,4	9,1-19,7
45 a 54	32,4	26,1-38,6	25,8	16,7-35,0	38,0	29,7-46,4
55 a 64	41,7	33,1-50,3	28,8	17,5-40,1	52,5	40,9-64,2
65 e mais	48,2	39,5-56,8	26,7	14,2-39,1	62,2	52,5-72,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,6	17,4-25,7	14,6	8,9-20,3	27,8	21,7-33,9
9 a 11	11,3	9,4-13,3	9,5	6,7-12,3	12,7	10,0-15,4
12 e mais	14,4	10,7-18,0	16,3	10,2-22,5	12,6	8,5-16,8
Total	16,7	14,5-19,0	12,8	9,6-16,0	20,0	16,9-23,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,4	0,2-0,9	0,0	0,0-0,0	0,7	0,3-1,7
25 a 34	0,1	0,1-0,4	0,3	0,3-0,9	0,0	0,0-0,0
35 a 44	3,2	0,8-5,6	2,1	0,4-4,5	4,1	0,2-8,1
45 a 54	6,0	2,7-9,3	6,8	1,1-12,4	5,3	1,6-9,0
55 a 64	12,4	6,7-18,1	11,8	3,7-19,8	13,0	4,9-21,0
65 e mais	14,9	9,0-20,9	10,2	0,3-20,1	18,0	10,7-25,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,5	2,9-6,2	3,5	1,3-5,7	5,4	3,0-7,9
9 a 11	1,4	0,7-2,0	1,0	0,3-1,7	1,7	0,7-2,6
12 e mais	4,9	2,6-7,2	5,1	1,5-8,7	4,7	1,9-7,5
Total	3,3	2,4-4,2	2,7	1,5-3,9	3,8	2,5-5,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,2-0,6	0,4	0,4-1,3	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,8	0,1-1,7	0,0	0,0-0,0	1,5	0,1-3,1
35 a 44	0,5	0,2-1,1	0,6	0,6-1,9	0,4	0,3-1,0
45 a 54	5,3	1,6-9,1	5,8	0,0-11,5	5,0	0,1-10,0
55 a 64	5,5	1,7-9,3	4,2	0,6-7,8	6,6	0,4-12,8
65 e mais	8,1	3,2-13,0	10,0	0,3-20,3	6,8	2,3-11,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,6	1,3-3,9	2,1	0,3-3,8	3,0	1,2-4,9
9 a 11	1,2	0,6-1,8	1,6	0,4-2,8	0,9	0,3-1,5
12 e mais	1,3	0,3-2,3	0,8	0,4-2,0	1,7	0,1-3,2
Total	1,9	1,2-2,6	1,8	0,8-2,8	2,0	1,0-2,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,1	1,4-4,8	2,5	0,4-4,6	3,6	0,9-6,3
25 a 34	9,9	5,5-14,3	8,6	3,1-14,1	10,9	4,3-17,5
35 a 44	18,3	13,8-22,8	13,8	7,8-19,7	22,1	15,6-28,6
45 a 54	32,7	26,5-38,8	27,8	18,2-37,4	36,9	29,0-44,8
55 a 64	30,9	23,0-38,8	20,1	10,7-29,6	40,0	28,5-51,4
65 e mais	31,4	23,7-39,0	14,1	4,6-23,5	42,7	32,6-52,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,3	11,8-18,8	9,5	5,3-13,7	20,4	15,0-25,8
9 a 11	14,3	11,9-16,7	11,3	8,1-14,5	16,5	13,1-19,9
12 e mais	19,4	15,2-23,5	22,3	15,3-29,3	16,7	12,0-21,4
Total	15,3	13,2-17,3	11,4	8,8-14,1	18,4	15,4-21,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,9	0,9-2,6	0,0	0,0-0,0	1,7	1,6-4,9
25 a 34	1,6	1,4-4,5	3,4	3,1-9,8	0,1	0,1-0,3
35 a 44	2,3	0,2-4,4	1,5	0,6-3,6	3,0	0,4-6,4
45 a 54	7,1	3,7-10,5	2,1	1,4-5,6	11,5	6,0-17,0
55 a 64	10,5	5,7-15,4	2,6	0,4-4,9	17,2	8,8-25,5
65 e mais	26,2	19,0-33,5	5,7	0,5-12,0	39,7	29,7-49,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,9	4,4-9,4	3,5	0,2-7,2	10,0	6,6-13,3
9 a 11	1,7	0,9-2,4	0,2	0,1-0,4	2,8	1,5-4,1
12 e mais	2,4	1,2-3,6	1,3	0,0-2,5	3,4	1,3-5,4
Total	4,4	3,1-5,6	2,0	0,0-4,0	6,3	4,6-8,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,9	0,7-5,2	0,3	0,3-1,0	5,1	1,0-9,3
25 a 34	2,9	0,9-5,0	1,0	0,1-2,2	4,5	0,9-8,0
35 a 44	1,6	0,1-3,0	0,8	0,7-2,3	2,3	0,1-4,6
45 a 54	1,5	0,3-2,7	1,3	0,6-3,1	1,7	0,1-3,2
55 a 64	0,5	0,2-1,1	0,6	0,6-1,8	0,3	0,3-1,0
65 e mais	1,4	0,2-3,1	1,6	1,5-4,6	1,3	0,5-3,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,7	0,3-3,1	0,5	0,2-1,1	2,8	0,3-5,4
9 a 11	2,8	1,4-4,2	1,4	0,3-2,5	3,8	1,6-6,1
12 e mais	2,3	1,0-3,6	0,4	0,3-1,1	4,1	1,8-6,5
Total	2,2	1,3-3,1	0,8	0,3-1,4	3,4	1,8-5,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,4	12,0-20,8	19,5	12,1-27,0	13,8	8,8-18,8
25 a 34	19,2	14,2-24,2	24,8	15,3-34,2	14,6	10,2-19,0
35 a 44	26,8	22,0-31,6	29,3	21,3-37,2	24,7	19,0-30,4
45 a 54	32,4	26,6-38,1	31,6	22,3-40,8	33,0	25,8-40,2
55 a 64	30,0	22,7-37,2	30,0	19,1-41,0	29,9	20,3-39,6
65 e mais	39,2	30,7-47,7	43,9	28,5-59,4	36,0	26,4-45,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,6	9,0-16,1	16,4	9,9-22,9	9,2	6,1-12,2
9 a 11	27,4	24,3-30,5	30,7	25,7-35,6	25,0	21,1-28,9
12 e mais	65,5	60,7-70,3	64,3	56,7-71,9	66,6	60,6-72,6
Total	23,5	21,1-25,9	26,5	22,4-30,6	21,1	18,4-23,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	59,5	49,3-69,8
26 a 30	69,4	58,3-80,5
31 a 35	80,5	71,4-89,6
36 a 40	72,5	63,5-81,5
41 a 45	73,8	63,5-84,1
46 a 50	63,1	51,3-74,8
Anos de escolaridade		
0 a 8	71,1	61,6-80,7
9 a 11	65,7	60,7-70,8
12 e mais	63,4	56,5-70,2
Total	71,4	66,7-76,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,8	4,6-13,0	4,8	0,6-10,1	12,1	5,8-18,5
25 a 34	12,9	7,8-17,9	14,8	6,4-23,1	11,3	5,2-17,3
35 a 44	9,8	6,3-13,3	9,3	3,9-14,7	10,2	5,6-14,8
45 a 54	12,0	7,8-16,2	11,7	4,9-18,5	12,2	7,0-17,4
55 a 64	12,9	6,9-18,8	7,9	1,3-14,5	17,0	7,8-26,3
65 e mais	17,1	10,2-23,9	14,1	2,2-26,0	19,0	10,8-27,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,1	9,3-16,9	11,8	6,2-17,5	14,2	9,1-19,3
9 a 11	9,4	7,2-11,5	8,6	5,4-11,7	9,9	7,0-12,8
12 e mais	10,2	7,2-13,2	6,5	2,2-10,9	13,5	9,3-17,7
Total	11,3	9,2-13,4	10,1	6,9-13,3	12,3	9,5-15,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	44,6	20,1-69,1	11,7	8,3-31,7	55,4	28,9-82,0
25 a 34	58,3	36,0-80,6	52,3	20,7-83,9	64,7	34,1-95,3
35 a 44	76,9	60,1-93,7	90,9	73,7-100,0	66,1	41,8-90,3
45 a 54	72,9	55,4-90,3	64,6	33,2-96,0	79,6	63,4-95,8
55 a 64	78,1	55,8-100,0	0,0	0,0-0,0	69,6	40,5-100,0
65 e mais	84,4	69,2-100,0	0,0	0,0-0,0	76,8	55,7-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	61,8	45,7-78,0	59,1	31,9-86,4	63,9	44,6-83,2
9 a 11	67,0	55,4-78,6	68,3	49,3-87,2	66,2	51,4-80,9
12 e mais	73,0	58,3-87,6	63,3	28,7-97,9	77,2	63,2-91,1
Total	64,5	54,1-74,9	62,4	44,1-80,6	66,0	53,9-78,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	28,3	12,3-44,4	47,8	24,1-71,5	9,9	3,8-16,0
25 a 34	15,9	10,7-21,1	19,1	10,4-27,8	12,9	7,3-18,5
35 a 44	19,6	15,2-23,9	22,1	15,2-29,1	17,3	12,0-22,6
45 a 54	25,8	20,4-31,2	29,8	20,8-38,9	22,3	16,1-28,6
55 a 64	23,0	16,7-29,3	24,4	13,7-35,1	21,8	14,4-29,3
65 e mais	11,9	7,2-16,5	18,0	8,4-27,6	7,9	3,6-12,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	26,3	19,7-33,0	38,3	26,6-50,0	16,0	12,0-20,0
9 a 11	14,7	11,7-17,7	17,1	12,1-22,0	12,6	9,1-16,2
12 e mais	14,2	10,9-17,4	12,3	7,6-17,1	15,9	11,4-20,3
Total	20,9	17,0-24,9	27,7	20,3-35,1	15,1	12,5-17,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,6	3,7-13,4	6,8	0,7-13,0	10,2	3,0-17,5
25 a 34	15,1	10,5-19,8	17,0	9,5-24,5	13,4	7,8-18,9
35 a 44	21,7	17,3-26,0	25,0	17,9-32,0	18,8	13,5-24,0
45 a 54	31,2	25,7-36,8	33,8	24,7-43,0	29,0	22,3-35,7
55 a 64	34,6	27,6-41,6	43,1	31,1-55,2	27,7	20,1-35,4
65 e mais	29,3	22,9-35,7	47,8	35,4-60,1	17,5	11,3-23,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,2	19,3-27,2	26,8	19,7-33,8	20,2	15,8-24,6
9 a 11	17,2	14,3-20,2	19,3	14,7-23,9	15,5	11,7-19,4
12 e mais	18,8	15,1-22,4	21,9	16,0-27,8	15,8	11,4-20,2
Total	20,8	18,4-23,1	23,8	19,8-27,9	18,1	15,4-20,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,5	0,2-1,2	0,6	0,6-1,7	0,4	0,4-1,2
25 a 34	4,1	1,2-7,1	6,6	0,9-12,2	1,9	0,1-3,8
35 a 44	5,4	2,9-7,9	6,2	2,3-10,1	4,7	1,5-7,9
45 a 54	10,2	6,6-13,9	13,3	6,9-19,8	7,6	3,7-11,4
55 a 64	11,2	6,3-16,1	13,2	4,8-21,5	9,6	4,0-15,3
65 e mais	5,9	2,3-9,4	11,1	3,0-19,2	2,5	0,1-4,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	7,1	5,0-9,2	9,8	5,7-13,9	4,7	2,7-6,7
9 a 11	3,1	1,7-4,4	3,6	1,2-5,9	2,7	1,1-4,2
12 e mais	3,9	2,1-5,7	4,8	1,8-7,8	3,1	1,1-5,1
Total	5,4	4,2-6,7	7,2	4,9-9,5	3,9	2,7-5,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	64,0	53,3-74,6	61,9	43,2-80,6	65,9	54,4-77,4
25 a 34	42,9	36,6-49,2	46,9	36,9-56,9	39,1	31,4-46,8
35 a 44	39,5	34,2-44,8	41,4	33,4-49,4	37,8	30,7-44,9
45 a 54	34,1	28,3-39,9	35,7	26,3-45,0	32,8	25,7-39,8
55 a 64	26,5	19,8-33,1	31,1	19,6-42,6	22,8	15,3-30,2
65 e mais	22,0	16,0-27,9	25,0	13,7-36,3	20,0	13,4-26,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	42,5	36,1-48,8	48,6	38,1-59,1	37,2	30,2-44,2
9 a 11	44,4	40,0-48,7	42,0	35,6-48,4	46,3	40,6-52,1
12 e mais	34,6	30,0-39,2	33,9	26,8-40,9	35,3	29,4-41,2
Total	41,6	37,8-45,3	44,0	37,7-50,4	39,4	35,2-43,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,7	13,6-31,8	27,9	11,7-44,1	18,5	7,7-29,2
25 a 34	41,4	35,1-47,8	53,4	43,3-63,5	29,6	22,5-36,8
35 a 44	51,3	45,8-56,7	59,2	51,2-67,1	43,8	36,6-51,1
45 a 54	56,4	50,3-62,5	67,5	58,4-76,6	45,9	38,2-53,7
55 a 64	60,6	53,2-68,1	63,0	51,0-75,0	58,6	49,3-67,9
65 e mais	58,6	51,4-65,8	56,3	44,0-68,6	60,4	51,9-68,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	47,0	41,2-52,8	51,0	41,0-60,9	43,3	36,6-50,1
9 a 11	40,0	35,8-44,2	49,8	43,3-56,3	31,7	26,5-36,8
12 e mais	50,1	45,4-54,9	64,8	57,6-72,0	36,2	30,4-42,0
Total	45,6	42,2-49,0	53,4	47,5-59,2	38,6	34,7-42,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,1	0,9-7,3	7,0	0,1-13,9	1,7	0,3-3,6
25 a 34	12,6	8,1-17,1	16,5	8,7-24,2	8,8	4,2-13,4
35 a 44	15,7	11,6-19,7	17,7	11,2-24,2	13,7	8,7-18,7
45 a 54	16,2	11,2-21,3	18,5	10,2-26,8	14,1	8,3-19,9
55 a 64	23,7	17,3-30,1	21,1	11,6-30,6	25,9	17,4-34,4
65 e mais	17,9	12,4-23,4	9,7	2,5-16,9	24,1	16,4-31,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,8	12,4-19,3	15,8	10,0-21,6	15,8	11,9-19,8
9 a 11	9,9	7,5-12,3	13,2	9,1-17,3	7,2	4,5-9,9
12 e mais	13,4	10,1-16,7	16,3	10,9-21,6	10,7	6,8-14,5
Total	13,7	11,7-15,7	15,2	11,8-18,6	12,3	10,1-14,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,9	11,4-26,4	20,1	7,4-32,8	17,8	9,3-26,3
25 a 34	29,4	23,5-35,3	27,3	18,0-36,6	31,3	23,9-38,8
35 a 44	32,3	27,6-37,1	24,0	17,6-30,5	39,7	32,9-46,5
45 a 54	38,0	32,4-43,6	30,7	22,3-39,2	44,2	36,8-51,5
55 a 64	49,3	41,9-56,6	40,9	29,0-52,8	55,9	46,8-65,0
65 e mais	52,3	45,3-59,2	44,2	32,0-56,4	57,5	49,4-65,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,8	25,2-34,5	24,3	17,0-31,6	34,6	29,1-40,2
9 a 11	31,2	27,4-35,1	26,4	20,9-31,9	35,3	30,0-40,6
12 e mais	46,2	41,5-50,9	41,6	34,4-48,8	50,6	44,5-56,6
Total	33,2	30,2-36,1	28,1	23,5-32,7	37,6	34,0-41,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,0	6,7-15,4	10,5	3,9-17,0	11,6	6,0-17,1
25 a 34	17,9	13,3-22,5	12,0	6,2-17,8	23,5	16,6-30,3
35 a 44	23,1	18,8-27,5	16,2	10,6-21,8	29,3	22,9-35,7
45 a 54	27,6	22,6-32,7	22,6	15,1-30,1	31,8	25,1-38,6
55 a 64	29,2	22,8-35,5	21,3	12,2-30,4	35,5	27,0-44,0
65 e mais	35,6	28,9-42,3	32,6	20,9-44,2	37,5	29,5-45,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,7	14,4-21,0	11,2	7,0-15,3	23,3	18,7-27,9
9 a 11	22,6	19,1-26,0	18,9	14,0-23,7	25,7	20,8-30,5
12 e mais	33,1	28,7-37,5	29,0	22,3-35,6	37,0	31,1-42,8
Total	21,8	19,5-24,1	16,6	13,5-19,7	26,4	23,3-29,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	40,9	26,9-55,0	54,8	32,7-76,9	27,9	12,4-43,4
25 a 34	40,1	33,7-46,5	53,2	43,4-63,1	27,8	20,6-35,1
35 a 44	36,4	31,2-41,6	51,0	43,0-58,9	23,5	17,6-29,4
45 a 54	29,2	23,6-34,8	35,9	26,5-45,2	23,5	17,1-29,9
55 a 64	27,3	20,6-34,0	39,2	27,3-51,1	17,7	11,0-24,4
65 e mais	16,7	11,5-22,0	26,7	15,8-37,6	10,4	5,7-15,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	37,7	31,5-43,9	53,3	43,1-63,4	24,3	17,7-30,9
9 a 11	33,9	29,8-38,1	44,0	37,5-50,5	25,5	20,4-30,6
12 e mais	25,7	21,4-29,9	34,3	27,2-41,3	17,6	12,9-22,2
Total	34,5	30,7-38,2	47,2	41,1-53,3	23,5	19,5-27,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	66,8	55,4-78,2	79,7	68,4-90,9	54,6	39,9-69,3
25 a 34	57,9	51,6-64,1	61,3	51,7-71,0	54,6	46,6-62,7
35 a 44	59,9	54,8-65,1	61,7	53,9-69,5	58,4	51,5-65,2
45 a 54	55,3	49,4-61,2	53,5	43,9-63,0	56,8	49,4-64,2
55 a 64	51,8	44,4-59,1	52,1	40,0-64,2	51,5	42,5-60,6
65 e mais	50,4	43,5-57,4	57,5	45,5-69,5	45,9	37,7-54,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	60,4	55,0-65,9	67,3	59,2-75,3	54,6	48,0-61,2
9 a 11	62,7	58,6-66,8	62,7	56,5-68,9	62,6	57,1-68,1
12 e mais	46,0	41,2-50,7	50,7	43,4-58,0	41,5	35,5-47,4
Total	58,4	55,1-61,8	62,9	57,8-68,0	54,5	50,5-58,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	48,1	34,7-61,6	50,3	27,5-73,0	46,1	31,4-60,9
25 a 34	37,3	30,9-43,6	37,5	27,8-47,2	37,0	28,8-45,3
35 a 44	26,6	21,8-31,4	34,2	26,5-41,9	19,8	14,1-25,6
45 a 54	18,5	13,9-23,1	23,5	15,6-31,4	14,3	9,0-19,5
55 a 64	16,4	10,9-21,9	15,8	7,4-24,3	16,8	9,7-24,0
65 e mais	6,8	3,5-10,1	7,3	1,6-13,0	6,5	2,4-10,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	32,0	25,5-38,5	34,5	23,4-45,7	29,9	22,6-37,2
9 a 11	31,7	27,6-35,8	36,9	30,6-43,3	27,3	22,0-32,6
12 e mais	18,8	15,0-22,5	23,4	17,2-29,6	14,3	10,0-18,6
Total	29,5	25,7-33,4	33,1	26,6-39,5	26,5	22,0-30,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,3	6,2-14,4	16,5	7,4-25,6	4,5	1,5-7,5
25 a 34	11,7	7,6-15,8	13,8	6,9-20,8	9,7	5,3-14,1
35 a 44	9,2	6,3-12,2	6,4	2,6-10,3	11,7	7,4-16,1
45 a 54	10,8	7,3-14,2	8,9	4,3-13,5	12,4	7,3-17,4
55 a 64	14,9	9,5-20,2	18,7	9,0-28,4	11,8	6,2-17,4
65 e mais	16,1	10,5-21,7	20,5	10,3-30,7	13,3	6,9-19,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,1	5,7-10,5	8,8	4,7-13,0	7,5	4,8-10,1
9 a 11	15,1	12,1-18,1	15,9	11,3-20,5	14,4	10,4-18,3
12 e mais	16,1	12,5-19,7	20,7	14,6-26,7	11,7	7,7-15,7
Total	11,5	9,7-13,2	13,0	10,0-15,9	10,1	8,2-12,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	48,9	35,6-62,3	70,0	54,3-85,8	29,0	18,1-40,0
25 a 34	53,7	47,3-60,1	63,3	53,7-72,8	44,7	36,7-52,8
35 a 44	48,8	43,5-54,1	52,5	44,5-60,4	45,5	38,5-52,6
45 a 54	45,1	39,1-51,0	53,8	44,2-63,3	37,7	30,5-44,8
55 a 64	31,0	24,1-38,0	44,2	32,0-56,3	20,5	13,6-27,4
65 e mais	9,8	5,8-13,7	12,7	4,6-20,8	7,9	4,1-11,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,9	38,8-51,0	61,1	52,1-70,0	31,0	25,4-36,7
9 a 11	48,0	43,7-52,3	54,1	47,6-60,5	42,9	37,3-48,6
12 e mais	36,5	31,9-41,2	40,6	33,3-47,8	32,7	26,9-38,5
Total	44,3	40,6-47,9	55,3	49,6-61,0	34,6	31,0-38,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	19,0	4,9-33,2	29,6	3,9-55,3	9,1	3,8-14,4
25 a 34	10,9	6,8-14,9	8,0	2,1-13,9	13,5	8,1-19,0
35 a 44	15,9	11,8-19,9	17,0	11,0-22,9	14,9	9,4-20,5
45 a 54	15,1	10,7-19,6	18,3	10,7-25,8	12,5	7,5-17,5
55 a 64	9,2	4,8-13,7	10,0	2,3-17,6	8,7	3,6-13,8
65 e mais	2,9	0,3-5,4	3,6	1,9-9,1	2,4	0,2-4,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,3	7,5-19,1	17,3	5,8-28,9	9,8	6,5-13,1
9 a 11	16,0	12,7-19,2	15,6	10,9-20,3	16,2	11,7-20,7
12 e mais	9,4	6,5-12,3	11,6	6,7-16,5	7,4	4,2-10,5
Total	13,3	10,0-16,7	15,8	9,3-22,3	11,2	8,9-13,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,8	14,5-31,2	4,1	0,5-7,7	40,5	27,3-53,8
25 a 34	41,1	34,9-47,3	15,4	8,5-22,3	65,0	57,5-72,6
35 a 44	45,5	40,3-50,8	12,7	7,5-17,8	74,7	69,0-80,3
45 a 54	40,3	34,6-45,9	9,4	4,7-14,0	66,5	59,4-73,6
55 a 64	32,6	26,0-39,2	5,8	1,0-10,5	54,1	45,0-63,2
65 e mais	35,8	29,4-42,3	17,2	8,8-25,6	47,8	39,7-56,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,8	35,5-46,2	9,8	5,8-13,9	67,5	60,6-74,4
9 a 11	40,6	36,4-44,7	15,7	11,3-20,2	61,4	55,6-67,1
12 e mais	20,2	16,7-23,8	6,8	3,1-10,5	33,0	27,4-38,6
Total	37,0	33,9-40,1	10,9	8,2-13,5	59,8	55,7-63,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,4	8,0-20,7	18,6	6,3-30,9	10,3	5,1-15,6
25 a 34	15,9	11,2-20,7	23,2	14,7-31,6	9,2	4,9-13,4
35 a 44	13,5	9,7-17,2	19,2	12,7-25,6	8,4	4,4-12,4
45 a 54	10,2	6,2-14,3	14,6	7,2-22,0	6,5	2,5-10,4
55 a 64	9,4	4,6-14,3	20,4	10,2-30,5	0,7	0,1-1,5
65 e mais	0,9	0,1-1,9	1,2	0,6-3,1	0,7	0,4-1,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,0	6,8-13,1	16,8	10,4-23,2	4,1	1,9-6,3
9 a 11	16,9	13,6-20,2	23,9	18,2-29,5	11,1	7,3-14,8
12 e mais	12,1	9,0-15,1	13,8	9,0-18,7	10,4	6,5-14,3
Total	12,2	10,2-14,3	18,1	14,2-22,1	7,1	5,4-8,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,6	0,3-1,5	0,4	0,4-1,2	0,8	0,8-2,4
25 a 34	0,4	0,1-1,0	0,9	0,2-2,1	0,0	0,0-0,0
35 a 44	1,3	0,0-2,7	2,9	0,1-5,7	0,0	0,0-0,0
45 a 54	1,7	0,6-4,1	3,5	1,5-8,5	0,2	0,2-0,7
55 a 64	0,2	0,2-0,7	0,5	0,5-1,6	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,9	0,1-1,7	1,9	0,1-3,7	0,0	0,0-0,0
9 a 11	0,5	0,1-1,2	0,4	0,2-0,9	0,7	0,4-1,8
12 e mais	1,0	0,1-1,8	2,0	0,1-3,8	0,0	0,0-0,0
Total	0,8	0,3-1,3	1,5	0,5-2,6	0,2	0,1-0,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,6	0,8-4,1	2,5	2,4-7,3	0,9	0,7-2,5
25 a 34	2,2	0,5-4,0	1,5	0,2-3,2	2,9	0,0-5,9
35 a 44	5,4	2,6-8,1	5,2	1,6-8,7	5,5	1,4-9,7
45 a 54	5,3	2,7-8,0	2,3	0,3-5,0	7,9	3,5-12,2
55 a 64	5,5	2,3-8,7	2,2	0,0-4,4	8,1	2,7-13,6
65 e mais	9,5	5,6-13,4	6,5	0,3-12,8	11,4	6,5-16,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,0	4,1-7,9	4,2	1,6-6,8	7,6	4,8-10,3
9 a 11	2,7	1,5-4,0	2,6	0,6-4,6	2,9	1,2-4,5
12 e mais	1,2	0,4-1,9	0,7	0,1-1,4	1,7	0,4-2,9
Total	4,2	3,1-5,3	3,1	1,6-4,6	5,2	3,7-6,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	92,0	87,2-96,8	79,3	72,3-86,3
55 a 59	84,1	76,9-91,3	66,5	57,3-75,7
Anos de escolaridade				
0 a 8	86,8	81,5-92,0	69,7	62,6-76,8
9 a 11	94,8	89,2-100,0	87,0	79,0-95,0
12 e mais	97,0	93,3-100,0	91,2	84,6-97,9
Total	89,0	84,9-93,1	74,4	68,8-80,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	94,8	91,5-98,2	93,7	90,0-97,4
35 a 44	98,7	97,1-100,0	93,0	89,1-97,0
45 a 54	97,0	93,8-100,0	91,5	86,9-96,1
55 a 59	98,8	96,6-100,0	90,4	82,7-98,0
Anos de escolaridade				
0 a 8	97,5	95,5-99,5	90,9	87,4-94,4
9 a 11	94,6	90,6-98,5	93,1	88,9-97,3
12 e mais	98,2	96,1-100,0	97,1	94,6-99,6
Total	96,9	95,4-98,5	92,7	90,5-95,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	23,9	15,7-32,2	13,9	5,9-21,9	33,4	21,3-45,6
25 a 34	32,4	26,8-38,0	18,6	11,5-25,6	45,3	37,4-53,3
35 a 44	35,4	30,5-40,4	20,3	14,1-26,5	48,9	41,8-56,0
45 a 54	32,9	27,5-38,3	19,5	12,2-26,9	44,2	36,9-51,6
55 a 64	29,0	22,9-35,2	13,2	7,0-19,4	41,7	32,8-50,6
65 e mais	22,1	17,0-27,3	7,3	2,5-12,2	31,6	24,3-39,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,3	17,4-25,3	8,7	4,7-12,7	32,2	26,4-38,0
9 a 11	33,7	29,7-37,7	19,2	14,3-24,1	45,8	40,1-51,5
12 e mais	51,6	46,8-56,3	36,4	29,3-43,5	65,9	60,2-71,7
Total	30,2	27,4-33,0	16,8	13,6-20,0	41,9	38,0-45,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,7	1,0-12,5	9,5	1,3-20,3	4,2	0,5-8,8
25 a 34	9,1	5,8-12,4	10,5	5,3-15,8	7,7	3,6-11,8
35 a 44	23,7	18,9-28,4	19,0	12,7-25,3	27,8	20,9-34,7
45 a 54	42,4	36,4-48,4	45,2	35,5-54,9	40,1	32,6-47,5
55 a 64	58,0	50,7-65,2	59,0	47,2-70,7	57,2	48,2-66,2
65 e mais	63,0	56,3-69,7	54,5	42,1-66,9	68,5	61,2-75,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,4	29,6-39,2	29,6	22,0-37,3	38,6	32,9-44,3
9 a 11	15,0	12,4-17,7	15,9	11,7-20,2	14,3	10,9-17,7
12 e mais	18,9	15,1-22,6	24,8	18,4-31,2	13,2	9,3-17,2
Total	26,3	23,7-28,9	25,0	20,7-29,3	27,4	24,2-30,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,3	0,3-0,8	0,6	0,6-1,7	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,7	0,1-1,3	0,9	0,1-2,0	0,4	0,2-1,1
35 a 44	3,6	1,4-5,8	4,6	1,1-8,1	2,8	0,1-5,4
45 a 54	10,9	7,0-14,8	7,9	2,6-13,1	13,4	7,9-19,0
55 a 64	18,3	12,3-24,2	17,1	7,5-26,8	19,2	11,7-26,6
65 e mais	23,8	18,0-29,6	24,7	14,4-35,0	23,2	16,4-30,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	9,5	7,4-11,7	7,7	4,6-10,8	11,1	8,2-14,0
9 a 11	3,2	2,0-4,5	4,0	1,9-6,2	2,6	1,3-3,9
12 e mais	2,5	1,1-3,9	3,7	1,1-6,3	1,3	0,1-2,5
Total	6,5	5,3-7,7	6,0	4,2-7,8	7,0	5,4-8,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,1	0,1-0,4	0,3	0,3-0,8	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,8	0,5-2,0	1,6	1,0-4,2	0,0	0,0-0,0
35 a 44	2,3	0,1-4,6	2,8	0,1-5,6	1,9	1,5-5,3
45 a 54	4,6	1,8-7,4	7,1	1,7-12,6	2,4	0,5-4,4
55 a 64	5,7	2,7-8,7	2,8	0,1-5,8	8,0	3,2-12,8
65 e mais	12,2	7,8-16,6	14,0	5,7-22,2	11,0	6,1-15,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,3	2,8-5,8	4,5	2,0-7,0	4,1	2,2-6,0
9 a 11	1,7	0,8-2,6	2,1	0,4-3,8	1,3	0,4-2,2
12 e mais	1,4	0,4-2,5	2,6	0,4-4,7	0,4	0,2-1,0
Total	3,1	2,2-4,0	3,5	2,0-5,0	2,7	1,6-3,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,6	0,1-5,0	1,3	0,4-3,0	3,8	0,7-8,2
25 a 34	6,1	3,8-8,5	3,4	1,2-5,7	8,7	4,8-12,6
35 a 44	17,8	13,6-22,0	22,4	15,7-29,2	13,6	8,5-18,7
45 a 54	27,4	22,0-32,7	26,4	17,8-35,0	28,2	21,6-34,8
55 a 64	33,1	26,1-40,1	30,6	19,3-42,0	35,2	26,4-43,9
65 e mais	32,8	26,5-39,2	21,4	11,2-31,5	40,2	32,3-48,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	18,2	15,0-21,4	14,1	9,5-18,7	21,7	17,5-26,0
9 a 11	11,0	8,8-13,3	9,5	6,2-12,8	12,3	9,2-15,4
12 e mais	17,5	13,9-21,1	22,0	15,8-28,2	13,3	9,5-17,1
Total	16,1	14,2-18,0	14,3	11,4-17,3	17,6	15,1-20,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,2	0,2-0,5	0,0	0,0-0,0	0,3	0,3-0,9
35 a 44	2,9	1,0-4,8	3,3	0,3-6,4	2,5	0,2-4,8
45 a 54	4,1	2,0-6,2	0,2	0,1-0,4	7,5	3,7-11,3
55 a 64	9,0	5,5-12,6	0,0	0,0-0,0	16,2	10,1-22,4
65 e mais	23,1	17,5-28,7	6,6	0,6-12,5	33,8	26,0-41,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,1	4,5-7,6	2,1	0,5-3,6	9,5	7,0-11,9
9 a 11	2,3	1,3-3,3	0,0	0,0-0,0	4,2	2,5-6,0
12 e mais	1,8	0,8-2,7	0,7	0,0-1,4	2,8	1,0-4,5
Total	4,3	3,4-5,1	1,3	0,4-2,1	6,9	5,4-8,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,0	1,8-12,3	9,9	0,4-20,1	4,3	0,7-7,9
25 a 34	6,8	3,3-10,3	7,5	1,7-13,3	6,2	2,2-10,3
35 a 44	2,3	0,8-3,8	1,8	0,5-4,1	2,7	0,7-4,8
45 a 54	4,5	2,0-7,0	1,1	0,6-2,7	7,3	3,0-11,6
55 a 64	5,5	2,0-8,9	1,2	1,1-3,4	8,9	3,1-14,8
65 e mais	8,0	4,5-11,6	4,7	0,3-9,0	10,2	5,1-15,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,7	3,2-8,2	6,0	1,3-10,6	5,5	3,1-7,9
9 a 11	5,5	3,3-7,6	3,7	1,1-6,3	6,9	3,7-10,2
12 e mais	5,0	3,0-7,0	4,1	1,2-6,9	5,9	3,2-8,6
Total	5,5	4,0-7,0	5,0	2,4-7,7	6,0	4,3-7,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	32,8	23,3-42,4	30,5	15,4-45,6	35,1	23,8-46,3
25 a 34	48,6	42,2-55,0	50,1	40,1-60,1	47,2	39,2-55,2
35 a 44	53,6	48,3-58,9	55,4	47,4-63,5	52,0	44,9-59,1
45 a 54	47,6	41,7-53,6	40,9	31,7-50,1	53,4	45,9-60,9
55 a 64	47,2	39,9-54,5	42,2	30,6-53,7	51,3	42,1-60,4
65 e mais	56,3	49,3-63,4	51,7	39,3-64,1	59,4	51,1-67,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,0	29,1-38,8	30,1	22,2-37,9	37,3	31,6-43,1
9 a 11	48,3	44,0-52,5	50,0	43,5-56,4	46,8	41,1-52,5
12 e mais	84,1	80,7-87,6	82,0	76,3-87,7	86,2	82,1-90,2
Total	47,0	43,5-50,4	45,2	39,5-50,9	48,5	44,5-52,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	70,0	58,2-81,7
26 a 30	80,0	71,1-88,9
31 a 35	69,8	58,1-81,4
36 a 40	76,4	68,2-84,6
41 a 45	69,4	59,0-79,7
46 a 50	55,1	43,9-66,3
Anos de escolaridade		
0 a 8	70,0	60,9-79,0
9 a 11	72,7	66,9-78,5
12 e mais	72,4	66,2-78,7
Total	65,5	60,2-70,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,2	5,3-19,1	12,2	1,5-22,9	12,2	3,4-21,1
25 a 34	12,3	8,5-16,1	6,2	1,4-11,1	18,0	12,3-23,7
35 a 44	16,4	12,6-20,2	11,3	6,4-16,2	20,9	15,4-26,5
45 a 54	17,1	12,9-21,3	10,2	5,1-15,4	22,9	16,7-29,1
55 a 64	17,1	11,6-22,6	7,6	1,7-13,5	24,8	16,5-33,0
65 e mais	14,0	9,3-18,6	11,1	3,7-18,6	15,8	9,9-21,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,3	10,9-17,7	9,0	4,2-13,8	18,8	14,3-23,4
9 a 11	13,3	10,5-16,1	10,1	6,3-13,9	16,0	11,9-20,0
12 e mais	17,0	13,5-20,5	11,0	6,4-15,6	22,6	17,5-27,7
Total	14,5	12,4-16,6	9,7	6,7-12,6	18,7	15,8-21,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	64,3	34,4-94,2	48,8	6,4-91,3	78,9	56,1-100,0
25 a 34	66,8	51,1-82,5	93,2	79,5-100,0	58,3	40,6-75,9
35 a 44	83,4	73,9-92,9	87,7	70,0-100,0	81,4	70,2-92,7
45 a 54	76,5	65,4-87,6	68,0	43,4-92,7	79,7	67,6-91,7
55 a 64	87,6	76,1-100,0	79,4	43,7-100,0	89,4	78,1-100,0
65 e mais	86,8	75,9-100,0	92,3	77,2-100,0	84,3	70,3-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	73,3	61,1-85,5	66,1	34,8-97,4	76,2	65,8-86,7
9 a 11	73,3	62,6-84,0	76,7	59,4-93,9	71,5	58,1-85,0
12 e mais	86,6	78,8-94,4	93,5	81,2-100,0	83,5	73,7-93,2
Total	76,2	68,8-83,5	75,1	57,2-93,0	76,6	69,7-83,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,8	6,4-23,3	22,9	7,9-38,0	7,9	0,1-15,9
25 a 34	8,5	4,1-12,8	7,9	3,8-12,0	9,0	1,8-16,1
35 a 44	17,9	11,7-24,1	28,0	17,7-38,4	9,6	2,9-16,4
45 a 54	14,9	10,3-19,5	20,8	12,6-29,0	9,8	5,2-14,5
55 a 64	10,5	6,1-14,9	16,8	8,6-25,0	5,3	1,3-9,3
65 e mais	4,3	1,5-7,0	5,9	0,7-11,0	3,2	0,3-6,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,2	11,6-20,8	21,3	13,7-29,0	11,6	6,4-16,9
9 a 11	8,1	6,1-10,1	14,4	10,1-18,7	3,8	2,1-5,5
12 e mais	5,8	3,7-7,9	9,6	5,5-13,7	2,2	0,7-3,8
Total	12,8	9,9-15,7	18,3	13,2-23,3	8,3	5,1-11,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	7,8	2,8-12,7	9,3	0,0-18,6	6,5	2,0-11,0
25 a 34	13,3	7,7-19,0	20,2	9,8-30,7	7,7	2,5-12,9
35 a 44	16,7	11,9-21,5	15,3	8,7-21,9	17,8	11,0-24,6
45 a 54	35,4	29,0-41,9	44,1	33,7-54,4	27,9	20,2-35,7
55 a 64	44,5	36,8-52,3	57,6	46,5-68,7	33,9	23,5-44,2
65 e mais	41,2	33,1-49,3	56,6	43,0-70,1	30,8	21,8-39,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,4	19,2-27,6	28,2	21,0-35,3	19,2	14,5-23,9
9 a 11	13,7	11,0-16,3	17,7	13,0-22,4	10,9	7,9-14,0
12 e mais	15,1	11,5-18,6	20,0	13,8-26,3	10,4	6,9-13,9
Total	19,7	17,1-22,3	24,5	19,9-29,2	15,7	12,9-18,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,4	0,8-5,5	2,2	1,6-6,0	2,5	2,3-7,2
25 a 34	3,1	0,4-6,6	1,1	0,1-2,3	4,8	1,4-10,9
35 a 44	4,4	0,9-7,9	8,1	0,9-15,4	1,4	0,5-3,4
45 a 54	2,9	0,5-5,3	5,2	0,1-10,2	0,9	0,0-1,9
55 a 64	3,7	1,2-6,1	7,5	2,2-12,8	0,5	0,2-1,3
65 e mais	1,5	0,2-3,2	2,3	0,9-5,4	1,0	0,9-2,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,4	2,0-6,8	5,2	2,0-8,4	3,8	0,3-7,3
9 a 11	0,9	0,3-1,5	1,5	0,2-2,9	0,4	0,0-0,8
12 e mais	1,6	0,4-2,8	2,6	0,3-5,0	0,6	0,2-1,3
Total	3,1	1,6-4,6	3,9	1,9-6,0	2,4	0,3-4,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	47,7	37,4-58,0	45,9	30,1-61,6	49,3	36,0-62,6
25 a 34	42,0	34,4-49,6	36,6	25,2-48,1	46,4	36,6-56,1
35 a 44	36,0	29,6-42,4	33,7	24,4-43,0	37,8	29,1-46,6
45 a 54	34,9	28,5-41,4	38,2	28,0-48,5	32,1	23,9-40,2
55 a 64	29,3	22,0-36,6	32,8	21,9-43,7	26,5	16,7-36,2
65 e mais	21,4	14,6-28,2	15,5	5,7-25,4	25,4	16,4-34,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,1	34,2-46,0	37,4	28,8-45,9	42,6	34,6-50,5
9 a 11	38,3	34,4-42,2	37,4	31,2-43,6	38,9	33,9-44,0
12 e mais	33,5	29,1-38,0	34,6	27,7-41,5	32,5	26,9-38,2
Total	38,9	35,2-42,7	37,1	31,4-42,8	40,5	35,4-45,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,7	8,7-28,6	15,4	6,1-24,7	21,9	5,1-38,6
25 a 34	32,3	24,9-39,7	34,4	22,9-45,9	30,5	20,8-40,1
35 a 44	41,3	34,3-48,3	47,8	37,6-57,9	35,2	25,3-45,0
45 a 54	55,4	48,4-62,3	61,7	51,5-71,9	49,1	39,9-58,4
55 a 64	55,1	46,8-63,3	54,4	43,0-65,7	55,8	43,8-67,8
65 e mais	48,5	38,9-58,0	40,0	25,5-54,6	55,9	44,0-67,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	39,1	32,8-45,4	34,8	26,6-42,9	43,8	34,6-53,0
9 a 11	31,2	27,4-34,9	39,2	33,0-45,4	25,2	20,6-29,9
12 e mais	40,4	35,7-45,1	54,8	47,5-62,2	26,6	21,2-32,1
Total	36,7	32,9-40,5	38,3	32,8-43,7	35,1	29,8-40,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,7	0,4-10,9	7,0	1,4-15,5	4,3	1,9-10,6
25 a 34	9,2	4,2-14,1	11,8	3,2-20,4	6,7	1,4-12,1
35 a 44	9,4	5,6-13,1	14,9	8,1-21,8	4,1	0,9-7,3
45 a 54	19,5	14,0-25,1	17,0	9,2-24,7	22,1	14,3-29,9
55 a 64	17,6	10,6-24,6	15,1	6,9-23,3	20,3	8,9-31,8
65 e mais	16,4	9,2-23,6	5,8	0,5-12,1	25,6	14,2-37,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,9	9,0-16,7	12,6	6,9-18,4	13,1	8,1-18,2
9 a 11	7,4	5,4-9,4	9,5	5,8-13,2	5,9	3,6-8,1
12 e mais	10,2	7,1-13,2	14,5	8,9-20,0	6,1	3,3-8,8
Total	10,8	8,5-13,1	12,0	8,3-15,7	9,7	6,9-12,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,4	14,5-30,4	22,8	9,2-36,4	22,1	12,9-31,2
25 a 34	21,3	15,4-27,2	12,8	4,1-21,4	28,2	20,2-36,3
35 a 44	24,2	18,8-29,7	19,8	12,6-26,9	27,9	19,9-35,8
45 a 54	29,6	23,8-35,5	24,9	16,4-33,5	33,7	25,8-41,6
55 a 64	31,5	24,4-38,6	29,8	19,5-40,1	32,9	23,1-42,8
65 e mais	29,0	22,0-36,0	28,4	16,5-40,4	29,4	20,8-37,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,0	15,5-24,5	17,1	10,0-24,2	22,6	16,8-28,3
9 a 11	29,1	25,5-32,8	22,6	17,3-27,8	33,6	28,7-38,5
12 e mais	38,7	34,2-43,3	37,1	30,0-44,3	40,3	34,5-46,0
Total	24,6	21,5-27,6	20,7	15,9-25,4	27,8	23,9-31,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,3	6,6-16,0	8,8	3,5-14,1	13,4	6,1-20,8
25 a 34	12,1	7,3-17,0	7,9	0,2-15,5	15,6	9,4-21,9
35 a 44	15,5	11,0-20,0	13,4	7,0-19,8	17,2	11,0-23,4
45 a 54	15,2	10,7-19,7	14,0	7,1-20,8	16,2	10,2-22,1
55 a 64	15,6	10,2-20,9	16,8	8,5-25,0	14,6	7,6-21,6
65 e mais	13,3	8,1-18,5	14,4	4,9-23,9	12,6	6,7-18,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,6	7,4-13,7	8,3	3,9-12,6	12,6	8,1-17,1
9 a 11	16,7	13,7-19,7	14,8	10,3-19,3	18,0	14,0-21,9
12 e mais	20,6	16,9-24,3	19,0	13,4-24,7	22,0	17,2-26,9
Total	13,4	11,2-15,5	11,1	8,0-14,2	15,2	12,2-18,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	33,5	24,2-42,8	38,0	22,4-53,5	29,6	19,0-40,2
25 a 34	38,7	30,9-46,5	51,9	39,4-64,4	27,9	19,1-36,6
35 a 44	33,4	27,0-39,8	49,4	39,3-59,4	20,4	13,4-27,4
45 a 54	28,2	22,2-34,2	39,4	29,4-49,3	18,5	11,8-25,2
55 a 64	21,0	14,9-27,0	36,9	25,9-47,9	7,9	3,6-12,3
65 e mais	11,5	6,7-16,4	22,1	11,5-32,8	4,4	1,1-7,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,1	23,5-34,6	40,5	31,5-49,6	18,9	12,9-25,0
9 a 11	35,1	31,2-39,0	47,5	41,1-53,9	26,7	22,0-31,4
12 e mais	38,1	33,5-42,8	48,0	40,6-55,4	28,9	23,5-34,3
Total	31,8	28,2-35,3	43,2	37,2-49,2	22,4	18,5-26,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	61,1	50,7-71,6	66,1	50,3-81,9	56,9	43,2-70,6
25 a 34	61,4	53,6-69,2	55,5	42,7-68,3	66,3	57,0-75,5
35 a 44	67,7	61,4-73,9	62,7	52,8-72,6	71,7	63,7-79,6
45 a 54	62,0	55,7-68,4	58,3	48,1-68,5	65,3	57,4-73,1
55 a 64	54,8	47,1-62,5	52,2	40,9-63,5	57,0	46,5-67,4
65 e mais	48,3	40,2-56,4	49,5	35,7-63,3	47,5	37,6-57,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	59,1	53,2-65,0	56,2	47,2-65,3	61,6	53,8-69,4
9 a 11	66,7	62,9-70,5	66,9	60,9-73,0	66,6	61,7-71,5
12 e mais	59,2	54,6-63,9	60,5	53,1-67,9	58,0	52,2-63,8
Total	61,4	57,6-65,2	59,5	53,5-65,5	62,9	58,0-67,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,8	11,6-26,1	11,2	4,4-18,0	25,4	13,9-36,9
25 a 34	20,1	14,0-26,2	25,9	15,0-36,9	15,3	9,0-21,6
35 a 44	11,4	7,4-15,4	10,8	5,5-16,1	11,8	6,0-17,6
45 a 54	8,4	5,1-11,6	8,1	3,2-13,0	8,6	4,3-12,8
55 a 64	7,6	3,7-11,5	11,5	4,1-19,0	4,4	0,9-7,8
65 e mais	7,9	3,0-12,8	15,9	4,8-27,0	2,5	0,2-4,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,6	8,5-16,6	12,8	7,2-18,4	12,4	6,6-18,2
9 a 11	18,6	15,3-21,9	20,0	14,8-25,2	17,6	13,4-21,9
12 e mais	15,6	12,2-18,9	14,3	9,3-19,2	16,8	12,3-21,4
Total	14,7	12,0-17,3	14,9	11,0-18,7	14,5	10,8-18,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,4	13,1-27,6	29,5	15,9-43,0	12,6	6,2-19,0
25 a 34	13,8	8,8-18,8	13,5	5,8-21,1	14,0	7,4-20,7
35 a 44	13,4	9,0-17,7	13,1	7,1-19,0	13,6	7,4-19,8
45 a 54	13,1	9,1-17,1	14,4	7,7-21,1	12,0	7,2-16,7
55 a 64	16,1	10,1-22,1	12,0	5,4-18,6	19,4	10,1-28,8
65 e mais	13,6	8,0-19,1	23,5	11,6-35,4	6,9	3,1-10,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,9	9,0-16,8	16,0	9,4-22,5	10,2	5,9-14,5
9 a 11	18,9	15,7-22,1	21,6	16,3-26,8	17,1	13,1-21,1
12 e mais	20,6	16,9-24,2	22,8	16,9-28,6	18,5	13,9-23,0
Total	15,4	12,9-18,0	18,2	13,7-22,6	13,2	10,3-16,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	32,0	22,1-42,0	43,1	26,8-59,3	22,6	11,8-33,5
25 a 34	48,6	40,9-56,4	60,2	48,2-72,3	39,1	29,6-48,7
35 a 44	45,9	39,2-52,7	55,7	45,8-65,7	38,0	29,4-46,7
45 a 54	46,4	39,7-53,1	53,8	43,5-64,0	40,0	31,5-48,5
55 a 64	30,3	23,1-37,4	37,4	26,3-48,5	24,4	15,3-33,5
65 e mais	14,6	8,7-20,5	26,6	14,2-39,0	6,6	2,4-10,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,9	35,1-46,8	54,6	45,6-63,6	28,9	21,8-35,9
9 a 11	38,6	34,8-42,5	44,4	38,1-50,7	34,7	29,9-39,6
12 e mais	38,0	33,4-42,6	39,6	32,4-46,9	36,5	30,7-42,2
Total	40,0	36,2-43,7	50,3	44,3-56,3	31,5	27,0-35,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,0	9,5-26,5	23,5	9,2-37,9	13,3	3,7-22,9
25 a 34	21,6	14,6-28,7	29,9	17,5-42,3	14,8	7,8-21,9
35 a 44	21,5	15,3-27,6	27,1	16,9-37,2	16,9	9,6-24,3
45 a 54	19,3	13,4-25,1	20,0	10,9-29,1	18,7	11,1-26,2
55 a 64	13,1	7,7-18,5	21,2	11,2-31,2	6,5	1,7-11,3
65 e mais	4,6	1,4-7,9	7,6	0,5-14,7	2,6	0,2-5,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	24,2	19,1-29,4	32,2	23,6-40,7	17,2	11,4-23,1
9 a 11	11,3	8,8-13,8	13,7	9,4-18,0	9,7	6,7-12,6
12 e mais	6,0	3,6-8,3	4,2	0,9-7,6	7,6	4,3-10,9
Total	18,6	15,3-21,9	24,3	18,7-30,0	13,9	10,3-17,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	37,2	27,0-47,4	17,0	5,8-28,2	54,4	41,7-67,1
25 a 34	37,7	30,2-45,2	14,1	4,4-23,7	57,1	47,6-66,6
35 a 44	37,4	30,9-43,8	10,3	5,2-15,4	59,2	50,2-68,2
45 a 54	38,0	31,7-44,3	10,0	4,7-15,4	62,4	54,1-70,6
55 a 64	31,6	24,2-38,9	12,1	5,0-19,3	47,4	36,8-58,1
65 e mais	20,9	14,4-27,4	16,2	5,7-26,6	24,0	15,8-32,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	38,2	32,4-43,9	13,6	7,3-20,0	59,9	52,5-67,2
9 a 11	37,4	33,5-41,2	14,2	10,1-18,3	53,1	47,9-58,2
12 e mais	18,0	14,4-21,6	10,7	6,0-15,4	24,8	19,7-30,0
Total	36,0	32,3-39,7	13,5	9,3-17,6	54,5	49,7-59,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,7	11,8-25,7	26,1	13,5-38,7	12,4	5,5-19,4
25 a 34	31,5	23,9-39,1	53,3	40,8-65,7	13,6	7,3-20,0
35 a 44	23,6	17,5-29,8	41,1	30,8-51,4	9,5	4,0-15,0
45 a 54	17,8	12,7-22,9	34,3	24,6-44,0	3,5	1,5-5,5
55 a 64	12,6	7,4-17,8	25,7	15,5-36,0	1,9	0,2-4,1
65 e mais	4,6	0,8-8,4	11,2	2,2-20,3	0,1	0,1-0,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,1	15,2-25,0	34,5	25,8-43,2	7,3	3,3-11,4
9 a 11	22,8	19,4-26,3	39,9	33,6-46,2	11,3	7,8-14,8
12 e mais	27,4	23,0-31,7	40,6	33,3-48,0	14,9	10,7-19,1
Total	21,6	18,4-24,8	36,6	30,8-42,3	9,3	6,6-12,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,9	0,8-2,9	3,4	1,2-5,6	0,6	0,2-1,4
25 a 34	4,2	1,2-7,1	8,3	2,0-14,5	0,8	0,6-2,3
35 a 44	4,7	1,4-8,0	10,6	3,5-17,6	0,0	0,0-0,0
45 a 54	3,8	1,7-6,0	7,8	3,2-12,4	0,4	0,2-1,0
55 a 64	1,3	0,3-2,9	2,9	0,7-6,4	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,3	0,6-3,9	4,8	1,3-8,3	0,0	0,0-0,0
9 a 11	4,4	2,7-6,0	9,1	5,6-12,6	1,1	0,2-2,5
12 e mais	5,3	3,2-7,4	10,4	6,3-14,5	0,5	0,2-1,1
Total	3,2	2,0-4,3	6,5	4,1-9,0	0,4	0,0-0,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,9	0,4-6,2	0,7	0,1-1,4	4,8	1,2-10,8
25 a 34	2,3	0,4-4,2	1,1	0,2-2,4	3,3	0,1-6,5
35 a 44	2,9	0,8-5,0	1,6	0,2-3,3	3,9	0,5-7,4
45 a 54	5,7	2,4-8,9	3,1	0,1-6,2	7,9	2,6-13,2
55 a 64	8,4	4,1-12,8	14,6	6,4-22,7	3,4	0,5-7,3
65 e mais	12,0	6,4-17,6	4,9	1,4-11,3	16,8	8,7-25,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,4	3,4-7,4	2,7	1,2-4,1	7,8	4,3-11,3
9 a 11	2,2	1,2-3,3	2,2	0,6-3,8	2,2	0,9-3,6
12 e mais	1,8	0,5-3,0	2,5	0,2-4,8	1,1	0,1-2,2
Total	4,1	2,9-5,4	2,5	1,5-3,6	5,4	3,3-7,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	90,9	85,4-96,4	77,1	69,1-85,1
55 a 59	87,2	79,0-95,5	79,8	70,5-89,2
Anos de escolaridade				
0 a 8	87,0	80,8-93,2	74,4	66,3-82,6
9 a 11	95,4	91,6-99,2	84,1	76,3-91,9
12 e mais	100,0	0,0-100,0	96,4	92,1-100,0
Total	89,6	85,0-94,2	78,0	71,9-84,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	70,7	61,6-79,7	65,9	56,7-75,1
35 a 44	90,3	84,8-95,7	85,6	79,6-91,7
45 a 54	93,6	90,0-97,2	87,6	82,6-92,7
55 a 59	98,0	95,4-100,0	77,2	64,7-89,6
Anos de escolaridade				
0 a 8	86,7	79,8-93,7	81,0	73,7-88,4
9 a 11	76,8	70,8-82,8	70,3	64,1-76,5
12 e mais	85,7	80,3-91,1	81,1	75,3-86,9
Total	83,3	78,9-87,7	77,4	72,8-82,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	26,2	18,6-33,8	10,6	5,0-16,3	39,5	27,3-51,7
25 a 34	30,6	24,1-37,2	12,4	6,3-18,5	45,6	36,1-55,1
35 a 44	34,0	27,7-40,3	24,7	15,9-33,4	41,6	32,8-50,4
45 a 54	26,8	21,1-32,4	16,5	8,8-24,2	35,7	27,7-43,7
55 a 64	22,4	16,0-28,7	9,9	4,3-15,6	32,6	22,6-42,5
65 e mais	12,3	7,9-16,6	4,8	0,1-9,7	17,3	10,9-23,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,4	17,0-25,9	9,2	5,1-13,3	32,2	25,1-39,3
9 a 11	36,0	32,1-39,9	22,9	17,2-28,6	44,9	39,8-50,1
12 e mais	43,1	38,5-47,7	24,1	17,9-30,4	61,0	55,2-66,7
Total	27,9	24,8-30,9	14,4	11,2-17,6	38,9	34,4-43,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	10,6	3,1-18,2	10,3	0,2-20,8	10,9	0,3-21,5
25 a 34	8,7	4,6-12,8	4,1	1,7-6,6	12,5	5,5-19,5
35 a 44	16,6	11,6-21,6	15,6	8,4-22,8	17,4	10,5-24,4
45 a 54	33,8	27,4-40,1	31,9	22,4-41,4	35,4	27,0-43,8
55 a 64	42,3	34,6-49,9	38,6	27,8-49,5	45,2	34,6-55,8
65 e mais	57,4	49,3-65,5	42,5	28,9-56,0	67,5	58,1-76,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,9	19,4-28,3	17,6	11,9-23,4	29,4	22,9-35,9
9 a 11	13,0	10,4-15,5	12,4	8,2-16,6	13,3	10,2-16,5
12 e mais	16,4	12,6-20,3	22,2	15,6-28,9	11,0	7,3-14,7
Total	19,9	17,1-22,7	16,7	12,9-20,5	22,5	18,6-26,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	2,7	0,4-5,8	0,3	0,3-1,0	4,7	0,8-10,1
35 a 44	1,9	0,2-3,7	1,8	0,7-4,4	2,0	0,3-4,3
45 a 54	9,0	4,6-13,3	10,4	3,4-17,4	7,7	2,4-13,1
55 a 64	13,4	8,3-18,4	13,3	5,9-20,7	13,4	6,5-20,4
65 e mais	23,6	16,5-30,7	21,6	9,4-33,9	24,9	16,3-33,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,5	4,4-8,5	4,7	2,4-7,0	8,0	4,8-11,3
9 a 11	2,2	1,1-3,4	2,8	1,1-4,6	1,8	0,4-3,3
12 e mais	3,0	1,1-4,8	4,3	0,8-7,8	1,7	0,4-3,0
Total	4,9	3,6-6,1	4,2	2,6-5,7	5,5	3,5-7,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,9	0,5-2,3	0,0	0,0-0,0	1,7	0,9-4,3
25 a 34	0,1	0,1-0,4	0,0	0,0-0,0	0,2	0,2-0,6
35 a 44	1,1	0,0-2,2	1,4	0,4-3,2	0,9	0,4-2,1
45 a 54	2,6	0,6-4,6	1,8	0,3-4,0	3,3	0,1-6,5
55 a 64	2,9	0,6-5,2	5,1	0,2-10,0	1,1	0,0-2,2
65 e mais	8,0	3,6-12,4	12,9	3,3-22,5	4,7	1,4-8,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,9	0,9-2,8	2,0	0,7-3,2	1,8	0,4-3,1
9 a 11	1,3	0,4-2,2	1,1	0,3-2,5	1,4	0,3-2,6
12 e mais	0,8	0,1-1,7	1,5	0,3-3,3	0,2	0,2-0,7
Total	1,6	1,0-2,2	1,7	0,8-2,6	1,5	0,7-2,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,4	1,6-5,3	2,8	0,8-4,8	4,0	1,1-6,8
25 a 34	9,3	5,0-13,5	4,3	1,4-7,2	13,3	6,2-20,4
35 a 44	12,9	8,7-17,1	13,6	6,8-20,4	12,3	7,0-17,6
45 a 54	32,2	26,0-38,4	28,0	18,9-37,2	35,9	27,5-44,2
55 a 64	32,2	25,0-39,5	19,4	10,9-28,0	42,7	32,2-53,3
65 e mais	31,5	23,9-39,1	19,9	8,5-31,4	39,3	29,5-49,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,6	11,5-17,6	9,3	5,8-12,9	19,2	14,3-24,0
9 a 11	13,6	11,0-16,2	11,5	7,7-15,3	15,0	11,4-18,5
12 e mais	19,7	15,9-23,5	21,1	14,9-27,3	18,3	13,8-22,9
Total	14,8	12,7-16,8	11,1	8,6-13,7	17,7	14,7-20,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,4	0,2-1,0	0,1	0,1-0,3	0,7	0,4-1,8
35 a 44	1,0	0,1-2,0	0,0	0,0-0,0	1,9	0,1-3,6
45 a 54	12,3	7,7-16,9	9,0	2,3-15,8	15,2	8,9-21,4
55 a 64	14,0	8,9-19,1	5,1	0,8-9,4	21,3	13,0-29,5
65 e mais	32,3	24,9-39,8	6,7	0,2-13,2	49,6	39,7-59,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,5	4,9-8,2	2,8	1,0-4,6	9,8	7,1-12,5
9 a 11	3,0	1,9-4,1	0,7	0,1-1,4	4,5	2,8-6,3
12 e mais	3,3	1,7-4,8	1,0	0,1-2,1	5,4	2,7-8,2
Total	5,2	4,1-6,2	2,0	0,9-3,2	7,7	6,1-9,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,7	0,8-2,7	0,8	0,0-1,6	2,5	0,9-4,2
25 a 34	7,3	3,3-11,4	3,6	0,8-8,1	10,3	4,0-16,7
35 a 44	6,7	2,9-10,5	3,8	0,7-8,3	9,0	3,2-14,8
45 a 54	3,8	1,7-5,9	4,3	0,8-7,8	3,3	0,9-5,7
55 a 64	2,0	0,2-3,7	2,4	1,0-5,8	1,6	0,3-3,0
65 e mais	6,8	2,2-11,4	7,4	0,6-15,4	6,4	1,0-11,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,2	3,0-7,5	2,9	0,5-5,4	7,2	3,6-10,9
9 a 11	4,0	2,5-5,5	2,9	0,7-5,1	4,7	2,7-6,7
12 e mais	5,3	3,4-7,2	5,1	2,0-8,2	5,6	3,3-7,8
Total	4,9	3,4-6,3	3,2	1,5-4,9	6,3	4,1-8,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	25,9	17,9-33,9	31,8	17,1-46,4	20,9	13,9-27,9
25 a 34	28,0	21,6-34,5	33,0	21,5-44,6	24,0	17,2-30,7
35 a 44	34,5	28,7-40,4	41,7	32,2-51,2	28,8	21,8-35,7
45 a 54	42,6	36,2-49,0	43,3	33,2-53,3	42,0	33,8-50,3
55 a 64	42,1	34,6-49,7	40,8	29,8-51,7	43,2	32,9-53,6
65 e mais	47,2	39,1-55,3	43,2	29,7-56,8	49,9	40,0-59,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	22,8	18,2-27,4	27,2	19,1-35,4	18,9	14,3-23,5
9 a 11	39,2	35,4-43,0	43,3	37,0-49,6	36,5	31,7-41,2
12 e mais	78,7	75,0-82,4	80,5	75,1-85,9	76,9	71,9-82,0
Total	33,1	29,9-36,3	37,1	31,5-42,7	29,8	26,3-33,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	65,3	55,1-75,5
26 a 30	61,2	47,1-75,3
31 a 35	64,4	50,0-78,9
36 a 40	69,6	57,9-81,2
41 a 45	74,0	63,7-84,3
46 a 50	56,7	44,4-69,0
Anos de escolaridade		
0 a 8	71,6	62,7-80,5
9 a 11	56,4	50,7-62,2
12 e mais	66,7	60,5-73,0
Total	67,0	61,6-72,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,0	4,4-17,7	8,6	0,7-17,9	13,1	3,7-22,5
25 a 34	11,9	6,7-17,1	2,1	0,1-4,0	20,0	11,3-28,7
35 a 44	11,5	7,6-15,4	7,1	2,7-11,4	15,0	8,9-21,1
45 a 54	13,7	9,2-18,3	9,1	3,6-14,6	17,8	10,8-24,7
55 a 64	17,5	11,1-23,9	11,8	4,2-19,4	22,1	12,6-31,7
65 e mais	16,9	11,0-22,9	12,7	3,6-21,8	19,8	12,0-27,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,1	10,2-18,0	7,3	3,0-11,6	20,1	14,0-26,2
9 a 11	9,7	7,4-12,0	6,0	2,9-9,1	12,2	8,9-15,4
12 e mais	11,9	8,9-14,9	8,5	4,3-12,8	15,0	10,7-19,3
Total	12,6	10,1-15,1	7,1	4,2-10,0	17,1	13,3-20,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	53,7	20,7-86,6	25,6	7,2-58,4	69,6	35,3-100,0
25 a 34	72,7	51,4-94,1	93,8	80,9-100,0	71,0	48,0-94,0
35 a 44	66,4	48,4-84,4	75,5	47,1-100,0	62,9	40,9-84,9
45 a 54	84,4	69,9-98,8	85,5	59,7-100,0	83,8	66,4-100,0
55 a 64	97,0	92,4-100,0	0,0	0,0-0,0	95,7	89,1-100,0
65 e mais	99,6	98,7-100,0	0,0	0,0-0,0	99,4	98,2-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	73,5	58,3-88,7	63,7	27,1-100,0	76,6	61,5-91,7
9 a 11	70,9	59,1-82,8	67,4	42,7-92,0	72,1	58,6-85,6
12 e mais	84,2	74,1-94,2	95,1	88,0-100,0	78,1	63,9-92,4
Total	73,9	63,1-84,6	68,5	42,6-94,4	75,7	64,7-86,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	12,3	0,1-24,4	9,3	3,6-15,0	15,0	0,0-37,0
25 a 34	12,8	7,4-18,2	16,1	7,9-24,2	9,9	2,7-17,1
35 a 44	12,9	8,8-16,9	12,0	6,2-17,7	13,6	7,8-19,4
45 a 54	19,6	15,0-24,2	24,9	17,2-32,7	15,0	9,8-20,2
55 a 64	9,5	5,9-13,1	9,7	3,9-15,5	9,3	4,8-13,8
65 e mais	7,2	3,9-10,6	7,1	1,3-13,0	7,3	3,2-11,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,5	9,7-23,2	12,7	7,1-18,4	19,6	8,5-30,6
9 a 11	9,2	6,8-11,6	14,4	9,7-19,1	5,1	3,0-7,1
12 e mais	12,2	9,4-14,9	15,0	10,4-19,6	9,5	6,4-12,7
Total	13,0	9,9-16,1	13,9	10,8-17,0	12,2	7,1-17,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,4	0,0-10,9	4,1	0,7-7,4	6,7	0,0-16,7
25 a 34	14,1	7,6-20,5	19,9	7,6-32,2	9,0	4,6-13,4
35 a 44	18,6	13,6-23,6	25,1	16,4-33,8	13,1	7,9-18,4
45 a 54	29,9	24,8-35,1	35,6	27,3-43,9	25,1	18,8-31,3
55 a 64	41,8	35,0-48,7	55,9	45,4-66,4	30,4	22,0-38,9
65 e mais	29,2	22,9-35,6	48,9	37,6-60,1	17,0	10,4-23,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	24,0	18,4-29,7	32,2	22,2-42,2	17,2	10,9-23,4
9 a 11	15,5	12,7-18,2	20,2	15,4-25,0	11,7	8,5-14,9
12 e mais	17,7	14,8-20,6	20,9	16,2-25,6	14,7	11,1-18,3
Total	19,6	17,0-22,2	25,4	20,9-29,9	14,7	11,8-17,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,9	0,0-2,0	2,0	0,0-4,3	0,0	0,0-0,0
25 a 34	1,4	0,0-2,8	1,0	0,0-2,3	1,7	0,0-4,1
35 a 44	2,2	0,5-3,8	2,0	0,0-4,5	2,3	0,1-4,5
45 a 54	5,4	2,8-8,0	8,0	3,4-12,6	3,2	0,5-5,9
55 a 64	3,5	1,2-5,8	4,1	0,3-7,9	3,0	0,1-5,9
65 e mais	0,9	0,0-1,8	1,1	0,0-3,3	0,7	0,0-1,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	1,9	0,7-3,1	1,5	0,0-3,1	2,1	0,4-3,9
9 a 11	1,8	0,8-2,7	2,4	0,7-4,1	1,3	0,2-2,3
12 e mais	3,6	1,9-5,3	5,5	2,4-8,7	1,8	0,3-3,3
Total	2,3	1,5-3,0	2,8	1,6-4,0	1,8	0,9-2,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	47,1	34,1-60,1	35,0	19,3-50,7	58,2	41,8-74,6
25 a 34	39,1	32,0-46,3	46,4	34,6-58,3	32,7	24,6-40,9
35 a 44	36,6	30,6-42,6	39,6	29,9-49,3	34,1	26,6-41,5
45 a 54	29,8	24,6-35,0	33,7	25,6-41,9	26,5	19,9-33,1
55 a 64	25,1	18,6-31,6	27,7	17,6-37,8	23,0	14,6-31,5
65 e mais	16,8	11,7-21,8	13,9	6,1-21,8	18,5	12,0-25,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	37,3	29,6-45,0	38,4	27,3-49,4	36,4	25,7-47,1
9 a 11	38,5	34,2-42,8	39,2	32,4-45,9	38,0	32,5-43,5
12 e mais	28,3	24,6-32,0	29,2	23,5-34,9	27,5	22,7-32,3
Total	35,5	31,8-39,2	36,3	31,0-41,6	34,9	29,8-40,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	14,7	9,5-20,0	18,8	9,7-27,8	10,9	4,8-17,0
25 a 34	37,7	30,7-44,7	45,9	34,1-57,6	30,6	22,1-39,1
35 a 44	49,4	43,2-55,5	61,2	51,4-71,0	39,0	31,4-46,7
45 a 54	57,1	51,4-62,8	63,5	55,1-72,0	50,8	43,2-58,5
55 a 64	63,3	56,6-69,9	68,6	59,1-78,0	58,4	49,2-67,7
65 e mais	43,5	36,4-50,6	34,8	24,2-45,3	50,5	41,4-59,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,0	37,1-51,0	42,4	31,7-53,1	45,6	36,7-54,4
9 a 11	40,7	36,4-45,0	48,2	41,3-55,0	34,5	29,2-39,9
12 e mais	41,9	37,8-45,9	58,0	51,8-64,1	26,7	22,1-31,2
Total	42,3	39,1-45,5	48,6	43,4-53,9	36,6	32,7-40,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,9	0,3-3,5	1,3	0,0-3,2	2,4	0,0-5,1
25 a 34	8,8	4,8-12,8	10,1	4,3-16,0	7,6	2,1-13,2
35 a 44	13,8	9,5-18,1	20,9	12,9-28,9	7,5	3,8-11,3
45 a 54	17,8	13,3-22,3	11,4	6,5-16,4	24,1	17,0-31,3
55 a 64	17,9	12,4-23,3	20,0	11,4-28,6	15,9	9,2-22,6
65 e mais	9,6	5,2-14,0	6,4	0,8-11,9	12,2	5,7-18,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,4	9,6-17,2	11,4	6,1-16,6	15,3	9,9-20,6
9 a 11	9,7	7,1-12,3	11,7	7,1-16,3	7,9	5,2-10,7
12 e mais	9,8	7,3-12,3	12,6	8,3-16,9	7,2	4,5-9,8
Total	11,1	9,3-12,9	11,8	9,0-14,6	10,4	8,1-12,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	24,7	15,7-33,8	13,2	6,1-20,3	35,3	20,0-50,5
25 a 34	28,7	22,5-35,0	26,0	15,6-36,4	31,1	23,6-38,6
35 a 44	36,8	31,1-42,4	34,3	25,4-43,3	38,8	31,7-45,9
45 a 54	43,9	38,3-49,6	38,5	30,2-46,7	48,6	41,0-56,3
55 a 64	46,2	39,3-53,1	30,3	21,2-39,4	59,1	50,0-68,2
65 e mais	52,1	45,4-58,9	43,5	32,5-54,6	57,5	49,2-65,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	29,6	23,5-35,7	21,7	13,5-29,9	36,2	27,6-44,8
9 a 11	32,3	28,5-36,1	24,6	19,3-30,0	38,4	33,2-43,6
12 e mais	51,2	47,1-55,2	45,7	39,5-51,9	56,3	51,0-61,5
Total	35,7	32,5-38,9	28,8	24,3-33,2	41,6	37,2-46,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,0	8,8-25,1	8,3	3,0-13,7	24,9	10,8-39,0
25 a 34	15,8	11,5-20,0	12,0	5,9-18,0	19,1	13,3-24,9
35 a 44	22,1	17,4-26,8	18,7	11,5-25,9	24,9	18,7-31,2
45 a 54	25,7	20,6-30,7	22,7	15,4-30,0	28,3	21,3-35,2
55 a 64	28,7	22,6-34,8	21,6	13,4-29,8	34,4	25,8-43,1
65 e mais	28,1	22,1-34,1	25,0	15,3-34,8	30,0	22,4-37,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	16,8	11,9-21,7	11,6	6,3-16,9	21,1	13,6-28,7
9 a 11	20,4	17,2-23,7	14,9	10,6-19,3	24,8	20,2-29,4
12 e mais	30,2	26,5-33,9	25,5	20,1-30,9	34,6	29,6-39,5
Total	21,3	18,7-23,8	16,2	13,1-19,4	25,5	21,7-29,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	47,1	33,8-60,5	50,3	30,9-69,7	44,3	25,2-63,3
25 a 34	39,9	32,6-47,1	46,4	34,6-58,1	34,2	25,2-43,2
35 a 44	35,0	29,0-41,0	43,9	34,2-53,7	27,5	20,5-34,4
45 a 54	35,6	29,9-41,2	45,0	36,4-53,6	27,5	20,2-34,7
55 a 64	30,6	23,9-37,3	39,1	28,8-49,5	23,7	15,0-32,3
65 e mais	21,5	15,9-27,1	29,3	18,8-39,8	16,6	10,7-22,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,2	36,2-52,2	49,0	36,8-61,3	40,1	29,3-50,9
9 a 11	35,7	31,5-39,9	44,6	37,8-51,3	28,7	23,5-33,8
12 e mais	26,9	23,3-30,6	37,1	31,2-43,1	17,5	13,4-21,6
Total	37,2	33,2-41,1	44,6	38,7-50,4	30,9	25,5-36,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	67,2	57,1-77,4	68,6	53,9-83,4	65,9	51,9-80,0
25 a 34	52,4	45,2-59,7	54,2	42,3-66,0	51,0	42,2-59,7
35 a 44	51,3	45,3-57,3	59,8	50,6-68,9	44,1	36,5-51,6
45 a 54	42,6	37,0-48,3	43,3	34,9-51,7	42,1	34,4-49,8
55 a 64	36,5	29,7-43,3	38,0	27,8-48,2	35,3	26,2-44,4
65 e mais	41,4	34,7-48,2	44,7	33,3-56,0	39,4	31,0-47,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	55,1	47,7-62,4	58,1	46,7-69,5	52,6	43,1-62,1
9 a 11	55,2	51,0-59,4	57,8	51,3-64,4	53,1	47,6-58,5
12 e mais	39,5	35,5-43,5	45,3	39,1-51,5	34,1	29,0-39,2
Total	51,3	47,7-55,0	54,7	49,1-60,4	48,5	43,7-53,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	37,2	24,1-50,3	25,6	14,0-37,3	47,9	29,7-66,0
25 a 34	24,0	17,9-30,2	27,6	17,1-38,2	20,9	14,1-27,8
35 a 44	15,3	10,5-20,2	18,2	9,9-26,5	12,9	7,4-18,5
45 a 54	9,9	6,6-13,3	12,9	7,3-18,4	7,4	3,4-11,4
55 a 64	6,1	3,0-9,3	9,3	3,3-15,4	3,5	0,8-6,3
65 e mais	7,0	3,6-10,5	6,7	0,5-13,0	7,2	3,2-11,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,2	11,4-26,9	14,6	7,3-21,9	23,0	10,8-35,3
9 a 11	23,2	19,4-27,1	27,9	21,6-34,2	19,5	14,8-24,2
12 e mais	14,9	12,0-17,9	17,1	12,4-21,8	12,9	9,2-16,6
Total	19,5	15,9-23,1	19,5	15,5-23,6	19,5	13,8-25,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	27,4	15,7-39,2	44,8	25,2-64,5	11,5	5,4-17,6
25 a 34	14,4	10,2-18,5	16,5	9,6-23,4	12,5	7,6-17,5
35 a 44	19,4	14,8-23,9	22,9	15,3-30,5	16,4	11,1-21,7
45 a 54	20,4	15,8-24,9	20,7	13,5-27,9	20,1	14,4-25,7
55 a 64	22,1	16,4-27,9	28,4	18,5-38,2	17,1	10,7-23,4
65 e mais	12,4	8,2-16,5	17,8	9,4-26,1	9,0	4,8-13,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,4	8,1-20,8	21,9	9,5-34,4	8,2	4,7-11,7
9 a 11	22,2	18,6-25,8	28,8	22,6-35,0	17,0	13,0-21,1
12 e mais	25,4	21,9-28,9	29,0	23,4-34,6	22,1	17,8-26,4
Total	19,7	16,7-22,7	26,0	20,3-31,7	14,4	12,0-16,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	31,6	20,2-43,0	37,5	18,1-56,9	26,1	15,3-37,0
25 a 34	46,1	38,8-53,4	50,0	38,1-61,8	42,7	34,1-51,3
35 a 44	48,4	42,3-54,4	52,2	42,6-61,7	45,1	37,5-52,7
45 a 54	45,3	39,7-51,0	55,8	47,3-64,4	36,3	29,1-43,5
55 a 64	34,0	27,2-40,8	38,4	27,8-49,0	30,4	21,7-39,1
65 e mais	10,1	6,0-14,3	19,7	10,5-28,8	4,2	1,2-7,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	39,8	32,4-47,2	51,8	39,5-64,0	29,8	22,4-37,3
9 a 11	42,0	37,8-46,3	45,5	38,8-52,2	39,3	33,8-44,7
12 e mais	34,0	30,2-37,9	34,7	28,8-40,6	33,4	28,5-38,4
Total	39,2	35,6-42,7	45,4	39,5-51,2	33,9	29,9-37,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,4	2,4-8,3	6,7	1,6-11,8	4,1	0,9-7,3
25 a 34	9,3	5,2-13,3	9,7	3,4-16,1	8,8	3,5-14,2
35 a 44	9,7	6,2-13,2	9,3	4,1-14,5	10,0	5,3-14,8
45 a 54	10,4	6,6-14,1	13,1	6,6-19,5	8,1	3,9-12,2
55 a 64	8,7	4,4-12,9	14,4	6,3-22,4	4,0	0,4-7,7
65 e mais	1,6	0,0-3,4	2,2	0,0-5,3	1,2	0,0-3,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	9,8	6,6-12,9	11,2	6,1-16,4	8,5	4,6-12,5
9 a 11	8,0	5,7-10,2	9,9	6,0-13,9	6,4	3,9-8,9
12 e mais	4,9	3,1-6,8	5,5	2,5-8,5	4,4	2,2-6,6
Total	8,0	6,4-9,6	9,4	6,8-11,9	6,8	4,9-8,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	28,6	15,9-41,3	15,7	0,0-34,9	40,5	23,2-57,8
25 a 34	35,0	28,1-41,9	8,9	2,4-15,5	57,8	49,5-66,1
35 a 44	36,1	30,3-41,9	14,7	7,7-21,7	54,1	46,6-61,6
45 a 54	33,6	28,2-39,1	8,8	4,7-13,0	54,9	47,5-62,4
55 a 64	34,8	28,2-41,4	8,8	3,5-14,1	55,9	46,8-65,0
65 e mais	25,7	19,9-31,5	7,2	0,9-13,4	37,3	29,2-45,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	44,4	36,8-52,0	16,9	5,9-27,9	67,3	57,1-77,5
9 a 11	32,9	29,1-36,8	9,5	5,9-13,0	51,6	46,1-57,1
12 e mais	12,6	10,2-15,1	5,4	2,9-7,9	19,3	15,3-23,3
Total	32,8	29,3-36,4	11,6	6,6-16,5	50,8	46,0-55,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	20,5	9,6-31,4	30,2	11,6-48,7	11,7	1,3-22,1
25 a 34	21,0	15,2-26,9	30,1	20,3-39,9	13,2	5,9-20,5
35 a 44	20,3	15,5-25,0	30,0	21,5-38,4	12,1	7,2-17,0
45 a 54	20,4	15,9-24,8	30,6	22,9-38,4	11,5	7,1-16,0
55 a 64	13,5	9,1-17,9	21,5	13,1-29,9	7,0	3,3-10,6
65 e mais	3,9	1,5-6,3	5,4	0,7-10,1	2,9	0,4-5,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,2	8,9-21,4	22,0	10,9-33,1	9,5	3,2-15,7
9 a 11	18,1	14,7-21,5	27,1	21,1-33,2	10,9	7,4-14,4
12 e mais	24,6	21,1-28,2	37,3	31,4-43,3	12,9	9,3-16,5
Total	18,5	15,5-21,4	27,6	22,3-32,9	10,8	7,8-13,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,5	0,0-1,1	0,7	0,0-1,8	0,3	0,0-0,9
25 a 34	2,3	0,0-4,5	4,4	0,0-9,1	0,4	0,0-1,2
35 a 44	1,6	0,2-3,0	3,2	0,2-6,1	0,3	0,0-0,8
45 a 54	1,4	0,3-2,6	2,2	0,0-4,4	0,8	0,0-1,7
55 a 64	0,1	0,0-0,3	0,2	0,0-0,6	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,7	0,0-1,7	1,6	0,0-3,8	0,0	0,0-0,0
9 a 11	1,0	0,0-2,1	2,0	0,0-4,4	0,3	0,0-0,7
12 e mais	2,4	1,2-3,6	3,8	1,6-6,1	1,0	0,0-2,0
Total	1,2	0,6-1,9	2,3	0,9-3,6	0,3	0,0-0,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,1	0,0-0,3	0,0	0,0-0,0	0,2	0,0-0,6
25 a 34	1,3	0,2-2,4	0,0	0,0-0,0	2,4	0,4-4,4
35 a 44	2,9	1,0-4,9	3,7	0,0-7,3	2,3	0,6-4,0
45 a 54	2,9	0,8-4,9	1,8	0,0-3,9	3,8	0,5-7,2
55 a 64	7,3	3,6-10,9	8,0	2,1-13,9	6,7	2,2-11,3
65 e mais	4,9	2,1-7,7	4,5	0,0-9,5	5,2	1,8-8,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,5	2,0-5,0	3,9	1,4-6,3	3,2	1,4-5,0
9 a 11	2,8	1,6-4,0	1,4	0,0-2,9	3,9	2,1-5,7
12 e mais	0,4	0,0-0,8	0,2	0,0-0,7	0,6	0,0-1,3
Total	2,5	1,8-3,3	2,1	1,0-3,3	2,8	1,8-3,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	92,7	87,6-97,8	84,9	77,7-92,1
55 a 59	89,3	83,2-95,3	77,7	69,6-85,8
Anos de escolaridade				
0 a 8	88,1	81,9-94,3	77,2	68,8-85,5
9 a 11	95,7	91,0-100,0	87,4	80,3-94,5
12 e mais	95,6	91,0-100,0	90,1	83,5-96,6
Total	91,2	87,3-95,1	81,8	76,4-87,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	87,0	81,2-92,8	84,0	77,6-90,4
35 a 44	92,3	87,8-96,7	90,2	85,4-95,0
45 a 54	95,5	92,0-99,0	93,1	89,2-97,1
55 a 59	98,3	95,8-100,0	95,0	89,6-100,0
Anos de escolaridade				
0 a 8	88,3	82,7-93,8	85,6	79,5-91,6
9 a 11	93,6	89,7-97,4	90,4	85,7-95,2
12 e mais	94,1	91,1-97,1	92,5	89,3-95,7
Total	91,6	89,0-94,3	89,1	86,1-92,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	28,0	19,7-36,3	20,0	10,3-29,7	35,4	22,0-48,8
25 a 34	37,8	31,2-44,4	28,8	18,4-39,2	45,7	37,1-54,2
35 a 44	46,1	40,2-52,0	36,9	28,1-45,7	53,8	46,1-61,4
45 a 54	41,4	35,9-46,8	28,2	20,9-35,5	52,7	45,0-60,4
55 a 64	36,2	29,9-42,6	21,4	13,9-29,0	48,3	39,1-57,5
65 e mais	29,7	24,1-35,4	12,2	6,0-18,3	40,7	32,8-48,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,1	14,6-23,7	11,5	5,0-18,0	25,5	19,0-32,0
9 a 11	44,0	39,8-48,2	31,3	25,2-37,4	54,1	48,6-59,7
12 e mais	59,8	55,8-63,7	46,0	39,8-52,2	72,5	67,6-77,3
Total	37,3	34,2-40,5	26,7	22,4-31,0	46,3	41,7-50,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	6,0	0,4-11,6	2,7	0,0-5,3	9,1	0,0-19,3
25 a 34	14,0	7,7-20,2	16,0	6,0-26,0	12,3	4,5-20,0
35 a 44	17,5	12,8-22,2	21,2	13,3-29,1	14,3	8,9-19,8
45 a 54	34,3	28,8-39,9	40,9	32,5-49,4	28,7	21,3-36,0
55 a 64	48,6	41,6-55,6	44,3	33,8-54,8	52,1	42,9-61,3
65 e mais	58,1	51,5-64,7	45,0	33,8-56,3	66,3	58,7-73,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	34,1	27,8-40,4	29,2	20,2-38,2	38,1	29,5-46,8
9 a 11	16,2	13,4-19,1	17,7	13,0-22,4	15,1	11,6-18,6
12 e mais	14,4	11,7-17,1	19,0	14,4-23,7	10,2	7,2-13,1
Total	23,3	20,6-26,1	22,9	18,8-26,9	23,7	20,0-27,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,5	0,0-1,1	0,2	0,0-0,7	0,7	0,0-1,7
35 a 44	2,2	0,4-3,9	3,4	0,0-6,9	1,2	0,0-2,3
45 a 54	6,4	3,6-9,3	5,9	2,2-9,6	6,9	2,6-11,2
55 a 64	11,7	7,3-16,1	8,5	3,1-13,8	14,3	7,7-20,8
65 e mais	18,4	12,8-24,0	18,6	9,5-27,6	18,3	11,2-25,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,5	4,4-8,6	5,1	2,3-8,0	7,6	4,6-10,5
9 a 11	3,1	2,0-4,3	3,4	1,5-5,3	2,9	1,5-4,3
12 e mais	2,1	1,2-3,0	2,4	1,1-3,8	1,8	0,6-3,0
Total	4,3	3,3-5,2	3,9	2,5-5,3	4,6	3,3-6,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,3	0,0-0,9	0,6	0,0-1,9	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
35 a 44	2,0	0,2-3,7	3,9	0,1-7,8	0,3	0,0-0,8
45 a 54	2,7	0,7-4,7	1,7	0,0-3,4	3,5	0,2-6,9
55 a 64	6,7	2,7-10,8	4,7	1,2-8,2	8,4	1,7-15,1
65 e mais	10,5	6,0-15,0	14,2	6,2-22,2	8,2	2,8-13,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,8	2,1-5,5	3,5	1,1-5,9	4,1	1,7-6,4
9 a 11	2,1	1,0-3,1	3,1	1,0-5,2	1,2	0,4-2,1
12 e mais	0,7	0,2-1,1	1,2	0,3-2,0	0,2	0,0-0,6
Total	2,5	1,7-3,3	2,8	1,6-4,0	2,2	1,2-3,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,1	1,6-6,6	3,9	0,2-7,6	4,2	0,9-7,6
25 a 34	7,8	4,3-11,3	8,2	2,5-13,9	7,4	3,2-11,6
35 a 44	21,5	16,5-26,5	28,2	19,4-37,0	15,8	10,7-21,0
45 a 54	27,7	22,6-32,9	32,1	24,4-39,9	24,0	17,1-30,9
55 a 64	41,4	34,5-48,3	33,7	23,8-43,6	47,7	38,4-56,9
65 e mais	35,5	29,1-41,9	18,9	10,5-27,3	45,9	37,5-54,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	19,7	15,4-24,1	17,5	10,9-24,2	21,6	15,9-27,2
9 a 11	16,3	13,5-19,1	16,6	12,0-21,1	16,1	12,6-19,7
12 e mais	20,3	17,0-23,5	23,1	17,8-28,4	17,6	13,7-21,6
Total	18,7	16,5-20,9	18,6	15,2-22,1	18,8	16,0-21,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,3	0,0-0,9	0,6	0,0-1,9	0,0	0,0-0,0
25 a 34	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
35 a 44	0,4	0,0-1,1	0,0	0,0-0,0	0,7	0,0-2,0
45 a 54	3,6	1,4-5,9	1,5	0,0-3,5	5,5	1,8-9,2
55 a 64	12,8	7,8-17,8	2,4	0,0-5,9	21,2	13,1-29,3
65 e mais	20,6	15,5-25,7	5,6	0,8-10,4	30,0	22,6-37,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,1	4,2-8,0	1,3	0,1-2,5	10,2	6,8-13,5
9 a 11	1,8	1,1-2,6	0,8	0,0-1,9	2,6	1,6-3,7
12 e mais	2,0	1,1-3,0	0,8	0,0-1,8	3,2	1,6-4,8
Total	3,7	2,9-4,5	1,0	0,4-1,7	6,0	4,5-7,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,5	2,8-8,3	3,3	0,3-6,2	7,6	3,1-12,1
25 a 34	7,4	2,6-12,1	5,5	0,0-11,3	9,0	1,8-16,3
35 a 44	2,3	0,8-3,8	1,4	0,0-3,7	3,0	1,0-4,9
45 a 54	3,9	1,7-6,2	3,2	0,6-5,9	4,6	1,1-8,0
55 a 64	4,7	2,1-7,4	4,3	0,2-8,4	5,1	1,6-8,5
65 e mais	5,2	2,3-8,1	4,3	0,0-8,7	5,8	1,9-9,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,0	1,3-6,6	3,2	0,0-6,5	4,6	0,6-8,6
9 a 11	5,9	3,9-7,9	3,3	0,7-5,9	7,9	5,0-10,8
12 e mais	5,0	3,2-6,8	4,3	1,7-6,8	5,7	3,2-8,2
Total	4,9	3,5-6,2	3,5	1,8-5,3	6,0	3,9-8,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	41,5	30,3-52,8	42,9	25,8-60,0	40,3	25,4-55,1
25 a 34	50,9	43,6-58,2	47,0	35,4-58,7	54,2	45,3-63,1
35 a 44	59,0	52,8-65,1	60,0	50,1-69,9	58,1	50,4-65,8
45 a 54	58,6	52,8-64,4	55,6	46,9-64,4	61,0	53,4-68,7
55 a 64	61,2	54,0-68,3	61,5	50,7-72,4	60,9	51,3-70,4
65 e mais	68,3	61,8-74,8	61,9	50,5-73,2	72,4	64,7-80,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	30,7	24,8-36,5	25,0	16,6-33,5	35,4	27,4-43,4
9 a 11	60,7	56,5-64,9	63,8	57,1-70,4	58,3	52,8-63,8
12 e mais	87,2	84,2-90,1	84,8	80,0-89,6	89,4	85,9-92,9
Total	54,4	50,5-58,3	52,8	46,8-58,8	55,8	50,8-60,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	54,2	40,3-68,1
26 a 30	76,5	67,2-85,7
31 a 35	78,1	69,1-87,1
36 a 40	71,9	61,6-82,3
41 a 45	70,5	60,3-80,7
46 a 50	57,6	47,2-68,0
Anos de escolaridade		
0 a 8	66,3	52,4-80,1
9 a 11	66,4	60,2-72,5
12 e mais	68,6	63,0-74,2
Total	68,7	63,8-73,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,6	4,9-12,4	6,4	1,6-11,2	10,7	4,9-16,4
25 a 34	16,4	11,1-21,8	10,6	3,9-17,2	21,6	13,7-29,5
35 a 44	20,2	15,6-24,7	13,5	7,6-19,4	25,8	19,3-32,3
45 a 54	18,3	14,0-22,6	10,9	5,7-16,2	24,6	18,1-31,2
55 a 64	13,9	9,5-18,2	7,5	2,7-12,3	19,1	12,4-25,8
65 e mais	15,9	11,0-20,9	11,8	4,6-19,0	18,5	11,9-25,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,8	9,9-17,6	7,3	3,0-11,6	19,1	13,1-25,1
9 a 11	16,5	13,4-19,6	11,2	6,9-15,5	20,7	16,3-25,0
12 e mais	17,9	14,8-21,0	13,6	9,4-17,9	21,8	17,4-26,2
Total	15,7	13,6-17,8	10,2	7,6-12,8	20,3	17,1-23,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	83,2	67,7-98,7	70,6	36,0-100,0	90,1	78,5-100,0
25 a 34	76,2	57,2-95,3	78,7	53,5-100,0	75,2	50,4-99,9
35 a 44	82,6	72,7-92,5	83,8	65,8-100,0	82,1	70,2-94,0
45 a 54	82,6	73,3-92,0	89,0	74,2-100,0	80,2	68,7-91,7
55 a 64	82,2	70,3-94,1	82,7	52,8-100,0	82,0	69,5-94,6
65 e mais	93,3	85,7-100,0	90,3	72,1-100,0	94,4	86,7-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	81,5	67,9-95,1	85,1	67,0-100,0	80,4	63,6-97,1
9 a 11	79,8	71,1-88,4	74,3	53,7-94,8	82,1	73,8-90,4
12 e mais	85,8	78,9-92,7	87,7	76,6-98,8	84,7	76,0-93,5
Total	82,1	75,9-88,3	82,1	71,9-92,4	82,1	74,4-89,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Distrito Federal

Tabela 1 - Percentual de fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	17,0	8,3-25,7	17,7	5,2-30,1	16,4	4,3-28,5
25 a 34	16,3	10,1-22,6	17,7	7,3-28,1	15,1	7,8-22,4
35 a 44	16,8	12,7-20,8	19,0	12,4-25,6	14,8	9,9-19,7
45 a 54	15,0	10,6-19,4	14,9	8,4-21,5	15,1	9,2-20,9
55 a 64	11,7	6,5-16,9	15,7	6,6-24,8	8,0	2,6-13,4
65 e mais	10,1	5,2-15,0	16,0	6,3-25,7	5,9	1,2-10,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	21,8	16,2-27,4	21,5	13,0-30,0	22,1	14,7-29,5
9 a 11	10,3	7,7-12,9	14,4	9,8-18,9	7,2	4,3-10,0
12 e mais	8,6	6,4-10,9	10,7	6,9-14,5	6,8	4,2-9,3
Total	15,8	12,7-18,8	17,4	12,7-22,1	14,4	10,4-18,3

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 2 - Percentual de ex-fumantes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	11,3	4,9-17,7	6,9	2,4-11,4	15,2	4,1-26,4
25 a 34	13,9	8,9-19,0	16,2	7,3-25,0	11,9	6,6-17,3
35 a 44	21,8	17,5-26,1	20,5	14,4-26,7	22,8	16,8-28,8
45 a 54	38,9	32,5-45,3	44,6	34,4-54,8	34,1	26,1-42,0
55 a 64	43,0	34,4-51,5	56,0	43,5-68,5	31,2	21,0-41,4
65 e mais	43,2	34,4-51,9	60,1	46,2-74,1	30,9	21,1-40,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,2	20,3-30,1	25,8	18,8-32,8	24,6	17,8-31,5
9 a 11	16,8	13,8-19,7	18,0	13,2-22,9	15,7	12,0-19,5
12 e mais	21,1	17,6-24,6	24,8	19,4-30,3	17,7	13,2-22,2
Total	21,8	19,1-24,5	23,3	19,3-27,3	20,4	16,8-24,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 3 - Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	4,0	0,0-8,3	2,8	0,0-6,6	5,1	0,0-12,4
25 a 34	2,0	0,4-3,7	1,9	0,0-3,8	2,2	0,0-4,8
35 a 44	5,9	3,1-8,7	9,2	3,8-14,5	3,0	0,7-5,4
45 a 54	3,4	1,3-5,6	5,2	1,0-9,4	1,9	0,3-3,6
55 a 64	6,7	2,5-10,8	11,7	3,4-19,9	2,2	0,1-4,3
65 e mais	3,6	0,9-6,4	6,1	0,6-11,6	1,8	0,0-4,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	5,6	3,0-8,2	6,2	3,0-9,4	5,0	1,0-9,1
9 a 11	1,9	0,9-3,0	3,4	1,2-5,7	0,7	0,0-1,5
12 e mais	2,8	1,5-4,1	3,9	1,5-6,2	1,8	0,5-3,0
Total	3,9	2,6-5,3	5,0	3,1-6,8	3,0	1,0-5,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 4 - Percentual de fumantes passivos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	55,6	46,2-64,9	50,8	36,7-64,9	59,8	47,7-72,0
25 a 34	40,9	34,2-47,6	39,2	28,2-50,2	42,4	34,3-50,5
35 a 44	39,2	34,1-44,2	39,1	31,3-46,8	39,3	32,6-45,9
45 a 54	28,7	22,7-34,6	27,8	18,6-37,1	29,4	21,8-37,1
55 a 64	27,7	20,1-35,3	24,8	13,8-35,9	30,3	19,9-40,8
65 e mais	21,7	14,4-29,0	24,6	11,3-37,9	19,6	11,5-27,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	46,3	40,1-52,5	43,5	34,1-52,9	48,9	40,9-57,0
9 a 11	41,8	37,5-46,2	43,0	36,3-49,8	40,9	35,2-46,6
12 e mais	23,4	19,8-26,9	19,9	15,1-24,6	26,5	21,4-31,6
Total	40,6	37,1-44,2	38,9	33,5-44,3	42,1	37,5-46,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 5 - Percentual de indivíduos com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	18,9	11,2-26,5	22,1	10,8-33,4	16,1	5,6-26,6
25 a 34	36,1	29,8-42,4	44,6	33,6-55,6	28,6	21,4-35,7
35 a 44	47,3	42,2-52,5	54,5	46,7-62,3	40,9	34,1-47,6
45 a 54	60,0	53,4-66,6	62,2	51,8-72,6	57,9	49,6-66,2
55 a 64	55,2	46,3-64,0	54,0	41,0-67,1	56,3	44,3-68,2
65 e mais	56,9	47,8-66,0	57,9	43,3-72,6	56,0	44,8-67,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,3	35,3-47,3	40,7	31,8-49,6	41,9	33,8-50,0
9 a 11	35,9	31,8-40,0	43,1	36,5-49,7	30,1	25,1-35,2
12 e mais	41,7	37,5-45,8	58,4	52,3-64,5	26,4	21,5-31,2
Total	39,6	36,4-42,9	44,9	39,7-50,1	34,9	30,8-39,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 6 - Percentual de indivíduos com obesidade (índice de massa corporal ≥ 30 kg/m²), por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	3,9	0,2-7,5	5,4	0,0-12,8	2,6	0,4-4,7
25 a 34	8,8	5,2-12,3	8,4	2,7-14,2	9,1	4,8-13,4
35 a 44	16,7	12,7-20,7	17,9	11,7-24,1	15,6	10,5-20,7
45 a 54	21,9	16,7-27,1	15,4	9,1-21,7	27,9	20,1-35,7
55 a 64	16,8	9,6-24,1	5,2	0,2-10,1	28,4	16,1-40,7
65 e mais	13,5	7,7-19,3	7,7	0,0-16,0	18,8	10,8-26,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	12,8	9,5-16,2	9,4	4,3-14,5	16,1	11,6-20,7
9 a 11	10,1	7,5-12,7	9,6	5,5-13,6	10,5	7,1-13,9
12 e mais	11,9	9,1-14,7	14,3	9,8-18,7	9,7	6,3-13,1
Total	11,8	9,9-13,7	10,4	7,4-13,4	13,0	10,6-15,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 7 - Percentual de indivíduos que consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	24,0	16,6-31,4	22,8	11,3-34,3	25,1	15,6-34,5
25 a 34	27,6	22,1-33,2	21,3	12,8-29,7	33,3	26,3-40,4
35 a 44	40,9	35,9-45,8	31,0	23,8-38,3	49,4	42,7-56,0
45 a 54	44,4	38,1-50,8	36,8	27,3-46,2	51,0	42,8-59,2
55 a 64	45,8	37,4-54,3	36,4	24,6-48,3	54,3	42,6-66,0
65 e mais	51,1	42,5-59,7	45,2	30,5-59,9	55,3	45,1-65,6
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,8	20,9-30,7	19,8	12,4-27,2	31,4	24,9-37,9
9 a 11	35,5	31,4-39,5	30,5	24,4-36,5	39,3	33,9-44,8
12 e mais	54,9	50,8-59,1	46,3	40,1-52,4	62,8	57,3-68,2
Total	34,2	31,2-37,2	27,9	23,4-32,4	39,8	35,7-43,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 8 - Percentual de indivíduos que consomem cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	15,1	9,5-20,6	11,5	4,7-18,3	18,3	9,7-26,9
25 a 34	17,4	12,9-21,9	11,7	5,2-18,2	22,6	16,5-28,6
35 a 44	25,2	21,0-29,4	17,5	12,2-22,8	31,9	25,7-38,0
45 a 54	29,3	23,7-35,0	22,3	14,2-30,4	35,4	27,6-43,1
55 a 64	25,8	18,8-32,8	18,5	9,3-27,6	32,4	22,1-42,7
65 e mais	30,6	23,0-38,2	20,7	8,7-32,8	37,7	28,1-47,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	14,5	10,8-18,2	9,3	4,5-14,1	19,3	13,9-24,8
9 a 11	24,1	20,5-27,7	18,4	13,5-23,3	28,5	23,4-33,6
12 e mais	35,1	31,1-39,0	26,1	20,6-31,5	43,1	37,6-48,7
Total	21,3	18,9-23,7	15,1	12,0-18,3	26,7	23,3-30,2

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 9 - Percentual de indivíduos que costumam consumir carnes com excesso de gordura*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	40,3	30,7-49,9	41,9	28,5-55,4	38,8	25,0-52,6
25 a 34	43,6	36,7-50,5	53,9	42,7-65,1	34,3	26,0-42,7
35 a 44	34,7	29,9-39,5	44,0	36,3-51,7	26,7	20,9-32,5
45 a 54	28,8	22,7-34,9	40,6	30,4-50,7	18,6	11,9-25,3
55 a 64	29,7	21,6-37,8	44,5	31,6-57,4	16,4	8,3-24,6
65 e mais	26,9	19,2-34,7	42,4	27,9-56,9	15,8	8,3-23,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	41,2	35,0-47,4	45,3	36,0-54,6	37,4	29,0-45,8
9 a 11	35,6	31,4-39,8	49,4	42,7-56,1	24,8	19,9-29,6
12 e mais	28,6	24,8-32,4	41,9	35,8-48,1	16,6	12,6-20,6
Total	37,1	33,6-40,6	45,9	40,5-51,2	29,4	24,7-34,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que consomem carne vermelha gordurosa ou frango com pele sem remover a gordura visível do alimento.

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 10 - Percentual de indivíduos que costumam consumir leite com teor integral de gordura, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	56,9	47,5-66,3	49,9	35,8-64,1	63,3	51,9-74,7
25 a 34	56,8	50,1-63,6	59,8	48,8-70,9	54,2	46,1-62,2
35 a 44	59,8	54,9-64,7	61,6	54,2-69,1	58,2	51,7-64,6
45 a 54	54,2	47,7-60,6	57,4	47,2-67,6	51,4	43,2-59,6
55 a 64	53,5	45,0-62,0	41,0	28,4-53,5	64,7	54,5-75,0
65 e mais	52,3	43,7-60,9	55,6	40,9-70,3	49,9	39,7-60,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	58,8	52,8-64,9	54,9	45,4-64,4	62,5	55,2-69,9
9 a 11	61,8	57,6-65,9	64,9	58,7-71,1	59,3	53,8-64,9
12 e mais	42,1	38,0-46,3	44,3	38,2-50,5	40,2	34,6-45,7
Total	56,7	53,3-60,1	55,8	50,4-61,3	57,4	53,1-61,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 11 - Percentual de indivíduos que consomem refrigerantes cinco ou mais dias da semana, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	35,0	25,6-44,3	39,2	25,7-52,7	31,1	18,1-44,2
25 a 34	28,0	21,5-34,4	30,5	19,6-41,3	25,7	18,3-33,1
35 a 44	17,4	13,7-21,2	19,4	13,5-25,3	15,7	11,0-20,5
45 a 54	11,0	7,1-14,9	13,1	6,4-19,8	9,2	4,6-13,7
55 a 64	11,3	5,8-16,8	8,9	1,7-16,2	13,4	5,3-21,5
65 e mais	9,5	4,7-14,3	11,5	2,9-20,1	8,1	2,6-13,5
Anos de escolaridade						
0 a 8	25,0	19,1-30,9	25,0	16,2-33,8	25,0	17,2-32,9
9 a 11	23,0	19,3-26,7	28,4	22,2-34,7	18,8	14,5-23,0
12 e mais	18,1	14,9-21,3	23,1	17,9-28,4	13,5	9,7-17,4
Total	23,1	19,9-26,3	25,7	20,6-30,7	20,9	16,6-25,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 12 - Percentual de indivíduos que praticam atividade física suficiente no tempo livre*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	28,3	19,6-36,9	46,5	32,3-60,6	11,7	4,3-19,1
25 a 34	14,5	10,6-18,4	17,1	10,5-23,7	12,2	7,6-16,7
35 a 44	16,6	13,0-20,2	16,4	11,1-21,8	16,7	11,9-21,5
45 a 54	15,5	11,3-19,8	17,0	10,3-23,7	14,3	8,8-19,8
55 a 64	19,8	13,3-26,3	25,1	14,7-35,5	15,0	6,9-23,0
65 e mais	16,9	10,5-23,3	23,9	11,7-36,1	11,8	5,5-18,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	15,2	10,4-20,0	19,4	11,0-27,9	11,2	6,7-15,6
9 a 11	22,4	18,8-26,1	31,3	25,0-37,6	15,5	11,5-19,5
12 e mais	23,5	20,0-27,0	31,8	26,0-37,6	16,0	12,0-20,0
Total	19,0	16,3-21,7	25,3	20,4-30,1	13,5	10,8-16,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que praticam atividades de intensidade leve ou moderada por pelo menos 30 minutos diários em 5 ou mais dias da semana ou atividades de intensidade vigorosa por pelo menos 20 minutos diários em 3 ou mais dias da semana (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 13 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos na ocupação*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	50,1	40,4-59,7	61,4	48,7-74,2	39,7	26,6-52,9
25 a 34	47,5	40,7-54,3	54,3	43,0-65,6	41,4	33,5-49,3
35 a 44	47,6	42,5-52,7	55,0	47,3-62,7	41,3	34,6-47,9
45 a 54	45,4	38,9-51,9	52,3	42,0-62,5	39,6	31,3-47,8
55 a 64	34,7	26,6-42,9	49,0	36,2-61,8	21,9	12,9-30,9
65 e mais	9,7	3,8-15,7	21,1	8,2-34,0	1,5	0,0-3,8
Anos de escolaridade						
0 a 8	49,5	43,3-55,6	60,6	51,5-69,7	39,1	31,0-47,1
9 a 11	46,2	41,9-50,5	56,3	49,7-63,0	38,3	32,8-43,7
12 e mais	31,3	27,5-35,2	32,7	26,9-38,6	30,1	24,9-35,3
Total	45,1	41,6-48,6	54,1	48,8-59,4	37,2	32,7-41,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, realizavam esforços físicos intensos no trabalho (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 14 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no deslocamento*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	8,6	3,4-13,8	11,2	2,3-20,0	6,2	0,4-12,1
25 a 34	10,5	5,7-15,3	9,0	1,5-16,5	11,8	5,7-18,0
35 a 44	8,8	5,7-12,0	7,2	3,1-11,4	10,2	5,6-14,9
45 a 54	6,5	2,8-10,2	5,6	0,9-10,3	7,3	1,8-12,8
55 a 64	8,0	2,9-13,1	15,6	5,5-25,6	1,2	0,0-3,1
65 e mais	3,7	0,0-8,4	8,8	0,0-19,5	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	10,5	6,7-14,4	11,4	5,3-17,5	9,8	5,0-14,5
9 a 11	7,7	5,2-10,2	7,2	3,3-11,0	8,1	4,8-11,3
12 e mais	5,0	3,0-7,0	6,3	3,4-9,3	3,8	1,2-6,4
Total	8,6	6,5-10,7	9,2	5,8-12,6	8,1	5,5-10,7

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos que, atualmente ou nos últimos três meses, se deslocaram para o trabalho a pé ou de bicicleta (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 15 - Percentual de indivíduos fisicamente ativos no ambiente doméstico*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade**

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	32,3	23,0-41,5	7,7	2,6-12,7	54,6	41,8-67,4
25 a 34	36,6	30,4-42,9	8,4	3,4-13,5	62,0	54,5-69,5
35 a 44	42,5	37,6-47,5	17,2	11,3-23,1	64,4	58,1-70,7
45 a 54	35,5	29,5-41,6	11,9	5,4-18,4	55,8	47,7-64,0
55 a 64	29,5	21,6-37,5	12,1	4,1-20,1	45,2	33,6-56,8
65 e mais	24,0	16,8-31,3	19,4	6,9-31,9	27,4	18,7-36,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	40,0	34,1-45,9	11,3	6,9-15,8	66,9	59,6-74,3
9 a 11	39,1	34,9-43,2	12,5	8,5-16,5	59,7	54,1-65,4
12 e mais	17,3	14,3-20,3	9,2	5,9-12,6	24,6	19,8-29,3
Total	35,5	32,2-38,8	11,3	8,6-13,9	56,8	52,5-61,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Indivíduos responsáveis pela limpeza pesada de suas casas (ver Aspectos Metodológicos).

** Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 16 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, consumiram mais do que quatro doses (mulher) ou cinco doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	22,5	13,8-31,2	26,5	14,2-38,8	18,9	6,3-31,4
25 a 34	22,0	15,6-28,4	33,6	22,4-44,9	11,5	6,0-17,0
35 a 44	17,0	13,0-20,9	25,4	18,3-32,5	9,8	6,2-13,3
45 a 54	16,0	11,1-21,0	26,0	16,8-35,2	7,5	3,7-11,3
55 a 64	10,0	4,9-15,1	18,8	8,7-28,9	2,1	0,2-4,0
65 e mais	2,3	0,0-4,6	4,0	0,0-8,6	1,1	0,0-3,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,8	12,1-23,5	24,6	15,7-33,4	11,4	4,3-18,5
9 a 11	17,6	14,2-21,1	29,8	23,5-36,1	8,2	4,9-11,4
12 e mais	21,5	18,0-25,0	27,8	22,1-33,5	15,9	11,6-20,1
Total	18,4	15,3-21,5	26,7	21,7-31,7	11,2	7,4-14,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 17 - Percentual de indivíduos que, nos últimos 30 dias, dirigiram veículos motorizados após consumo abusivo de bebida alcoólica, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,1	0,0-2,3	2,4	0,0-4,9	0,0	0,0-0,0
25 a 34	2,6	0,9-4,3	4,7	1,3-8,2	0,7	0,0-1,6
35 a 44	1,0	0,3-1,7	2,1	0,6-3,6	0,1	0,0-0,3
45 a 54	1,0	0,1-1,9	1,5	0,0-3,3	0,5	0,0-1,3
55 a 64	0,5	0,0-1,2	1,0	0,0-2,5	0,0	0,0-0,0
65 e mais	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	0,5	0,0-1,3	1,0	0,0-2,5	0,1	0,0-0,2
9 a 11	1,7	0,5-3,0	4,0	1,2-6,7	0,0	0,0-0,0
12 e mais	3,3	1,8-4,7	5,3	2,7-7,9	1,4	0,0-2,9
Total	1,4	0,8-2,0	2,7	1,4-3,9	0,3	0,0-0,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 18 - Percentual de indivíduos que avaliaram seu estado de saúde como *ruim*, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,9	0,0-12,0	1,2	0,0-2,8	10,0	0,0-21,3
25 a 34	2,7	0,6-4,7	0,5	0,0-1,2	4,7	0,9-8,5
35 a 44	4,2	2,0-6,4	4,2	0,3-8,0	4,2	1,8-6,7
45 a 54	9,6	5,1-14,0	6,7	0,3-13,1	12,1	5,9-18,2
55 a 64	10,7	5,1-16,2	10,1	1,8-18,5	11,1	3,8-18,5
65 e mais	9,4	4,5-14,3	3,2	0,0-8,1	13,8	6,4-21,3
Anos de escolaridade						
0 a 8	8,4	4,8-11,9	3,9	1,5-6,2	12,6	6,3-18,9
9 a 11	3,2	1,7-4,8	2,3	0,0-4,7	4,0	2,0-6,0
12 e mais	2,1	0,9-3,3	2,2	0,4-3,9	2,0	0,5-3,6
Total	5,6	3,7-7,5	3,1	1,6-4,5	7,8	4,6-11,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 19 - Percentual de mulheres (50 a 69 anos) que realizaram mamografia em algum momento de suas vidas e nos últimos dois anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Mamografia			
	Em algum momento		Nos últimos 2 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
45 a 54	81,9	74,2-89,6	68,3	59,5-77,2
55 a 59	78,7	68,5-88,8	60,6	48,7-72,5
Anos de escolaridade				
0 a 8	75,8	67,0-84,6	57,8	47,9-67,8
9 a 11	88,4	80,7-96,0	74,5	63,9-85,2
12 e mais	92,2	85,3-99,2	87,0	78,7-95,2
Total	80,8	74,7-86,9	65,7	58,7-72,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 20 - Percentual de mulheres (25 a 59 anos) que realizaram exame de Papanicolau em algum momento de suas vidas e nos últimos três anos, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Realização de Papanicolau			
	Em algum momento		Nos últimos 3 anos	
	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)				
25 a 34	75,7	68,7-82,7	70,1	62,4-77,8
35 a 44	84,6	79,5-89,8	75,7	69,8-81,7
45 a 54	95,3	91,7-98,9	80,9	73,4-88,4
55 a 59	96,0	89,0-100,0	76,0	62,5-89,6
Anos de escolaridade				
0 a 8	81,3	75,0-87,6	67,3	59,9-74,7
9 a 11	82,1	76,6-87,5	76,4	70,6-82,2
12 e mais	91,3	87,7-95,0	87,6	83,2-92,0
Total	83,6	80,1-87,2	74,4	70,3-78,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 21 - Percentual de indivíduos que referem se proteger contra a radiação ultravioleta, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	40,2	31,0-49,4	31,9	19,0-44,8	47,7	34,7-60,7
25 a 34	41,7	35,3-48,1	22,6	14,8-30,5	58,8	50,7-66,8
35 a 44	47,7	42,7-52,8	29,7	22,8-36,6	63,3	56,9-69,7
45 a 54	40,3	34,1-46,5	23,9	15,3-32,6	54,4	46,1-62,6
55 a 64	29,0	22,0-36,0	11,7	5,4-17,9	44,6	33,4-55,8
65 e mais	28,3	20,8-35,8	14,7	4,4-25,1	38,1	28,2-48,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	30,7	25,2-36,3	17,2	9,8-24,5	43,4	35,6-51,3
9 a 11	46,2	41,9-50,5	28,6	22,2-35,0	59,9	54,4-65,4
12 e mais	59,1	55,0-63,2	43,6	37,4-49,8	73,1	68,2-78,1
Total	40,8	37,6-44,1	25,5	21,0-30,0	54,3	49,8-58,8

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 22 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de hipertensão arterial, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	5,4	0,8-10,1	4,4	1,0-7,8	6,3	0,0-14,6
25 a 34	10,6	6,6-14,7	10,8	3,6-17,9	10,5	6,3-14,7
35 a 44	22,6	18,3-26,8	24,5	17,8-31,1	21,0	15,6-26,4
45 a 54	35,5	29,4-41,7	31,8	22,5-41,1	38,8	30,7-46,8
55 a 64	47,9	39,3-56,4	46,5	33,7-59,2	49,1	37,6-60,7
65 e mais	61,7	53,4-70,1	53,2	38,5-68,0	67,8	58,3-77,4
Anos de escolaridade						
0 a 8	23,5	19,2-27,8	18,6	12,7-24,5	28,1	21,9-34,2
9 a 11	16,9	14,0-19,7	17,3	12,7-21,9	16,5	12,9-20,2
12 e mais	18,0	14,8-21,1	24,2	18,9-29,5	12,3	8,9-15,8
Total	20,4	18,0-22,8	19,3	15,8-22,8	21,4	18,2-24,6

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 23 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de diabetes, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,5	0,0-1,2	0,0	0,0-0,0	0,9	0,0-2,3
25 a 34	1,0	0,0-1,9	0,7	0,0-1,7	1,2	0,0-2,8
35 a 44	2,8	1,2-4,4	2,6	0,1-5,1	3,0	1,0-5,1
45 a 54	9,2	4,9-13,4	12,5	4,6-20,5	6,3	2,6-10,0
55 a 64	15,6	9,2-22,0	16,7	7,1-26,3	14,6	6,1-23,1
65 e mais	22,9	15,7-30,2	23,4	10,8-36,0	22,6	14,1-31,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	6,2	4,4-8,1	6,5	3,5-9,5	6,0	3,7-8,3
9 a 11	2,3	1,3-3,3	1,9	0,6-3,2	2,6	1,1-4,1
12 e mais	3,3	2,0-4,7	3,9	1,9-6,0	2,8	1,1-4,6
Total	4,5	3,5-5,5	4,7	3,0-6,3	4,3	3,1-5,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 24 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de doenças do coração, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	1,1	0,0-2,8	1,7	0,0-5,2	0,5	0,0-1,6
25 a 34	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0	0,0	0,0-0,0
35 a 44	2,8	0,7-5,0	5,2	0,8-9,7	0,8	0,0-1,6
45 a 54	1,5	0,3-2,7	1,9	0,0-3,8	1,2	0,0-2,7
55 a 64	6,8	2,4-11,1	8,9	1,3-16,5	4,8	0,3-9,4
65 e mais	7,4	3,1-11,8	4,0	0,6-7,3	9,9	3,0-16,9
Anos de escolaridade						
0 a 8	2,2	1,0-3,5	2,9	0,6-5,3	1,6	0,5-2,6
9 a 11	1,6	0,5-2,7	2,2	0,0-4,4	1,1	0,2-2,1
12 e mais	1,7	0,6-2,9	2,4	0,3-4,6	1,1	0,0-2,3
Total	1,9	1,2-2,7	2,6	1,2-4,0	1,3	0,7-2,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 25 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de dislipidemias, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,5	1,0-4,1	2,2	0,0-4,4	2,9	0,5-5,2
25 a 34	8,5	5,5-11,6	5,6	2,6-8,5	11,2	6,3-16,1
35 a 44	15,8	12,3-19,3	13,7	8,9-18,6	17,6	12,7-22,4
45 a 54	29,0	23,2-34,8	31,4	22,0-40,7	27,0	19,7-34,2
55 a 64	35,0	27,2-42,9	28,0	16,8-39,1	41,4	30,3-52,4
65 e mais	37,0	28,9-45,1	30,0	16,7-43,3	42,1	32,1-52,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	13,4	10,5-16,3	8,2	4,8-11,6	18,3	13,7-22,8
9 a 11	12,1	9,6-14,5	11,5	7,8-15,2	12,5	9,3-15,8
12 e mais	22,3	18,9-25,7	26,2	20,7-31,8	18,8	14,8-22,7
Total	14,6	12,8-16,4	12,5	10,1-15,0	16,4	13,9-19,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 26 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de osteoporose, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	0,2	0,0-0,5	0,0	0,0-0,0	0,3	0,0-1,0
25 a 34	0,5	0,0-1,3	0,0	0,0-0,0	1,0	0,0-2,5
35 a 44	1,8	0,2-3,3	1,8	0,0-4,1	1,7	0,0-3,8
45 a 54	5,9	2,9-8,9	2,0	0,0-6,0	9,2	4,7-13,7
55 a 64	13,8	7,8-19,8	9,2	1,3-17,2	17,9	9,1-26,8
65 e mais	16,8	11,0-22,7	3,9	0,2-7,5	26,2	17,2-35,1
Anos de escolaridade						
0 a 8	4,7	3,1-6,2	2,1	0,4-3,8	7,1	4,6-9,6
9 a 11	1,4	0,7-2,1	0,4	0,0-0,9	2,2	1,1-3,3
12 e mais	2,1	1,0-3,2	1,6	0,0-3,2	2,5	1,0-4,0
Total	3,2	2,4-4,0	1,5	0,5-2,4	4,7	3,4-5,9

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 27 - Percentual de indivíduos que referem diagnóstico médico de asma, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	2,9	1,2-4,7	1,3	0,0-2,7	4,4	1,4-7,5
25 a 34	3,7	1,7-5,6	1,4	0,1-2,7	5,7	2,2-9,2
35 a 44	3,4	1,7-5,0	3,6	1,1-6,2	3,1	1,0-5,3
45 a 54	6,6	3,0-10,2	8,6	1,7-15,5	4,9	2,0-7,8
55 a 64	7,5	1,9-13,1	3,5	0,0-8,3	11,1	1,7-20,6
65 e mais	7,1	3,1-11,1	2,4	0,0-4,8	10,6	4,1-17,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	3,7	2,1-5,4	2,4	0,4-4,4	5,0	2,5-7,6
9 a 11	4,1	2,5-5,8	2,6	0,7-4,5	5,3	2,7-7,8
12 e mais	5,8	4,0-7,7	5,2	2,7-7,8	6,4	3,8-9,0
Total	4,3	3,2-5,3	3,0	1,7-4,3	5,4	3,8-7,0

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 28 - Percentual de indivíduos que referem ter plano de saúde ou convênio médico, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	30,0	22,4-37,7	32,5	19,9-45,1	27,9	19,0-36,8
25 a 34	30,6	24,9-36,3	27,8	19,1-36,5	33,1	25,7-40,5
35 a 44	35,3	30,8-39,8	36,1	29,2-43,0	34,6	28,6-40,6
45 a 54	40,8	34,6-46,9	39,3	29,8-48,9	42,0	34,1-50,0
55 a 64	41,3	33,0-49,6	42,2	29,9-54,5	40,4	29,3-51,6
65 e mais	46,2	37,7-54,7	44,3	29,9-58,7	47,6	37,4-57,7
Anos de escolaridade						
0 a 8	17,6	13,2-22,0	16,8	9,6-24,0	18,3	13,0-23,5
9 a 11	38,3	34,2-42,5	38,0	31,6-44,4	38,6	33,2-44,0
12 e mais	72,5	68,7-76,3	74,4	68,9-80,0	70,8	65,6-76,0
Total	34,4	31,4-37,3	34,0	29,4-38,7	34,6	30,9-38,4

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 29 - Percentual de mulheres (18 a 50 anos) que referem utilizar algum método de planejamento familiar, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Feminino	
	%	IC95%
Idade (anos)		
18 a 25	55,7	43,7-67,8
26 a 30	75,4	65,8-85,1
31 a 35	81,6	74,1-89,2
36 a 40	75,8	68,4-83,1
41 a 45	66,4	56,0-76,8
46 a 50	70,1	59,5-80,7
Anos de escolaridade		
0 a 8	74,2	64,8-83,5
9 a 11	63,9	57,8-70,1
12 e mais	65,6	59,6-71,7
Total	68,7	63,9-73,5

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 30 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	16,9	9,5-24,4	5,3	0,0-10,8	27,5	15,2-39,8
25 a 34	17,5	12,3-22,6	10,7	3,6-17,8	23,6	16,4-30,7
35 a 44	21,0	16,7-25,2	13,9	7,9-19,8	27,1	21,1-33,1
45 a 54	20,3	14,9-25,7	15,8	7,5-24,1	24,2	17,2-31,3
55 a 64	18,5	11,3-25,6	11,3	2,9-19,7	24,9	14,0-35,8
65 e mais	8,9	4,6-13,2	0,3	0,0-0,9	15,1	8,0-22,2
Anos de escolaridade						
0 a 8	20,3	15,4-25,2	11,2	5,8-16,6	28,9	21,3-36,4
9 a 11	14,4	11,4-17,3	9,5	5,7-13,3	18,2	13,9-22,5
12 e mais	18,4	15,1-21,7	8,7	5,0-12,4	27,1	22,1-32,2
Total	18,1	15,4-20,8	10,2	7,1-13,3	25,0	20,9-29,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.

Tabela 31 - Percentual de indivíduos que referem necessidade de atendimento em saúde mental e conseguiram ser atendidos, por sexo, segundo idade e anos de escolaridade*

Variáveis	Total		Sexo			
			Masculino		Feminino	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
Idade (anos)						
18 a 24	64,8	41,4-88,1	85,7	62,0-100,0	61,1	34,7-87,5
25 a 34	65,5	48,6-82,3	55,9	19,9-92,0	69,4	51,1-87,6
35 a 44	69,3	57,9-80,6	63,8	39,4-88,1	71,7	59,7-83,8
45 a 54	76,7	63,3-90,0	87,0	67,3-100,0	70,9	54,0-87,7
55 a 64	78,1	59,8-96,3	62,4	21,1-100,0	84,4	67,8-100,0
65 e mais	89,2	76,7-100,0	0,0	0,0-0,0	89,0	76,3-100,0
Anos de escolaridade						
0 a 8	62,8	49,5-76,1	66,9	42,2-91,7	61,3	45,6-77,0
9 a 11	72,5	62,4-82,6	69,3	48,1-90,5	73,8	62,6-84,9
12 e mais	85,2	78,6-91,7	75,6	56,1-95,1	87,9	81,9-94,0
Total	69,4	61,3-77,5	68,9	53,4-84,5	69,6	60,1-79,1

Fonte: VIGITEL 2008 – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra Vigitel à distribuição da população adulta de cada cidade no Censo Demográfico de 2000 e para levar em conta o peso populacional de cada cidade (ver Aspectos Metodológicos).

IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.



disque saúde:
0800 61 1997

Secretaria de Vigilância em Saúde:
www.saude.gov.br/svs

Biblioteca Virtual em Saúde:
www.saude.gov.br/bvs



Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa

Secretaria de
Vigilância em Saúde

Ministério
da Saúde

